

Fluxos Máximos. Ford-Fulkerson. Edmonds-Karp.

CLRS Cap. 26

Instituto Superior Técnico

2022/2023

Resumo

Motivação

Definições

Ford-Fulkerson

Edmonds-Karp

Contexto


- Revisão [CLRS, Cap.1-13]
 - Fundamentos; notação; exemplos
- Técnicas de Síntese de Algoritmos [CLRS, Cap.15-16]
 - Programação dinâmica
 - Algoritmos greedy
- Algoritmos em Grafos [CLRS, Cap.21-26]
 - Algoritmos elementares
 - Caminhos mais curtos [CLRS, Cap.22,24-25]
 - Árvores abrangentes [CLRS, (Cap. 21 +) Cap.23]
 - Fluxos máximos [CLRS, Cap.26]
- Programação Linear [CLRS, Cap.29]
 - Algoritmos e modelação de problemas com restrições lineares
- Tópicos Adicionais [CLRS, Cap.32-35]
 - Complexidade Computacional

Fluxos Máximos

Problema

Qual o volume de água máximo (por segundo), que é possível fazer chegar a Lisboa a partir da Barragem de Castelo de Bode?


- Existe uma rede de condutas de água que permitem o envio da água de Castelo de Bode para Lisboa
- Cada conduta apresenta uma capacidade limite, de metros cúbicos por segundo
- **Objectivo:** Encontrar um algoritmo eficiente



Problema

Qual o volume de água máximo (por segundo), que é possível fazer chegar a Lisboa a partir da Barragem de Castelo de Bode?

- Existe uma rede de condutas de água que permitem o envio da água de Castelo de Bode para Lisboa
- Cada conduta apresenta uma capacidade limite, de metros cúbicos por segundo
- **Objectivo:** Encontrar um algoritmo eficiente



Análise e Síntese de Algoritmos - 2022/2023

3/42

Aplicações

Envio de materiais/informação em redes:

- Rede de distribuição: electricidade, água, petróleo ou gás
- Contentores numa rede de transportes
- Informação numa rede de comunicação
- Tráfego numa rede rodoviária
- ...

Análise e Síntese de Algoritmos - 2022/2023

4/42

Definição de Rede de Fluxo

- Uma **rede de fluxo** $G = (V, E)$ é um grafo dirigido
- Cada arco (u, v) é caracterizado por uma **capacidade** não negativa $c(u, v) \geq 0$
 - Indica valor limite de "fluxo" que é possível passar por (u, v)
 - Se $(u, v) \notin E$, então $c(u, v) = 0$
- Se $(u, v) \in E$, então $(v, u) \notin E$ (não há arcos anti-paralelos)
- Dois vértices especiais: **fonte (source)** s e **destino (sink)** t
- Todos os vértices de G pertencem a um caminho de s para t
 $s \rightsquigarrow v \rightsquigarrow t, \forall v \in V$
- Grafo é ligado: $|E| \geq |V| - 1$

Análise e Síntese de Algoritmos - 2022/2023

5/42

Propriedades de Fluxo

Um fluxo em G é uma função $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaz as propriedades abaixo.

- **Restrição de Capacidade:**

$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v), \quad \forall u, v \in V$$

- **Conservação de Fluxo:**

$$\sum_{v \in V} f(v, u) = \sum_{v \in V} f(u, v), \quad \forall u \in V - \{s, t\}$$

Análise e Síntese de Algoritmos - 2022/2023

6/42

Valor de Fluxo

Seja f uma função de fluxo numa rede de fluxo $G = (V, E, s, t, c)$, o **valor de fluxo** de f , denotado por $|f|$, é definido por:

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v) - \sum_{v \in V} f(v, s)$$

Valor total do fluxo que sai da fonte menos o valor total de fluxo que entra na fonte

Problema do Fluxo Máximo

Dada uma rede de fluxo $G = (V, E, s, t, c)$, determinar qual o **valor máximo** de fluxo $|f^*|$ de s para t


Estratégias de Modelação

Para redes de fluxo com **arcos anti-paralelos** entre vértices u e v

Estratégias de Modelação

Para redes de fluxo com **arcos anti-paralelos** entre vértices u e v

- Criar um vértice adicional v' entre (u, v) respeitando as capacidades



Estratégias de Modelação

Para redes de fluxo com **arcos anti-paralelos** entre vértices u e v

- Criar um vértice adicional v' entre (u, v) respeitando as capacidades



Estratégias de Modelação

Para redes de fluxo com múltiplas fontes e/ou destinos

Estratégias de Modelação



Para redes de fluxo com múltiplas fontes e/ou destinos

- Definir **super-fonte** que liga a todas as fontes
- Definir **super-destino** ao qual ligam todos os destinos
- Considerar capacidades infinitas entre:
 - Super-fonte e fontes, $c(s, s_i) = \infty$
 - Destinos e super-destino, $c(t_i, t) = \infty$

Estratégias de Modelação

Para redes de fluxo com múltiplas fontes e/ou destinos

- Definir **super-fonte** que liga a todas as fontes
- Definir **super-destino** ao qual ligam todos os destinos
- Considerar capacidades infinitas entre:
 - Super-fonte e fontes, $c(s, s_i) = \infty$
 - Destinos e super-destino, $c(t_i, t) = \infty$



Valor do Fluxo: 10
Fluxo Máximo: 20

Conceitos

- Redes residuais
- Caminhos de aumento
- Cortes em redes de fluxo
- Teorema do Fluxo-Máximo Corte-Mínimo
- Algoritmo Genérico de Ford-Fulkerson

Ford-Fulkerson-Method(G, s, t)

Inicializar fluxo f a 0

while existe **caminho de aumento** $p = \langle s, \dots, t \rangle$ **do**
 aumentar fluxo f utilizando p
end while
return f

Rede Residual

Rede Residual

Dado $G = (V, E)$, um fluxo f , e vértices $u, v \in V$

- $c_f(u, v)$ denota a **capacidade residual** de (u, v) :
fluxo líquido adicional que é possível enviar de u para v

$$c_f(u, v) = \begin{cases} c(u, v) - f(u, v) & (u, v) \in E \\ f(v, u) & (v, u) \in E \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$


- $G_f = (V, E_f)$ denota a **rede residual** de G , onde

$$E_f = \{(u, v) \in V \times V : c_f(u, v) > 0\}$$


- Cada arco (residual) de G_f permite apenas **fluxo líquido positivo**

Rede Residual


Exemplo




Exemplo



Exemplo



Exemplo



Aumento de Fluxo

Seja $G = (V, E, s, t, c)$ uma rede de fluxo, f um fluxo, G_f a rede residual de G e f' um fluxo em G_f :

- O **aumento de fluxo** f em f' , é uma função de $V \times V$ em \mathbb{R} :

$$(f \uparrow f')(u, v) = \begin{cases} f(u, v) + f'(u, v) - f'(v, u) & \text{se } (u, v) \in E \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- Empurrar fluxo $f'(v, u)$, no arco contrário na rede residual, corresponde a **cancelar** fluxo na rede original
- f' é definido em G_f e é um fluxo
- Propriedades de um fluxo são verificadas: restrição de capacidade e conservação de fluxo

Lema do Aumento de Fluxo

Seja $G = (V, E)$ uma rede de fluxo com origem s e destino t , e seja f um fluxo em G . Seja G_f a rede residual de G induzida por f , e seja f' um fluxo em G_f . Então a função $f \uparrow f'$ é um fluxo em G , com valor $|f \uparrow f'| = |f| + |f'|$.

Prova

$$\begin{aligned} |f \uparrow f'| &= \sum_{v \in V} (f \uparrow f')(s, v) - \sum_{v \in V} (f \uparrow f')(v, s) = \dots \\ &= \sum_{v \in V} f(s, v) - \sum_{v \in V} f(v, s) + \sum_{v \in V} f'(s, v) - \sum_{v \in V} f'(v, s) \\ &= |f| + |f'| \end{aligned}$$

Não há arcos anti-paralelos em G : para cada $v \in V$, apenas pode existir o arco (s, v) ou (v, s)

Ver prova completa no CLRS, Lema 26.1

Cortes em Rede de Fluxo


Definição

Um **corte** (S, T) de $G = (V, E)$ é uma partição de V em S e $T = V - S$, tal que $s \in S$ e $t \in T$

- Fluxo líquido do corte (S, T) :

$$f(S, T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(u, v) - \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} f(v, u)$$

- Capacidade do corte (S, T) : $c(S, T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u, v)$



Rede Residual

Caminho de Aumento

Seja $G = (V, E, s, t, c)$ rede de fluxo, f um fluxo e G_f a rede residual de G :

- Caminho de aumento** p : caminho simples de s para t na rede residual G_f

- Capacidade residual** de p :

$$c_f(p) = \min\{c_f(u, v) : (u, v) \text{ em } p\}$$


- $c_f(p)$ permite definir fluxo f_p em G_f , $|f_p| = c_f(p) > 0$
- $f \uparrow f_p$ é um fluxo em G , com valor $|f \uparrow f_p| = |f| + |f_p|$

Cortes em Rede de Fluxo

Fluxo Através de um Corte

Se $G = (V, E)$ com fluxo f , então o fluxo líquido através de qualquer corte (S, T) é $f(S, T) = |f|$

- $V = T \cup S$, pelo que $f(S, V) = f(S, T \cup S) = f(S, T) + f(S, S)$
- Logo, $f(S, V) = f(S, T)$, dado que $f(S, S) = 0$
- $f(S, V) = f(s, V) + f(S - \{s\}, V) = f(s, V) = |f|$
- Observação: para $u \in S - \{s\}$ temos $f(u, V) = 0$ (conservação de fluxo nos vértices intermédios)




Limitação de Fluxo

Qualquer valor de fluxo é **limitado superiormente** pela **capacidade** de qualquer corte de G

- Seja (S, T) qualquer corte de G , e f um fluxo:

$$|f| = f(S, T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(u, v) \leq \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u, v) = c(S, T)$$



Análise e Síntese de Algoritmos - 2022/2023

20/42

Teorema Fluxo Máximo - Corte Mínimo

Seja f um fluxo, numa rede de fluxo $G = (V, E)$, com fonte s e destino t , então as proposições seguintes são equivalentes:

- f é um fluxo máximo em G
- A rede residual G_f não contém caminhos de aumento
- $|f| = c(S, T)$ para um corte (S, T) de G

Análise e Síntese de Algoritmos - 2022/2023

21/42

Teorema Fluxo Máximo - Corte Mínimo

Seja f um fluxo, numa rede de fluxo $G = (V, E)$, com fonte s e destino t , então as proposições seguintes são equivalentes:

- f é um fluxo máximo em G
- A rede residual G_f não contém caminhos de aumento
- $|f| = c(S, T)$ para um corte (S, T) de G

Prova $1 \rightarrow 2$

- Admitir que f é fluxo máximo em G mas que G_f tem caminho de aumento
- Então é possível definir um novo fluxo $f + f_p$ com valor $|f| + |f_p| > |f| \Rightarrow$ **contradição de que f é fluxo máximo**

Análise e Síntese de Algoritmos - 2022/2023

21/42

Teorema Fluxo Máximo - Corte Mínimo

Seja f um fluxo, numa rede de fluxo $G = (V, E)$, com fonte s e destino t , então as proposições seguintes são equivalentes:

- f é um fluxo máximo em G
- A rede residual G_f não contém caminhos de aumento
- $|f| = c(S, T)$ para um corte (S, T) de G

Prova $2 \rightarrow 3$

- $S = \{v \in V : \text{existe caminho de } s \text{ para } v \text{ em } G_f\}$
- $T = V - S$, onde $s \in S$ e $t \in T$, logo (S, T) é um corte
- Assumindo que $u \in S$ e $v \in T$, temos:
 - $f(u, v) = c(u, v)$, caso contrário teríamos $(u, v) \in E_f$, o que colocaria v em S
 - $f(v, u) = 0$, se $(v, u) \in E$, caso contrário $c_f(u, v) = f(v, u)$ seria positivo e $(u, v) \in E_f$, o que colocaria v em S

Análise e Síntese de Algoritmos - 2022/2023

22/42

Teorema Fluxo Máximo - Corte Mínimo

Seja f um fluxo, numa rede de fluxo $G = (V, E)$, com fonte s e destino t , então as proposições seguintes são equivalentes:

1. f é um fluxo máximo em G
2. A rede residual G_f não contém caminhos de aumento
3. $|f| = c(S, T)$ para um corte (S, T) de G

Prova 2 \rightarrow 3

- ...
- Assim, o valor do fluxo $|f|$ é dado por:

$$\begin{aligned} |f| = f(S, T) &= \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(u, v) - \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} f(v, u) \\ &= \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u, v) - \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} 0 \\ &= c(S, T) \end{aligned}$$

Teorema Fluxo Máximo - Corte Mínimo


Seja f um fluxo, numa rede de fluxo $G = (V, E)$, com fonte s e destino t , então as proposições seguintes são equivalentes:

1. f é um fluxo máximo em G
2. A rede residual G_f não contém caminhos de aumento
3. $|f| = c(S, T)$ para um corte (S, T) de G

Prova 3 \rightarrow 1


- Dado que $|f| \leq c(S, T)$, para qualquer corte (S, T) de G
- Como $|f| = c(S, T)$ (definido acima), então f é fluxo máximo

Exemplo



Corte mínimo?

Exemplo



Corte mínimo?


$\{s, v_1, v_2, v_4\}, \{v_3, t\}$

Ford-Fulkerson(G, s, t)


```

for each edge  $(u, v) \in G.E$  do
     $f(u, v) = 0$ 
     $f(v, u) = 0$ 
end for
while exists path  $p \in G_f$  from  $s$  to  $t$  do
     $c_f(p) = \min\{c_f(u, v) : (u, v) \in p\}$ 
    for each edge  $(u, v) \in p$  do
        if  $(u, v) \in E$  then
             $f(u, v) = f(u, v) + c_f(p)$ 
        else
             $f(v, u) = f(v, u) - c_f(p)$ 
        end if
    end for
end while
    
```


Exemplo




Exemplo




Exemplo




Exemplo




Exemplo




Exemplo




Exemplo




Exemplo




Exemplo




Exemplo



Exemplo




Exemplo



Não existem mais caminhos de aumento!

Análise Algoritmo Básico


- Número de aumentos de fluxo pode ser elevado
- Ex: Fluxo máximo = 2.000.000
- No pior caso: número de caminhos de aumento é 2.000.000




Rede de fluxo

Análise Algoritmo Básico

- Número de aumentos de fluxo pode ser elevado
- Ex: Fluxo máximo = 2.000.000
- No pior caso: número de caminhos de aumento é 2.000.000



Rede de fluxo



Caminho de aumento p com $c_f(p) = 1$

Análise Algoritmo Básico

- Número de caminhos de aumento limitado por valor máximo do fluxo $|f^*|$
- Complexidade: $O(E |f^*|)$
- Por exemplo: DFS para encontrar caminho de aumento

Algoritmo Edmonds-Karp

- Implementação do método de Ford-Fulkerson
- Escolher caminho de aumento **mais curto**, ou seja, com menor número de arcos
- Utilizar BFS em G_f para identificar caminho mais curto (pesos unitários)
- Complexidade: $O(V E^2)$

Prova (cont.)

$\delta_f(s, v)$ **crece de forma monótona** com cada aumento de fluxo

- Considere-se o primeiro $v \in V$ tal que, após aumento de fluxo (de f para f'), a distância do caminho mais curto **diminui**, $\delta_{f'}(s, v) < \delta_f(s, v)$

Análise

Se o algoritmo Edmonds-Karp for executado numa rede de fluxo $G = (V, E)$ com origem s e destino t , então para todos os vértices $v \in V - \{s, t\}$, a distância do caminho mais curto $\delta_f(s, v)$ na rede residual G_f **crece monotonamente** com cada aumento de fluxo.

Prova

Assumir que para $v \in V - \{s, t\}$ existe um aumento de fluxo que origina a diminuição da distância do caminho mais curto de s para v e provar por contradição. Considerar que:

- $\delta_f(s, v)$: distância mais curta de s para v na rede residual G_f
- $\delta_{f'}(s, v)$: distância mais curta de s para v na rede residual $G_{f'}$
- Sequência de eventos considerada:

$$f \rightarrow G_f \rightarrow \text{BFS} \rightarrow p \rightarrow f' \rightarrow G_{f'} \rightarrow \text{BFS} \rightarrow p'$$

Prova (cont.)

$\delta_f(s, v)$ **crece de forma monótona** com cada aumento de fluxo

- Considere-se o primeiro $v \in V$ tal que, após aumento de fluxo (de f para f'), a distância do caminho mais curto **diminui**, $\delta_{f'}(s, v) < \delta_f(s, v)$
- Seja $p = \langle s, \dots, u, v \rangle$ o caminho mais curto de s para v em $G_{f'}$
 - $\delta_{f'}(s, u) = \delta_{f'}(s, v) - 1$
 - $\delta_{f'}(s, u) \geq \delta_f(s, u)$ (u não falha, porque v é o primeiro que falha)

Prova (cont.)

$\delta_f(s, v)$ cresce de forma monótona com cada aumento de fluxo

- Considere-se o primeiro $v \in V$ tal que, após aumento de fluxo (de f para f'), a distância do caminho mais curto diminui, $\delta_{f'}(s, v) < \delta_f(s, v)$
- Seja $p = \langle s, \dots, u, v \rangle$ o caminho mais curto de s para v em $G_{f'}$
 - $\delta_{f'}(s, u) = \delta_{f'}(s, v) - 1$
 - $\delta_{f'}(s, u) \geq \delta_f(s, u)$ (u não falha, porque v é o primeiro que falha)
- $(u, v) \in E_f \Rightarrow \delta_f(s, v) \leq \delta_f(s, u) + 1 \leq \delta_{f'}(s, u) + 1 = \delta_{f'}(s, v)$
 - Contradiz pressuposto $\delta_{f'}(s, v) < \delta_f(s, v)$
 - Logo, concluímos que $(u, v) \notin E_f$

Prova (cont.)

$\delta_f(s, v)$ cresce de forma monótona com cada aumento de fluxo

- Como podemos ter $(u, v) \notin E_f$ e $(u, v) \in E_{f'}$?
 - O aumento de fluxo deve ter aumentado o fluxo de v para u
- Aumento sempre pelo caminho mais curto, então o caminho mais curto entre s e u em G_f tem como último arco (v, u) , logo

$$\delta_f(s, v) = \delta_f(s, u) - 1 \leq \delta_{f'}(s, u) - 1 = \delta_{f'}(s, v) - 2$$

- Contradiz o pressuposto $\delta_{f'}(s, v) < \delta_f(s, v)$!

Análise

Número de aumentos de fluxo do algoritmo Edmonds-Karp é $O(V E)$

Prova

- Arco (u, v) na rede residual G_f é crítico se capacidade residual do caminho de aumento p é igual à capacidade residual do arco
 - Arco crítico desaparece após aumento de fluxo

Análise

Número de aumentos de fluxo do algoritmo Edmonds-Karp é $O(V E)$

Prova

- Arco (u, v) na rede residual G_f é crítico se capacidade residual do caminho de aumento p é igual à capacidade residual do arco
 - Arco crítico desaparece após aumento de fluxo
- Quantas vezes pode arco (u, v) ser arco crítico?

Análise

Número de aumentos de fluxo do algoritmo Edmonds-Karp é $O(VE)$

Prova

- Arco (u, v) na rede residual G_f é **crítico** se capacidade residual do caminho de aumento p é igual à capacidade residual do arco
 - Arco crítico desaparece após aumento de fluxo
- Quantas vezes pode arco (u, v) ser arco crítico?
 - Como caminhos de aumento são caminhos mais curtos, $\delta_f(s, v) = \delta_f(s, u) + 1$
 - (u, v) só volta à rede residual após arco (v, u) aparecer em caminho de aumento (com fluxo f')

Análise

Número de aumentos de fluxo do algoritmo Edmonds-Karp é $O(VE)$

Prova

- Arco (u, v) na rede residual G_f é **crítico** se capacidade residual do caminho de aumento p é igual à capacidade residual do arco
 - Arco crítico desaparece após aumento de fluxo
- Quantas vezes pode arco (u, v) ser arco crítico?
 - Como caminhos de aumento são caminhos mais curtos, $\delta_f(s, v) = \delta_f(s, u) + 1$
 - (u, v) só volta à rede residual após arco (v, u) aparecer em caminho de aumento (com fluxo f')

Como $\delta_{f'}(s, u) = \delta_{f'}(s, v) + 1$
 Dado que $\delta_f(s, v) \leq \delta_{f'}(s, v)$ (resultado anterior)
 Obtém-se $\delta_{f'}(s, u) = \delta_{f'}(s, v) + 1 \geq \delta_f(s, v) + 1 = \delta_f(s, u) + 2$

Prova (cont.)

Número de aumentos de fluxo é $O(VE)$


- Distância de s a u aumenta pelo menos de 2 unidades entre cada par de vezes que (u, v) é crítico
 - No limite, distância de s a u é não superior a $|V| - 2$
 - Pelo que arco (u, v) pode ser crítico $O(V)$ vezes
 - Existem $O(E)$ pares de vértices
 - Na execução do algoritmo de Edmonds-Karp o número total de vezes que arcos podem ser críticos é $O(VE)$
 - Como cada caminho de aumento tem um arco crítico, então existem $O(VE)$ caminhos de aumento

Complexidade

A complexidade do algoritmo Edmonds-Karp é $O(VE^2)$

- Complexidade de BFS é $O(V + E) = O(E)$
 - Grafo é ligado: $|E| \geq |V| - 1$
- Número de aumentos de fluxo é $O(VE)$
- BFS realizada em cada aumento de fluxo

Exercício: R1a I.d)



Indique um corte mínimo da rede, o valor do fluxo máximo, o número de caminhos de aumento, e o fluxo de cada arco após a aplicação do algoritmo.

Nota: Na selecção do caminho de aumento, em caso de empate (caminhos de aumento com o mesmo comprimento), escolha o menor caminho de aumento por ordem lexicográfica.