

QUÍMICA

As questões numéricas devem ser desenvolvidas sequencialmente até o final.

Constantes

Constante de Avogadro (N_A)	=	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday (F)	=	$9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A s mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J V}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Carga elementar	=	$1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante dos gases (R)	=	$8,21 \times 10^{-2} \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Planck (h)	=	$6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Velocidade da luz no vácuo	=	$3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Número de Euler (e)	=	2,72

Definições

Pressão: $1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 1,01325 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} = 1,01325 \text{ bar}$

Energia: $1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} = 6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0°C e 1 atm , equivalente a um volume de um gás ideal de $22,4 \text{ L}$.

Condições ambientes: 25°C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar ; concentração das soluções = 1 mol L^{-1} (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (ℓ) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias.

u.m.a. = unidade de massa atômica. $[X]$ = concentração da espécie química X em mol L^{-1}

$\ln X = 2,3 \log X$

Massas Molares

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})
H	1	1,01	S	16	32,06
Li	3	6,94	Cl	17	35,45
C	6	12,01	Ca	20	40,08
N	7	14,01	Cu	29	63,55
O	8	16,00	Zn	30	65,38
Na	11	22,99	Br	35	79,90
Mg	12	24,31	Os	76	190,23
Al	13	26,98	Sg	106	269

Questão 1. Considere dois líquidos voláteis, A e B, que são completamente miscíveis entre si e que formam uma solução ideal em toda a amplitude de concentrações. Esses líquidos são adicionados a um tanque fechado, inicialmente sob vácuo, e mantido em temperatura constante (T), na proporção molar 1:1. Considere que a mistura causa um abaixamento na pressão de vapor do líquido A igual a 40 Torr e que a pressão de vapor do líquido B puro é igual a 20 Torr.

Determine os valores numéricos:

- a) da pressão de vapor do líquido A puro na temperatura T;
- b) da pressão de vapor da solução, depois de atingido o equilíbrio do sistema;
- c) da composição molar da fase vapor em equilíbrio com a fase líquida presente no tanque.

Questão 2. O ácido fórmico pode ser obtido por meio de uma reação de duas etapas. Na primeira etapa, em temperatura de 200 °C e pressão de 10 atm, monóxido de carbono e hidróxido de sódio reagem. Na segunda, o produto dessa primeira etapa reage com ácido sulfúrico, formando-se o ácido fórmico. Sobre esse processo, apresente:

- a) a fórmula estrutural do produto gerado na primeira etapa;
- b) a equação química balanceada da primeira etapa;
- c) a equação química balanceada da segunda etapa.

Questão 3. Um determinado sistema consiste em dois sólidos, A e B, cada qual com uma quantidade igual a 1 mol. Considere que os sólidos estão fisicamente separados, mas em contato térmico por meio de uma parede condutora de calor, a qual garante que estejam em equilíbrio térmico em todos os instantes. A temperatura inicial desse sistema é igual a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. O sistema é aquecido até atingir a temperatura de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. A temperatura de fusão de A é igual a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ e a de B é igual a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Considere ainda os dados a seguir.

- I. Variação de entalpia de fusão, de A, $\Delta H_{\text{fusão}}(\text{A}) = 1\text{ kJ mol}^{-1}$, e de B, $\Delta H_{\text{fusão}}(\text{B}) = 2\text{ kJ mol}^{-1}$;
- II. Capacidade calorífica molar sob pressão constante, de A sólido, $C_{\text{p,sólido}}(\text{A}) = 30\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$, e de B sólido, $C_{\text{p,sólido}}(\text{B}) = 20\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$;
- III. Capacidade calorífica molar sob pressão constante, de A líquido, $C_{\text{p,líquido}}(\text{A}) = 50\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$, e de B líquido, $C_{\text{p,líquido}}(\text{B}) = 100\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$.

Desenhe um gráfico da temperatura do sistema, em $^{\circ}\text{C}$, em função da quantidade de calor fornecida, em kJ, indicando o fenômeno físico e o valor numérico da quantidade de calor fornecida em cada etapa do processo de aquecimento, até a temperatura final ser atingida.

Questão 4. Duas soluções aquosas, contendo os cátions genéricos, A^+ e B^+ , são preparadas com as concentrações iniciais descritas a seguir.

Solução 1: $[A^+] = 2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ e $[B^+] = 1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

Solução 2: $[A^+] = 5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ e $[B^+] = 1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

A cada uma dessas soluções são adicionadas quantidades progressivas de um ânion C^- , sem variação significativa do volume das soluções. Considere que os produtos de solubilidade dos sólidos $AC(s)$ e $BC(s)$ são iguais a 1×10^{-7} e 1×10^{-9} , respectivamente.

Com base nessas informações, determine o que se pede para a **solução 1** e para a **solução 2**.

- a) Qual sólido será formado primeiro com a adição progressiva de C^- a cada uma das soluções? Justifique a sua resposta.
- b) Conforme C^- é progressivamente adicionado, o segundo sólido começa a se formar. Nesse momento, qual é a concentração em solução do cátion desse primeiro sólido precipitado em cada solução?

Questão 5. Uma amostra de 5,480 g de uma mistura de óxido e carbonato de um mesmo metal (com um estado de oxidação igual a +2 nesses compostos) é completamente dissolvida em excesso de ácido clorídrico. Nesse processo, 0,448 L (condições normais) de gás são liberados.

Com base nessas informações, determine os valores numéricos

- a) da composição da mistura, em frações mássicas, se a quantidade em mol de carbonato na mistura é duas vezes maior do que a quantidade do óxido;
- b) da concentração molar do sal formado na solução resultante, se o volume final da dissolução é igual a 200 mL.

Questão 6. Suponha que, em medições experimentais realizadas no espaço sideral, foi descoberto um sistema formado de gás hidrogênio atômico excitado. A energia desse hidrogênio excitado é igual a $-0,34$ meV, fazendo com que o sistema emita um espectro de ondas eletromagnéticas de forma aparentemente contínua. Considere o modelo do átomo proposto por Bohr para descrever esse sistema. Considere, ainda, que a energia do átomo de hidrogênio no estado fundamental é $-13,6$ eV e que o raio do átomo de hidrogênio no estado fundamental é igual a 53 pm.

Acerca desse sistema, determine o que se pede a seguir.

- a) Qual é o nível de energia no qual os átomos de hidrogênio excitados se encontram?
- b) Qual é o raio da órbita do elétron ao redor do próton nesses átomos de hidrogênio?
- c) Qual é a razão entre a velocidade do elétron do átomo de hidrogênio no estado fundamental e no estado excitado?

Questão 7. A primeira determinação experimental do tamanho de um núcleo foi feita a partir dos resultados do espalhamento de Rutherford de partículas α . Os resultados evidenciaram uma dependência entre o raio nuclear (R) e o número de massa (A), através da relação:

$$R = R_0 A^{1/3},$$

em que R_0 é uma constante.

Com base nessas informações, calcule o valor numérico:

- a) da densidade nuclear para o $^{63}_{29}\text{Cu}$, considerando que o raio para $^{64}_{30}\text{Zn}$ é $4,8 \times 10^{-15} \text{ m}$;
- b) da razão entre os raios nucleares do isótopo de magnésio $^{24}_{12}\text{Mg}$ e do isótopo de ósmio $^{192}_{76}\text{Os}$;
- c) da densidade nuclear para o seabórgio $^{271}_{106}\text{Sg}$, comparando-a com o valor da densidade nuclear do $^{63}_{29}\text{Cu}$ obtida no item (a) acima.

Questão 8. O método de obtenção de magnésio metálico consiste nas seguintes etapas:

- I. Uma amostra de carbonato de cálcio sólido é aquecida a altas temperaturas, formando um produto sólido A e um gasoso B.
- II. Em seguida, o sólido A é tratado com água do mar, formando-se um hidróxido pouco solúvel que se ioniza formando os produtos C e D.
- III. Os ânions D reagem com cátions Mg^{2+} da água do mar. O resultado é um precipitado E.
- IV. O composto E é separado por filtração e dissolvido por meio da adição de uma solução aquosa de ácido clorídrico.
- V. A seguir, o solvente da solução é evaporado, obtendo-se o sal iônico F seco.
- VI. Finalmente, o sal F é submetido a uma eletrólise ígnea.

Determine o que se pede.

- a) Apresente as equações químicas balanceadas que representam as reações, identificando os produtos A, B, C, D, E e F formados.
- b) Em relação à eletrólise ígnea, mostre as semi-equações que representam as semi-reações que ocorreram no anodo e no catodo, assim como a reação global.

Questão 9. Apresente os compostos orgânicos formados a partir das reações do etanoato de metila com os seguintes reagentes:

- I. solução aquosa de ácido clorídrico.
- II. solução aquosa de hidróxido de sódio.
- III. amônia gasosa.
- IV. $\text{Li}(\text{AlH}_4)$ dissolvido em dietil éter, seguido da adição de uma solução aquosa ácida.

Questão 10. Considere o composto de fórmula C_4H_8 .

Apresente:

- a) os seis isômeros estruturais e geométricos;
- b) a fórmula estrutural dos produtos dibromados formados nas reações de cada um desses seis isômeros com Br_2 . Considere que as condições das reações são adequadas para que ocorram de forma completa e produtos dibromados sejam gerados.

FIM DA PROVA

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS
RESOLUÇÕES
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve. Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

Química

Link direto:

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2023/ita-2-fase-dia-1-digitacao-02-10-2023-2-fase-dia-1/dissertativa-1-quimica-2-fase-dia-1-ita-2023#exam-downloads>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.

RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 1: a) Pressão de vapor de A puro: $P^{\circ}A = 80$ torr; b) pressão de vapor da solução: $P = 50$ torr; c) fase vapor com 80% de A e 20% de B (frações molares 0,8 e 0,2)

Questão 2: a) Formiato de sódio, $\text{Na}^+[\text{HCOO}]^-$; b) $\text{CO} + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+\text{HCOO}^-$; c) $\text{Na}^+\text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{HCOOH} + \text{NaHSO}_4$

Questão 3: Aquecimento em 5 etapas: $Q_1 = 0,5$ kJ (aquecimento dos sólidos de -10 °C a 0 °C), $Q_2 = 1$ kJ (fusão de A a 0 °C), $Q_3 = 0,7$ kJ (aquecimento de 0 °C a 10 °C), $Q_4 = 2$ kJ (fusão de B a 10 °C), $Q_5 = 1,5$ kJ (aquecimento de 10 °C a 20 °C); total 5,7 kJ. O gráfico é uma linha crescente com patamares horizontais a 0 °C (entre 0,5 e 1,5 kJ) e a 10 °C (entre 2,2 e 4,2 kJ), atingindo 20 °C em 5,7 kJ

Questão 4: a) Solução 1: AC(s) se forma primeiro; solução 2: BC(s) se forma primeiro. b) Solução 1: $[\text{A}^+] = 10^{-2}$ mol/L; solução 2: $[\text{B}^+] = 5 \cdot 10^{-4}$ mol/L

Questão 5: a) Composição em massa: $\approx 28\%$ de óxido (MO) e $\approx 72\%$ de carbonato (MCO_3). b) Concentração do sal formado: $[\text{MCl}_2] = 0,15$ mol/L

Questão 6: a) $n = 200$. b) $r_n = 2,12 \cdot 10^{-6}$ m. c) $v_1/v_n = 200$

Questão 7: a) $d = 2,3 \cdot 10^{17}$ kg/m³. b) $R_{\text{Mg}}/R_{\text{Os}} = 1/2$. c) $d = 2,3 \cdot 10^{17}$ kg/m³ — as densidades nucleares do Sg-271 e do Cu-63 são iguais, pois a densidade nuclear independe do número de massa

Questão 8: a) A = CaO; B = CO₂; C = Ca²⁺; D = OH⁻; E = Mg(OH)₂; F = MgCl₂. Equações: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$; $\text{CaO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq})$; $\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{OH}^-(\text{aq})$; $\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s})$; $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2 \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{MgCl}_2(\text{aq}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$; $\text{MgCl}_2(\text{aq}) \xrightarrow{\Delta} \text{MgCl}_2(\text{s})$. b) Ânodo (oxidação): $2 \text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{e}^-$; cátodo (redução): $\text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$; reação global: $\text{MgCl}_2(\text{l}) \rightarrow \text{Mg}(\text{l}) + \text{Cl}_2(\text{g})$

Questão 9: I) ácido etanoico (CH₃COOH) + metanol; II) etanoato de sódio (CH₃COONa) + metanol; III) etanamida (CH₃CONH₂) + metanol; IV) etanol (CH₃CH₂OH) + metanol

Questão 10: a) Os seis isômeros: but-1-eno, cis-but-2-eno, trans-but-2-eno, metilpropeno (isobuteno), ciclobutano e metilciclopropano. b) Produtos dibromados: but-1-eno $\rightarrow$ 1,2-dibromobutano; cis-but-2-eno e trans-but-2-eno $\rightarrow$ 2,3-dibromobutano; metilpropeno $\rightarrow$ 1,2-dibromo-2-metilpropano; ciclobutano $\rightarrow$ 1,4-dibromobutano; metilciclopropano $\rightarrow$ 1,3-dibromobutano