


Regiões da face e do pescoço

Nomenclatura anatômica de superfície, em figura masculina, redesenhada a partir das pranchas de regiões da cabeça e do pescoço.

Este livro localiza cada preenchedor por região: um produto de alto G' é indicado para o mento, um de baixo G' para a região perioral. Essa precisão só existe se região tiver um nome único e um limite definido — caso contrário “bochecha” e “região bucal” passam a nomear coisas diferentes para autor e leitor. O que segue fixa esse vocabulário: 24 regiões e trígonos, com seus limites e o que corre por baixo de cada um.

A figura foi redesenhada em morfologia masculina. O crânio é raspado por necessidade descritiva: as regiões frontal, parietal e temporal só se delimitam com o couro cabeludo à vista.



PRANCHA I · VISTA ANTERIOR

Regiões da cabeça e do pescoço em vista anterior. Os limites em traço fino são convencionais — separam territórios descritivos, não estruturas visíveis na pele. As regiões bilaterais estão traçadas nos dois lados e nomeadas uma vez.

Glossário das regiões

Cada entrada traz os **limites** que definem a região e o que há **de nota** sob ela — o que importa saber antes de introduzir volume ali. A coluna de vistas indica em quais projeções do atlas a região aparece.

CRÂNIO E FACE SUPERIOR

Região frontal

ANTERIOR · LATERAL

LIMITES Abaixo, a glabella e as margens supraorbitais; lateralmente, a linha temporal superior, que a separa da região temporal; acima, o limite convencional com a região parietal.

DE NOTA Ventre frontal do occipitofrontal. Nas margens supraorbitais emergem os feixes supraorbital e supratroclear — o pedículo que irriga a fronte e que se anastomosa com a circulação oftálmica.

Região parietal

ANTERIOR · LATERAL · DORSAL

LIMITES À frente, a região frontal; atrás, a occipital; abaixo e nos lados, a temporal, pela linha temporal superior.

DE NOTA Gálea aponeurótica sobre o osso parietal. Plano de deslizamento pouco vascularizado entre a gálea e o pericrânio.

Região occipital

LATERAL · DORSAL

LIMITES Abóbada posterior sobre o osso occipital, até a linha nugal superior, onde começa a região cervical posterior.

DE NOTA Ventre occipital do occipitofrontal; nervo occipital maior e artéria occipital, que ascendem atravessando a inserção do trapézio.

Região temporal

ANTERIOR · LATERAL · DORSAL

LIMITES Acima, a linha temporal superior; abaixo, o arco zigomático, que a separa da região infratemporal.

DE NOTA Músculo temporal na fossa temporal, sob a fáscia temporal. Artéria e veia temporais superficiais e nervo auriculotemporal sobem à frente do trago. A fossa é uma concavidade que se aprofunda com a idade.

Região infratemporal

ANTERIOR · LATERAL

LIMITES Abaixo do arco zigomático, medialmente ao ramo da mandíbula. Na superfície, uma faixa estreita à frente do pavilhão auricular.

DE NOTA Fossa infratemporal: músculos pterigóideos, artéria maxilar, plexo venoso pterigóideo e ramos do nervo mandibular. Região profunda, de acesso indireto.

Região auricular

ANTERIOR · LATERAL · DORSAL

LIMITES O pavilhão auricular e a área periauricular imediata.

DE NOTA Cartilagem auricular; ramos da artéria auricular posterior e da temporal superficial; nervo auricular magno.

Região mastóidea

LATERAL · DORSAL

LIMITES Atrás do pavilhão, sobre o processo mastóideo; abaixo, a inserção do esternocleidomastóideo.

DE NOTA Processo mastóideo — origem do esternocleidomastóideo. Ponto de reparo para a extremidade superior do músculo.

FACE MÉDIA

Região orbital

ANTERIOR · LATERAL · INFERIOR

LIMITES Acima, a margem supraorbital; abaixo, a margem infraorbital; medialmente, a raiz do nariz; lateralmente, o rebordo orbital lateral.

DE NOTA Pálpebras e conteúdo orbital. Território da artéria oftálmica — a razão pela qual a região não tolera manobras que possam gerar fluxo retrógrado. Sulcos palpebrais e o sulco nasojugal medialmente.

Região infraorbital

ANTERIOR · LATERAL · INFERIOR

LIMITES Acima, a margem infraorbital; medialmente, a região nasal; lateralmente, a zigomática; abaixo, as regiões bucal e oral.

DE NOTA Forame infraorbital, com o nervo e os vasos infraorbitais, cerca de um centímetro abaixo da margem orbital, na vertical da pupila. A artéria angular sobe medialmente, junto ao sulco nasojugal.

Região nasal

ANTERIOR · LATERAL · INFERIOR

LIMITES Raiz, dorso, ápice, asas e base do nariz, com as narinas.

DE NOTA Artéria dorsal do nariz (ramo da oftálmica) e ramos nasais laterais e columelar da angular/facial — uma anastomose direta com a circulação oftálmica. Pele fina e aderente no dorso, espessa e sebácea no ápice.

Região zigomática

ANTERIOR · LATERAL · INFERIOR

LIMITES Sobre o osso e o arco zigomáticos; acima, as regiões orbital e temporal; medialmente, a infraorbital; abaixo, as regiões bucal e parotidomassetérica.

DE NOTA Eminência malar — o ponto mais projetado do terço médio. Forames zigomaticofacial e zigomaticotemporal; a artéria transversa da face cruza a região horizontalmente.

FACE INFERIOR

Região oral

ANTERIOR · LATERAL · INFERIOR

LIMITES Acima, a base do nariz; lateralmente, os sulcos nasolabiais; abaixo, o sulco labiomentual.

DE NOTA Orbicular da boca; artérias labiais superior e inferior, ramos da facial, correndo logo abaixo do vermelhão — o plano que define a profundidade segura no lábio. Colunas do filtro e arco do cupido definem o desenho.

Região bucal

ANTERIOR · LATERAL · INFERIOR

LIMITES Acima, as regiões infraorbital e zigomática; medialmente, a região oral; abaixo, a margem da mandíbula; lateralmente, a região parotidomassetérica.

DE NOTA Bucinador e corpo adiposo da bochecha (bola de Bichat). A artéria e a veia faciais cruzam a região obliquamente; o ducto parotídeo perfura o bucinador na altura do segundo molar superior.

Região parotídeomassetérica

ANTERIOR · LATERAL · DORSAL · INFERIOR

LIMITES Acima, o arco zigomático; abaixo, a margem da mandíbula; atrás, o pavilhão auricular; à frente, a margem anterior do masseter.

DE NOTA Glândula parótida e masseter. Os ramos do nervo facial emergem na margem anterior da glândula em leque; veia retromandibular e artéria transversa da face. É a região que define o contorno do ângulo mandibular.

Região mental

ANTERIOR · LATERAL · INFERIOR

LIMITES Acima, o sulco labiomentual; lateralmente, continua-se com as regiões bucal e oral; abaixo, a margem inferior da mandíbula.

DE NOTA Protuberância mental, mental e abaixador do lábio inferior. Forame mental, com o nervo e os vasos mentuais, habitualmente abaixo do segundo pré-molar, a meia altura do corpo da mandíbula.

Fossa retromandibular

LATERAL

LIMITES Entre a margem posterior do ramo da mandíbula, o processo mastóideo e a margem anterior do esternocleidomastóideo.

DE NOTA Depressão que aloja o polo posterior da parótida e a veia retromandibular.

PESCOÇO

Região esternocleidomastóidea

ANTERIOR · LATERAL · DORSAL · INFERIOR

LIMITES Sobre o músculo homônimo, do processo mastóideo e do occipital, acima, ao esterno e à clavícula, abaixo.

DE NOTA Esternocleidomastóideo; profundamente, a bainha carotídea. A veia jugular externa cruza a face superficial do músculo obliquamente. No meio da margem posterior está o ponto nervoso do pescoço, onde emergem os ramos cutâneos do plexo cervical.

Trígono submental

LATERAL · INFERIOR

LIMITES Entre os ventres anteriores dos digástricos e o corpo do hioide.

DE NOTA Linfonodos submentuais; assoalho formado pelos milo-hióideos.

Trígono submandibular

LATERAL · INFERIOR

LIMITES Entre a margem inferior da mandíbula e os dois ventres do digástrico.

DE NOTA Glândula submandibular, linfonodos, artéria facial ao emergir sob a mandíbula.

Triângulo carótico

LATERAL · INFERIOR

LIMITES Entre o esternocleidomastóideo, o ventre posterior do digástrico e o ventre superior do omo-hióideo.

DE NOTA Bifurcação da carótida comum, veia jugular interna, nervo vago e alça cervical.

Trígono muscular (omotraqueal)

ANTERIOR · LATERAL · INFERIOR

LIMITES Entre a linha mediana do pescoço, o ventre superior do omo-hióideo e a margem anterior do esternocleidomastóideo.

DE NOTA Músculos infra-hióideos, laringe, traqueia e glândula tireoide. A proeminência laríngea é o reparo de superfície mais evidente na morfologia masculina.

Região cervical lateral

ANTERIOR · LATERAL · DORSAL · INFERIOR

LIMITES Entre a margem posterior do esternocleidomastóideo, a margem anterior do trapézio e a clavícula — o trígono posterior.

DE NOTA Nervo acessório, ramos do plexo cervical e, na base, os troncos do plexo braquial e a artéria subclávia.

Região cervical posterior

ANTERIOR · LATERAL · DORSAL

LIMITES Atrás da margem anterior do trapézio, da linha nugal superior à base do pescoço — a nuca.

DE NOTA Trapézio e musculatura nugal profunda; nervo occipital maior.

Acidentes de superfície

DORSAL · INFERIOR

LIMITES Fossa jugular (supraesternal), fossa supraclavicular menor e maior, e a vértebra proeminente (C7).

DE NOTA Reparos ósseos e depressões usados para orientar a descrição das regiões cervicais; a C7 é o primeiro processo espinhoso nitidamente palpável na nuca.

Sobre a masculinização da figura

As pranchas de origem usam uma figura feminina. O redesenho alterou o que é dimorfismo real e nada mais: crânio mais quadrado com abóbada menos arredondada; largura bigonial maior em relação à bizigomática, com ângulo mandibular marcado; arco supraorbital reto e mais baixo, com supercílios mais horizontais; dorso nasal mais alto e reto; lábio superior mais longo e vermelhão mais fino; proeminência laríngea visível; esternocleidomastóideo mais definido. Os **limites das regiões não mudam com o sexo** — são os mesmos da prancha original.

O que ainda não está desenhado

O atlas de origem traz quatro projeções. Aqui está desenhada a **vista anterior** — a que corresponde às figuras já usadas no livro. As vistas **lateral**, **dorsal** e **inferior** estão cobertas no glossário, incluindo as regiões que só nelas aparecem (occipital, mastóidea, fossa retromandibular, os trígonos cervicais e os acidentes de superfície), mas ainda não têm prancha própria.

Nomenclatura conforme a Terminologia Anatomica. Figura e limites redesenhados em vetor — a prancha amplia sem perda de definição. As referências vasculares e nervosas são reparos anatômicos de superfície, não orientação de técnica.