## Matemática Discreta I - 2020 - $2^{\text{do}}$ semestre

# Práctico 4: Principio del Palomar y de Inclusión-Exclusión.

Ref. Grimaldi $5.5,\,8.1$ y8.3

#### Principio del Palomar

**Ejercicio 1** Una prueba consiste de seis preguntas multiple opción, con cuatro opciones cada una. ¿Cuántos estudiantes deben realizar esta prueba para asegurarnos que al menos dos entreguen las mismas respuestas de múltiple opción? Tener en cuenta las posibles respuestas en blanco.

**Ejercicio 2** Demuestre que cualquier subconjunto de seis elementos del conjunto  $S = \{1, 2, ..., 9\}$  debe contener dos elementos cuya suma sea 10.

**Ejercicio 3** Dados cinco punto de un cuadrado de lado 2, pruebe que deben haber dos que estén a distancia menor o igual que  $\sqrt{2}$ .

### Ejercicio 4 (1<sup>er</sup> Par. setiembre 2009 Ei3)

Se consideran n puntos en un triángulo equilátero de lado 1. ¿Cuál es el n mínimo que garantiza que al menos dos de los puntos se encuentran a distancia menor o igual que 1/2? (Observación: Vale colocar puntos sobre los lados del triángulo).

**Ejercicio 5** Demuestre que entre 100.000 personas hay al menos dos que nacieron exactamente en el mismo horario del dia (hora, minuto y segundo).

**Ejercicio 6** Pruebe que al menos uno de m enteros consecutivos es divisible por m.

#### **Ejercicio 7** (Examen Marzo 2003)

Halle el menor natural n tal que dados n dígitos diferentes se puede asegurar que existen dos de ellos cuyos cuadrados diferirán en un múltiplo de 6.

#### Ejercicio 8 (Examen de Julio 2004 Ej 5)

Sea un tablero de 141 filas y 8 columnas. Cada cuadradito del tablero se pinta de blanco o de negro de forma tal que cada fila tenga exactamente cuatro cuadraditos pintados de negro. Demuestre que hay al menos tres filas con igual secuencia de colores.

**Ejercicio 9** Dada una secuencia  $(x_1, \ldots, x_n)$  de números, decimos que  $(x_{i_1}, \ldots, x_{i_k})$  es una subsecuencia si se verifica  $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$ .

- a. Mostrar que toda secuencia de  $n^2 + 1$  números reales distintos  $(a_1, \ldots, a_{n^2+1})$  posee una subsecuencia creciente o bien una decreciente de n+1 números. (*Pique*: para cada elemento  $x_i$  considerar  $t_i$  el largo de la mayor subsecuencia creciente comenzando en  $x_i$ .)
- b. Encuentre una secuencia de  $n^2$  números naturales distintos donde el resultado de la parte  $\mathbf{a}$ . no se cumpla.

#### Principio de Inclusión-Exclusión

**Ejercicio 10** De 100 estudiantes, 32 estudian matemática, 20 física, 45 biología, 15 matemática y biología, 7 matemática y física, 10 física y biología, 30 no estudian ninguna de las tres materias.

- a. Encuentre el número de estudiantes que estudian las tres materias.
- b. Encuentre el número de estudiantes que estudian exactamente una de las tres materias.

**Ejercicio 11** ¿De cuántas formas pueden extraerse 9 canicas de una bolsa si hay 3 de cada uno de los siguientes colores: blanco, rojo, azul, negro?

Ejercicio 12 ¿Cuántos enteros entre 1 y 9.999.999 inclusive tienen a 31 como suma de sus dígitos?

#### Ejercicio 13

- a. ¿Cuántos enteros entre 1 y 105 inclusive no son divisibles por ninguno de los enteros 3, 5, 7?
- **b.** ¿Cuántos enteros entre 1 y 1155 inclusive son múltiplos de 3 pero no son divisibles por ninguno de los enteros 5,7 y 11? (Exam. julio 2000 Ej. 9)

**Ejercicio 14** ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 19$  si  $x_i$  es un entero y

- **a.**  $0 \le x_i \le 8$  para todo i?
- **b.**  $0 \le x_1 \le 5, 0 \le x_2 \le 6, 3 \le x_3 \le 7 \text{ y } 0 \le x_4 \le 8?$

#### Ejercicio 15 (Exam. Diciembre 2009)

Se tira un dado 6 veces. Calcule la cantidad de formas en que podemos obtener un número múltiplo de 18 como suma de las 6 tiradas del dado. (Obs. importa el orden en que hayan salido los números)

**Ejercicio 16** (1<sup>er</sup> parcial mayo de 2017 Ej5) Hallar la cantidad de permutaciones de 123456 que cumplen que ningún dígito par está en su ubicación original.

Ejercicio 17 Calcule cuántas permutaciones de los dígitos del número 123456789 cumplen que:

- a. Ningún dígito está en su posición original.
- b. Los pares no están en su posición original.
- c. Los pares no están en su posición natural y la secuencia debe empezar con los dígitos 1, 2, 3, 4 en algún orden.

Ejercicio 18 ¿Cuántas palabras de 4 letras pueden formarse usando las letras A, B, C, D, E si debe aparecer al menos una vocal?