

PRÁCTICO 10: OPERADORES ORTOGONALES Y UNITARIOS.

A menos que se indique lo contrario, considerar en \mathbb{R}^n y en \mathbb{C}^n los productos internos usuales, en $\mathbb{R}_n[x]$ el producto interno $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx$ y en $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ el producto interno $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^t)$.

1. Isometrías, operadores ortogonales y unitarios

EJERCICIO 1. Probar que las siguientes transformaciones lineales son isometrías y determinar si son sobreyectivas.

A. $T : \mathbb{R}_1[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(p) = (a + \frac{b}{2}, \frac{b}{2\sqrt{3}})$ si $p(x) = a + bx$.

B. $T : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que

$$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \left(\frac{-a+2b+2c}{3}, \frac{2a-b+2c}{3}, \frac{2a+2b-c}{3}, d\right).$$

C. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ tal que

$$T(x, y) = \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

EJERCICIO 2.

A. Sea $T : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ tal que

$$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} d & a \\ b & c \end{pmatrix}.$$

Probar que T es ortogonal.

B. Sea $T : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ tal que $T(1, 1) = (-i, i)$ y $T(1, -1) = (i, i)$. Probar T es unitaria.

C. Se considera \mathbb{R}^4 con el producto interno habitual. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que

$$\begin{aligned} T(2, 2, 2, 2) &= (4, 0, 0, 0), & T(2, 0, 2, 2) &= (3, -1, 1, 1), \\ T(2, 2, 0, 2) &= (3, 1, -1, 1), & T(2, 2, 2, 0) &= (3, 1, 1, -1). \end{aligned}$$

¿Es T es ortogonal?

EJERCICIO 3. Probar que la composición de transformaciones lineales unitarias (ortogonales) es unitaria (ortogonal).

EJERCICIO 4. ¿Existe un operador unitario $T : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ que cumpla que $T(1, 1) = e^{i(2+i)}(1, 1)$?

EJERCICIO 5. Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre el cuerpo \mathbb{C} (o \mathbb{R}) y T un operador lineal en V . Probar que:

A. Si T es autoadjunto y unitario (u ortogonal) $\Rightarrow T^2 = Id$.

B. Si T es autoadjunto y $T^2 = Id \Rightarrow T$ es unitario (u ortogonal).

C. Si T es unitario (u ortogonal) y $T^2 = I \Rightarrow T$ es autoadjunto.

EJERCICIO 6. Sea V un espacio con producto interno de dimensión finita sobre el cuerpo \mathbb{C} (o \mathbb{R}) y $S \subset V$ un subespacio no trivial.

- A. Si T es un operador unitario en V y S es invariante bajo T , probar que $T|_S$ es un operador unitario (u ortogonal) en S .
- B. Si $T : S \rightarrow V$ es una transformación lineal tal que $\|T(s)\| = \|s\| \quad \forall s \in S$, probar que existe un operador unitario (u ortogonal) $\tilde{T} : V \rightarrow V$ tal que $\tilde{T}(s) = T(s) \quad \forall s \in S$.

EJERCICIO 7. [Segundo parcial 1999.] Sea $T : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ tal que $T(1, 0, 0) = (1, 0, 0)$, $T(0, 1, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, i, i)$, $T(0, 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)$. Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Justificar.

- A. T es unitaria.
- B. T preserva la norma.
- C. $T|_S : S \rightarrow S$ es unitaria donde $S = \{(x, y, z) : x = 0\}$.

2. Representación matricial. Matrices ortogonales y unitarias

EJERCICIO 8.

- A. Hallar todas las matrices ortogonales cuya primera columna sea colineal con $(1, 1)$.
- B. Hallar todas las matrices unitarias cuya primera columna sea colineal con $(1, 1 - i)$.

EJERCICIO 9. Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

- A. Probar que A es ortogonal $\Leftrightarrow A^t$ es ortogonal.
- B. Deducir que A es ortogonal \Leftrightarrow sus filas forman una base ortonormal de \mathbb{R}^n , considerado con el producto interno habitual.
- C. Enunciar y demostrar el resultado análogo para matrices complejas unitarias.

EJERCICIO 10.

- A. Mostrar que la matriz $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\theta} & e^{-i\theta} \\ ie^{i\theta} & -ie^{-i\theta} \end{pmatrix}$ es unitaria para todo $\theta \in \mathbb{R}$.
- B. Mostrar que si P es una matriz ortogonal entonces $e^{i\theta}P$ es unitaria para todo $\theta \in \mathbb{R}$.

EJERCICIO 11. Demostrar que la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{C})$ es unitaria y determinar

D diagonal y P unitaria tal que $A = PD\bar{P}^t$

EJERCICIO 12.

- A. Verificar que la matriz A es unitaria y hallar una matriz unitaria P tal que $D = \bar{P}^t A P$ sea diagonal.

(a) $A = \begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (b) $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- B. Observar que las matrices de las partes (b) y (c) son ortogonales. ¿Existe una matriz ortogonal P tal que $D = P^t A P$ sea diagonal?

EJERCICIO 13.

- A. Sea $\theta \in \mathbb{R}$, se considera en \mathbb{R}^2 con el producto interno usual el operador $R_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$c(R_\theta)c = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

donde \mathcal{C} es la base canónica de \mathbb{R}^2 .

a) Probar que R_θ es ortogonal $\forall \theta \in \mathbb{R}$.

b) Determinar los valores de $\theta \in \mathbb{R}$ para los cuales R_θ es diagonalizable.

B. Se considera, en \mathbb{C}^2 con el producto interno usual, el operador $U : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ tal que:

$$U(1, i) = (e^{i\theta}, ie^{i\theta}) \quad \text{y} \quad U(1, -i) = (e^{-i\theta}, -ie^{-i\theta})$$

a) Probar que U es unitario.

b) Hallar una base ortonormal de \mathbb{C}^2 en la cual U se diagonaliza.

c) Tomando combinaciones lineales de $(1, i)$ y $(1, -i)$ construir una base \mathcal{B} de \mathbb{C}^2 cuyas componentes sean reales y tal que

$${}_{\mathcal{B}}(U)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$