



Revisão Acelerada de Programação - RAP RAP-2026, Marinha do Brasil

Centro de Instrução Almirante Alexandrino
Centro de Coordenação de Pós-Graduação
Curso de Aperfeiçoamento em Guerra Acústica

Professor: João Victor da Fonseca Pinto

Leia as instruções antes de fazer a lista:

Não utilize laços de repetição, condicionais ou recursão nessa lista. Não utilize nenhum módulo, método ou função já existente no Python exceto pela função `print`.

- Q1.** Escreva uma função em Python que recebe por argumento o preço de um item do mercado em reais e o seu peso em kg e retorna a quantidade de reais por grama deste produto.
- Q2.** Escreva uma função em Python que receba como argumento um número x e que retorne um número y dado pela função abaixo:

$$y = x^{5/3} + \frac{x^2 - 8x}{10} - \left(\frac{5x^4 + 9x^3 - 10x^2}{x^5 + 2} \right)^{1/2}$$

- Q3.** A física nos diz que é possível descrever o movimento de corpos quando estes se movem em linha reta e sem aceleração (isto é, com velocidade constante), de acordo com a seguinte fórmula:

$$s = s_0 + v \cdot \Delta t$$

onde s é a posição final, s_0 é a posição inicial, v é a velocidade em que o corpo está se movendo e Δt é o intervalo de tempo decorrido para que objeto vá de s_0 a s com essa velocidade. Este tipo de movimento é chamado de movimento retilíneo uniforme (MRU). Escreva uma função em Python que recebe por argumento a posição inicial (s_0), a posição final (s) e o intervalo de tempo (Δt) e retorna a velocidade de um corpo se movendo em MRU.

- Q4.** Escreva uma função em Python que recebe uma temperatura em Kelvin e retorna o seu equivalente em Fahrenheit sabendo que:

$$\frac{T_{\text{Fahrenheit}} - 32}{9} = \frac{T_{\text{Kelvin}} - 273}{5}$$

- Q5.** Escreva uma função que calcule o perímetro de um retângulo sabendo que valores são passados por argumento: o valor da sua diagonal e de um dos lados (nessa ordem). Lembre-se que a diagonal do retângulo pode ser pensada como a hipotenusa do triângulo formado por dois lados adjacentes e a diagonal. Lembre-se também que não é permitido importar nenhum módulo ou usar funções prontas do Python. O cálculo de uma raiz quadrada pode ser feito elevando a 0.5.
- Q6.** A média, a variância e o desvio padrão são medidas muito utilizadas em estatística. A média é um valor que demonstra a concentração dos dados de uma distribuição como um ponto de equilíbrio. Já a variância e o desvio padrão são usados para indicar o quanto um conjunto de

dados se desvia da média. A diferença entre a variância e o desvio padrão é que a variância é expressa em unidades quadráticas, enquanto o desvio padrão permite uma interpretação da dispersão na mesma unidade dos dados originais. Considerando um conjunto com seis valores, a média, a variância e o desvio padrão desse conjunto são calculados da seguinte forma:

$$m = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6}{6}$$

$$V = \frac{(x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + (x_3 - m)^2 + (x_4 - m)^2 + (x_5 - m)^2 + (x_6 - m)^2}{6} = \sigma^2,$$

onde m é a média, V é a variância e σ é o desvio padrão. Escreva uma função em Python que recebe seis números por argumento, e calcula e retorna a média m , a variância V e o desvio padrão σ , nesta ordem. Lembre-se que não é permitido importar nenhum módulo ou usar funções prontas do Python.