PROFIL · À VOTRE RYTHME

Votre point de départ

Répondez seul, sans recherche. « Je ne sais pas encore » est utile. Ce diagnostic ne classe pas les étudiants et ne compte pas dans l'évaluation.

- Donnez un pseudonyme de suivi ; aucune donnée personnelle n'est nécessaire.
- Évaluez votre aisance de 0 (découverte) à 3 (autonomie) : fichiers et dossiers ; programmation ; tableaux ; statistiques ; terminal.
- Quel outil avez-vous utilisé : Excel, SQL, Python, R, autre, aucun ? Donnez un exemple concret.
- Quelle difficulté anticipez-vous : écrire du code, lire une erreur, choisir une analyse, interpréter, prendre la parole ?
- Quel appui vous aide : mémo, exemple minimal, schéma, pair ? Ce choix peut changer.

> CONTRAT D'APPRENTISSAGE
>
> Chaque étudiant produit son script et son interprétation. Les échanges servent à expliquer et vérifier ; ils ne remplacent pas le travail personnel.

SITUATIONS · RÉPONSES ET REPRISE

Raisonner avant de calculer

- 1. Les délais valent 10, 12, 14, 100 minutes. Quel indicateur décrit un délai « typique » ? Justifiez.
- 2. Un délai est absent. Est-il équivalent à zéro ? Que vérifier avant une moyenne ?
- 3. B a une moyenne plus basse que A sur 20 tickets. Cela prouve-t-il une amélioration ? Citez une information manquante.
- 4. p = 0,04 est-il la probabilité que B soit meilleur ? Reformulez ce que vous pensez savoir.
- 5. Un IC de B − A vaut [−12 ; 3] minutes. Quelle incertitude décrit-il ? Peut-on conclure que les workflows sont identiques ?
- 6. Deux partitions contiennent 2 et 8 tickets, de moyennes 10 et 20. La moyenne globale est-elle la moyenne simple des deux moyennes ? Expliquez.

SORTIE INDIVIDUELLE

Choisissez une question à reprendre et notez votre prochaine action. Ce diagnostic ne bloque pas le démarrage ; vos hésitations servent à choisir une aide. Le coach peut vous aider à interpréter une réponse. Le critère de réussite est de pouvoir expliquer et refaire, pas de tout savoir avant le cours.

VÉRIFICATION SÉPARÉE

Comparer après votre tentative

Question	Réponse possible
1	Médiane = 13 minutes ; moyenne = 34 minutes. La valeur 100 éloigne la moyenne des trois premières valeurs. Justifier selon la question, pas selon un indicateur toujours supérieur.
2	Non. Compter les valeurs présentes et annoncer le dénominateur ; comprendre la cause du manque avant toute décision.
3	Non. Il manque notamment dispersion, incertitude, comparabilité des groupes et contexte de collecte.
4	Non. p est la probabilité, sous H0 et les hypothèses du test, d'un résultat au moins aussi extrême ; ce n'est pas la probabilité que B soit meilleur.
5	L'IC concerne la différence de moyennes. Il contient zéro et d'autres différences : cela ne prouve pas l'égalité.
6	Non : pondérer par les effectifs. (2×10+8×20)/10 = 18 ; la moyenne simple 15 donne le même poids à des partitions de tailles différentes.

Refermez les réponses puis expliquez une question avec vos mots. Ces réponses sont formatives et ne produisent aucune note automatique.