



Hoofdstuk 5

Integratietechnieken

5.1 De onbepaalde integraal

- 5.1.1 De onbepaalde integraal, fundamentele integralen
- 5.1.2 Integratie door splitsing

5.2 Integratie door substitutie

- 5.2.1 Substitutieregel
- 5.2.2 Enkele typevoorbeelden
- 5.2.3 Bijkomende fundamentele integralen
- 5.2.4 Substitutie bij bepaalde integralen


5.3 Partiële integratie

- 5.3.1 Methode van de partiële integratie
- 5.3.2 Enkele typevoorbeelden
- 5.3.3 Partiële integratie bij bepaalde integralen

U 5.4 Integratie van rationale functies

- 5.4.1 De noemer is van de eerste graad
- 5.4.2 De noemer is van de tweede graad en ontbindbaar in factoren van de eerste graad
- 5.4.3 De noemer is van de tweede graad en niet ontbindbaar in factoren van de eerste graad
- 5.4.4 De graad van de noemer is groter dan twee

U 5.5 Integratie van irrationale functies



Opdracht 1 bladzijde 84

Bepaal alle primitieve functies van

1 $f: x \mapsto x^2$

$$F(x) = \frac{x^3}{3} + c \quad \text{want} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{3} \right) = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 = x^2$$

2 $f: x \mapsto \cos x$

$$F(x) = \sin x + c \quad \text{want} \quad \frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$$

3 $f: x \mapsto e^x + 3^x$

$$F(x) = e^x + \frac{3^x}{\ln 3} + c \quad \text{want} \quad \frac{d}{dx} \left(e^x + \frac{3^x}{\ln 3} \right) = e^x + \frac{1}{\ln 3} \cdot 3^x \cdot \ln 3 = e^x + 3^x$$

Opdracht 2 bladzijde 86

Bereken de onbepaalde integralen.

1 $\int dx = \int 1 \cdot dx = x + c$

2 $\int \frac{1}{x^5} dx = \int x^{-5} dx = \frac{x^{-4}}{-4} + c = -\frac{1}{4x^4} + c$

3 $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + c$

4 $\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$

5 $\int \sqrt[3]{x} dx = \int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + c = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + c$

6 $\int \frac{x^2}{\sqrt{x}} dx = \int x^{2-\frac{1}{2}} dx = \int x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + c = \frac{2}{5} \sqrt{x^5} + c$

Opdracht 3 bladzijde 86Bepaal het voorschrift van f als

1 $f'(x) = x^3$ en $f(1) = 0$

$$f(x) = \frac{x^4}{4} + c$$

$$f(1) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{4} + c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{1}{4}$$

$$2 \quad f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ en } f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$f(x) = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \tan \frac{\pi}{4} + c = 1 \Leftrightarrow 1 + c = 1 \Leftrightarrow c = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = \tan x$$

Opdracht 4 bladzijde 87

Bereken de onbepaalde integralen.

$$1 \quad \int \left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$= \int \left(x^{\frac{3}{2}} + x^{-2} \right) dx = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + \frac{x^{-1}}{-1} + c = \frac{2}{5} \sqrt{x^5} - \frac{1}{x} + c$$

$$2 \quad \int \frac{1 + \cos^2 x}{\cos^2 x} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + 1 \right) dx = \tan x + x + c$$

$$3 \quad \int \cot^2 x dx$$

$$= \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx = \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1 \right) dx = -\cot x - x + c$$

Opdracht 5 bladzijde 89

Bewijs: $\int r \cdot f(x) dx = r \cdot \int f(x) dx$ met $r \in \mathbb{R}_0$.

Bewijs:

$$\frac{d}{dx} \left[r \cdot \int f(x) dx \right]$$

$$= r \cdot \frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) \quad \text{afgeleide van een veelvoud}$$

$$= r \cdot f(x) \quad \text{gevolg definitie onbepaalde integraal}$$

Hieruit volgt dat $r \cdot \int f(x) dx$ een primitieve functie is van $r \cdot f(x)$.

Volgens de definitie van de onbepaalde integraal geldt dan: $\int r \cdot f(x) dx = r \cdot \int f(x) dx + c$.

Omdat $r \cdot \int f(x) dx$ al een integratieconstante bevat, geldt dus: $\int r \cdot f(x) dx = r \cdot \int f(x) dx$.

Opdracht 6 bladzijde 89

Bereken

$$1 \quad \int \left(2x^7 - \frac{5}{x} - 4 \sin x \right) dx = 2 \cdot \frac{x^8}{8} - 5 \ln |x| + 4 \cos x + c = \frac{x^8}{4} - 5 \ln |x| + 4 \cos x + c$$

$$2 \quad \int (e^x + x^e) dx = e^x + \frac{x^{e+1}}{e+1} + c$$

Opdracht 7 bladzijde 89

1 Toon met voorbeelden aan dat

$$a \quad \int f(x) \cdot g(x) dx \neq \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$$

Voorbeeld

$$\int x(x+1) dx = \int (x^2 + x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + c$$

$$\begin{aligned} \int x dx \cdot \int (x+1) dx &= \left(\frac{x^2}{2} + c_1 \right) \cdot \left(\frac{x^2}{2} + x + c_2 \right) \\ &= \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{2} + c_2 \frac{x^2}{2} + c_1 \frac{x^2}{2} + c_1 x + c_1 c_2 \\ &\neq \int x(x+1) dx \end{aligned}$$

$$b \quad \int \frac{f(x)}{g(x)} dx \neq \frac{\int f(x) dx}{\int g(x) dx}$$

Voorbeeld

$$\int \frac{x^2}{x} dx = \int x dx = \frac{x^2}{2} + c$$

$$\frac{\int x^2 dx}{\int x dx} = \frac{\frac{x^3}{3} + c_1}{\frac{x^2}{2} + c_2} \neq \int \frac{x^2}{x} dx$$

2 Bereken de onbepaalde integralen.

$$\begin{aligned} a \quad \int (3-x)\sqrt{x} dx &= \int \left(3x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} \right) dx = 3 \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + c \\ &= 2\sqrt{x^3} - \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b} \quad \int \frac{x^4 - 3x^3 + 5x - 1}{x^2} dx &= \int \left(x^2 - 3x + \frac{5}{x} - x^{-2} \right) dx \\ &= \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 5 \ln |x| + \frac{1}{x} + c \end{aligned}$$

$$\text{c} \quad \int (x+2)(x^2-2x+4) dx = \int (x^3+8) dx = \frac{x^4}{4} + 8x + c$$

Opdracht 8 bladzijde 89

Bepaal het voorschrift van f als

$$1 \quad f''(x) = x - 3, f'(0) = 1 \text{ en } f(0) = 4$$

$$f'(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + c$$

$$f'(0) = 1 \Leftrightarrow c = 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + 1$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{3}{2}x^2 + x + c$$

$$f(0) = 4 \Leftrightarrow c = 4$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{3}{2}x^2 + x + 4$$

$$2 \quad f''(x) = \sin x, f'(\pi) = 1 \text{ en } f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

$$f'(x) = -\cos x + c$$

$$f'(\pi) = 1 \Leftrightarrow -(-1) + c = 1 \Leftrightarrow c = 0$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\cos x$$

$$\Rightarrow f(x) = -\sin x + c$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1 \Leftrightarrow 1 + c = -1 \Leftrightarrow c = -2$$

$$\Rightarrow f(x) = -\sin x - 2$$

Opdracht 9 bladzijde 90

1 We weten dat $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$.

Toon aan dat $\int (13x + 5)^2 dx \neq \frac{(13x + 5)^3}{3} + c$.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{(13x + 5)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} \cdot 3(13x + 5)^2 \cdot 13 = 13(13x + 5)^2,$$

dus $\int (13x + 5)^2 dx \neq \frac{(13x + 5)^3}{3} + c$

2 Bepaal $f(x)$ als $\int f(x) dx = \frac{(13x + 5)^3}{3} + c$.

$$f(x) = 13(13x + 5)^2$$

want $\frac{(13x + 5)^3}{3}$ is een primitieve functie van $13(13x + 5)^2$,

zie vraag 1

Opdracht 10 bladzijde 90

Bepaal $f(x)$ als $\int f(x) dx = \sin(x^2) + c$.

$$\frac{d}{dx} [\sin(x^2)] = 2x \cos(x^2)$$

dus $f(x) = 2x \cos(x^2)$

Opdracht 11 bladzijde 92

Bereken

1 $\int \cos 4x dx$ $u = 4x \Rightarrow du = 4dx \Rightarrow dx = \frac{1}{4} du$

$$= \frac{1}{4} \int \cos u du = \frac{1}{4} \sin u + c = \frac{1}{4} \sin 4x + c$$

2 $\int (7x - 5)^4 dx$ $u = 7x - 5 \Rightarrow du = 7dx \Rightarrow dx = \frac{1}{7} du$

$$= \frac{1}{7} \int u^4 du = \frac{1}{7} \cdot \frac{u^5}{5} + c = \frac{1}{35} (7x - 5)^5 + c$$

3 $\int \frac{dx}{-4x + 5}$ $u = -4x + 5 \Rightarrow du = -4 dx \Rightarrow dx = -\frac{1}{4} du$

$$= -\frac{1}{4} \int \frac{du}{u} = -\frac{1}{4} \ln |u| + c = -\frac{1}{4} \ln |-4x + 5| + c$$

$$\begin{aligned}
 4 \quad \int \frac{dx}{1+81x^2} &= \int \frac{dx}{1+(9x)^2} & u=9x \Rightarrow du=9dx \Rightarrow dx &= \frac{1}{9} du \\
 &= \frac{1}{9} \int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{9} \operatorname{Bgtan} u + c = \frac{1}{9} \operatorname{Bgtan} (9x) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5 \quad \int e^{-5x+3} dx & \quad u = -5x + 3 \Rightarrow du = -5dx \Rightarrow dx = -\frac{1}{5} du \\
 &= -\frac{1}{5} \int e^u du = -\frac{1}{5} e^u + c = -\frac{1}{5} e^{-5x+3} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6 \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-6x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{1-(\sqrt{6}x)^2}} & u = \sqrt{6}x \Rightarrow du = \sqrt{6}dx \Rightarrow dx &= \frac{1}{\sqrt{6}} du \\
 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{Bgsin} u + c = \frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{Bgsin} (\sqrt{6}x) + c
 \end{aligned}$$

Opdracht 12 bladzijde 95

De volgende integralen zijn van het type $\int (f(x))^r \cdot f'(x) dx$. Bereken ze met een geschikte substitutie.

$$\begin{aligned}
 1 \quad \int \frac{dx}{(2x-5)^4} &= \int (2x-5)^{-4} dx & u=2x-5 \Rightarrow du=2dx \\
 &= \frac{1}{2} \int u^{-4} du = \frac{1}{2} \frac{u^{-3}}{-3} + c = -\frac{1}{6u^3} + c = -\frac{1}{6(2x-5)^3} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \quad \int \frac{x^3}{\sqrt{x^4+2}} dx & \quad u = x^4 + 2 \Rightarrow du = 4x^3 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{1}{4} \int u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{4} \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c = \frac{1}{2} \sqrt{u} + c \\
 &= \frac{1}{2} \sqrt{x^4+2} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3 \quad \int \frac{\sin x}{\cos^5 x} dx & \quad u = \cos x \Rightarrow du = -\sin x dx \\
 &= -\int u^{-5} du = -\frac{u^{-4}}{-4} + c = \frac{1}{4u^4} + c = \frac{1}{4 \cos^4 x} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4 \quad \int \frac{\operatorname{Bgtan} x}{1+x^2} dx & \quad u = \operatorname{Bgtan} x \Rightarrow du = \frac{dx}{1+x^2} \\
 &= \int u du = \frac{u^2}{2} + c = \frac{1}{2} (\operatorname{Bgtan} x)^2 + c
 \end{aligned}$$

Opdracht 13 bladzijde 96

De volgende integralen zijn van het type $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$. Bereken ze met een geschikte substitutie.

$$\begin{aligned} 1 \quad \int \frac{x^2}{x^3 + 5} dx \quad & u = x^3 + 5 \Rightarrow du = 3x^2 dx \\ & = \frac{1}{3} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{3} \ln |u| + c = \frac{1}{3} \ln |x^3 + 5| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad \int \frac{dx}{x \ln x} \quad & u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ & = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + c = \ln |\ln x| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad \int \frac{dx}{(1+x^2) \operatorname{Bgtan} x} \quad & u = \operatorname{Bgtan} x \Rightarrow du = \frac{dx}{1+x^2} \\ & = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + c = \ln |\operatorname{Bgtan} x| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 \quad \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx \quad & u = e^x + 1 \Rightarrow du = e^x dx \\ & = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + c = \ln |e^x + 1| + c \quad \substack{e^x + 1 > 0 \\ e^x > 0} = \ln(e^x + 1) + c \end{aligned}$$

Opdracht 14 bladzijde 96

Bereken met een geschikte substitutie.

$$\begin{aligned} 1 \quad \int \frac{\ln^2 x}{x} dx \quad & u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x} \\ & = \int u^2 du = \frac{u^3}{3} + c = \frac{\ln^3 x}{3} + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad \int \tan^2 2x dx &= \int \left(\frac{1}{\cos^2 2x} - 1 \right) dx = \int \frac{dx}{\cos^2 2x} - x \\ &\quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ 1 + \tan^2 x &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad \quad \quad \downarrow \\ &\quad \quad \quad u = 2x \\ &\quad \quad \quad du = 2dx \\ &\quad \quad \quad = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\cos^2 u} - x \\ &\quad \quad \quad = \frac{1}{2} \tan u - x + c \\ &\quad \quad \quad = \frac{1}{2} \tan 2x - x + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad \int \sin^2 x dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx \\ &\quad \downarrow \\ \cos 2x &= 1 - 2\sin^2 x \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \int \cos 2x d(2x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \sin 2x + c \end{aligned}$$

$$4 \quad \int \frac{dx}{4x^2 + 12x + 9} = \int \frac{dx}{(2x+3)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+3)}{(2x+3)^2} \\ = -\frac{1}{2} (2x+3)^{-1} + c = -\frac{1}{2(2x+3)} + c$$

$$5 \quad \int 3^{\sin^2 x} \sin 2x \, dx \quad u = \sin^2 x \Rightarrow du = 2 \sin x \cos x \, dx = \sin 2x \, dx \\ = \int 3^u du = \frac{3^u}{\ln 3} + c = \frac{3^{\sin^2 x}}{\ln 3} + c$$

$$6 \quad \int e^x \sqrt{5 - 3e^x} \, dx \quad u = 5 - 3e^x \Rightarrow du = -3e^x dx \\ = -\frac{1}{3} \int u^{\frac{1}{2}} du = -\frac{1}{3} \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = -\frac{2}{9} \sqrt{(5 - 3e^x)^3} + c$$

Opdracht 15 bladzijde 99

Bereken

$$1 \quad \int \frac{dx}{3x^2 + 2} \\ = \int \frac{dx}{(\sqrt{3}x)^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Bgtan} \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} x \right) + c = \frac{1}{\sqrt{6}} \text{Bgtan} \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} x \right) + c$$

$$2 \quad \int \frac{dx}{\sqrt{4 - 5x^2}} \\ = \int \frac{dx}{\sqrt{4 - (\sqrt{5}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{\sqrt{4 - (\sqrt{5}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{Bgsin} \left(\frac{\sqrt{5}}{2} x \right) + c$$

$$3 \quad \int \frac{dx}{\sqrt{2x^2 - 5}} \\ = \int \frac{dx}{\sqrt{(\sqrt{2}x)^2 - 5}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{\sqrt{(\sqrt{2}x)^2 - 5}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \sqrt{2}x + \sqrt{2x^2 - 5} \right| + c$$

$$4 \quad \int \frac{x}{4x^4 + 9} dx = \int \frac{x \, dx}{(2x^2)^2 + 9} \quad u = 2x^2 \Rightarrow du = 4x \, dx \\ = \frac{1}{4} \int \frac{du}{u^2 + 9} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \text{Bgtan} \frac{u}{3} + c \\ = \frac{1}{12} \text{Bgtan} \left(\frac{2}{3} x^2 \right) + c$$

$$\begin{aligned}
 5 \quad & \int \frac{\sin 2x}{\sqrt{9 - \cos^2 2x}} dx \quad u = \cos 2x \Rightarrow du = -2 \sin 2x dx \\
 & = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{9 - u^2}} = -\frac{1}{2} \operatorname{Bgsin} \frac{u}{3} + c = -\frac{1}{2} \operatorname{Bgsin} \left(\frac{\cos 2x}{3} \right) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6 \quad & \int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} + 1}} dx \quad u = e^x \Rightarrow du = e^x dx \\
 & = \int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 1}} = \ln |u + \sqrt{u^2 + 1}| + c = \ln (e^x + \sqrt{e^{2x} + 1}) + c
 \end{aligned}$$

Opdracht 16 bladzijde 101

Bereken

$$\begin{aligned}
 1 \quad & \int_2^4 \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right)^3 dx \quad u = -\frac{1}{2}x + 1 \\
 & \Rightarrow du = -\frac{1}{2} dx \\
 & x = 2 \Rightarrow u = 0 \\
 & x = 4 \Rightarrow u = -1 \\
 & = -2 \int_0^{-1} u^3 du = -2 \left[\frac{u^4}{4} \right]_0^{-1} = -\frac{1}{2} (1 - 0) = -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \quad & \int_{\frac{1}{3}}^2 \sqrt{10 - 3x} dx \quad u = 10 - 3x \\
 & \Rightarrow du = -3 dx \\
 & x = \frac{1}{3} \Rightarrow u = 9 \\
 & x = 2 \Rightarrow u = 4 \\
 & = -\frac{1}{3} \int_9^4 \sqrt{u} du = -\frac{1}{3} \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_9^4 = -\frac{2}{9} \left(4^{\frac{3}{2}} - 9^{\frac{3}{2}} \right) \\
 & = -\frac{2}{9} (8 - 27) = \frac{38}{9}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3 \quad & \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{dx}{\sqrt{1 - 3x^2}} = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{dx}{\sqrt{1 - (\sqrt{3}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{1 - (\sqrt{3}x)^2}} \\
 & = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\operatorname{Bgsin} (\sqrt{3}x) \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\operatorname{Bgsin} 1 - \operatorname{Bgsin} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
 & = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 4 \quad & \int_{-1}^1 x \sqrt{x^2 + 3} \, dx & u &= x^2 + 3 \\
 & & \Rightarrow du &= 2x \, dx \\
 & & x = -1 &\Rightarrow u = 4 \\
 & & x = 1 &\Rightarrow u = 4 \\
 & = \frac{1}{2} \int_4^4 \sqrt{u} \, du = 0 & \left(\int_a^a f(x) \, dx = 0 \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5 \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin^3 x \, dx & u &= \sin x \\
 & & \Rightarrow du &= \cos x \, dx \\
 & & x = 0 &\Rightarrow u = 0 \\
 & & x = \frac{\pi}{2} &\Rightarrow u = 1 \\
 & = \int_0^1 u^3 \, du = \left[\frac{u^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Opdracht 17 bladzijde 102

Gegeven is de functie $f: x \mapsto \cos x \cdot e^{\sin x}$.

Bereken de oppervlakte van het gekleurde gebied.



- snijpunten met de x-as:

$$\cos x \cdot e^{\sin x} = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$


$\Rightarrow -\frac{\pi}{2}$ en $\frac{\pi}{2}$ zijn de onder- en de bovengrens van de te berekenen integraal

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad A &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x e^{\sin x} \, dx & u &= \sin x \\
 & & \Rightarrow du &= \cos x \, dx \\
 & & x = -\frac{\pi}{2} &\Rightarrow u = -1 \\
 & & x = \frac{\pi}{2} &\Rightarrow u = 1 \\
 & = \int_{-1}^1 e^u \, du = \left[e^u \right]_{-1}^1 = e - e^{-1} = \frac{e^2 - 1}{e}
 \end{aligned}$$

Opdracht 18 bladzijde 102

De vergelijking $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (met $a > 0$ en $b > 0$) hoort bij een **ellips** met middelpunt de oorsprong en waarbij de betekenis van a en b kan afgelezen worden op de afbeelding hieronder.

Toon aan dat de oppervlakte van een ellips gelijk is aan πab .



$$\bullet \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)$$

De bovenste helft van de ellips heeft als vergelijking $y = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$

$$= \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$\bullet \quad A = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$= 4 \frac{b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$x = a \cos t \text{ en } t \in I \Rightarrow dx = -a \sin t dt$$

$$x = 0 \Rightarrow \cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

$$x = a \Rightarrow \cos t = 1 \Rightarrow t = 0$$

$$= 4 \frac{b}{a} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{a^2 (1 - \cos^2 t)} (-a \sin t) dt$$

$$= 4 \frac{b}{a} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a \sin t (-a \sin t) dt$$

$$= -4ab \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^2 t dt$$

$$= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt$$

$$= 2ab \left[t - \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 2ab \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin \pi - (0 - 0) \right)$$

$$= \pi ab$$

Opdracht 19 bladzijde 104

Bereken $\frac{d}{dx}(x \cdot e^x)$ en gebruik dit om $\int x \cdot e^x dx$ te berekenen.

$$\frac{d}{dx}(xe^x) = e^x + x e^x$$

Hieruit volgt dat

$$\int \frac{d}{dx}(xe^x) dx = \int e^x dx + \int xe^x dx$$

en dus:

$$\begin{aligned} \int xe^x dx &= xe^x - \int e^x dx \\ &= xe^x - e^x + c \\ &= e^x(x - 1) + c \end{aligned}$$

Opdracht 20 bladzijde 107

Bereken $\int x \cdot 2^x dx$.

$$\int x \cdot 2^x dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = 2^x dx \Rightarrow v = \frac{2^x}{\ln 2}$$

$$= x \cdot \frac{2^x}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2} \int 2^x dx$$

$$= \frac{1}{\ln 2} x \cdot 2^x - \frac{1}{\ln^2 2} \cdot 2^x + c$$

Opdracht 21 bladzijde 108

Bereken

$$1 \int x \cos 2x dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \cos 2x dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$= \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx$$

$$= \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + c$$

$$2 \int x^3 e^x dx$$

$$u = x^3 \Rightarrow du = 3x^2 dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$$

$$= x^3 e^x - 3 \int x^2 e^x dx$$

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$$

$$= x^3 e^x - 3 \left(x^2 e^x - 2 \int x e^x dx \right)$$

$$= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6 \int x e^x dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$$

$$= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6 \left(x e^x - \int e^x dx \right)$$

$$= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x - 6e^x + c$$

$$3 \int \ln x dx$$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \ln x - \int dx$$

$$= x \ln x - x + c$$

$$4 \int e^{-2x} \sin 2x dx$$

$$u = e^{-2x} \Rightarrow du = -2e^{-2x}$$

$$dv = \sin 2x dx \Rightarrow v = -\frac{1}{2} \cos 2x$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-2x} \cos 2x - \int e^{-2x} \cos 2x dx$$

$$u = e^{-2x} \Rightarrow du = -2e^{-2x}$$

$$dv = \cos 2x dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-2x} \cos 2x - \left(\frac{1}{2} e^{-2x} \sin 2x + \int e^{-2x} \sin 2x dx \right)$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-2x} \cos 2x - \frac{1}{2} e^{-2x} \sin 2x - \int e^{-2x} \sin 2x dx$$

$$\Rightarrow 2 \int e^{-2x} \sin 2x \, dx = -\frac{1}{2} e^{-2x} \cos 2x - \frac{1}{2} e^{-2x} \sin 2x + c$$

$$\Rightarrow \int e^{-2x} \sin x \, dx = -\frac{1}{4} e^{-2x} \cos 2x - \frac{1}{4} e^{-2x} \sin 2x + c$$

Opdracht 22 bladzijde 109

Bereken

1 $\int_0^{\pi} x \sin 3x \, dx$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \sin 3x \, dx \Rightarrow v = -\frac{1}{3} \cos 3x$$

$$= \left[-\frac{1}{3} x \cos 3x \right]_0^{\pi} + \frac{1}{3} \int_0^{\pi} \cos 3x \, dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3} x \cos 3x \right]_0^{\pi} + \left[\frac{1}{9} \sin 3x \right]_0^{\pi}$$

$$= -\frac{1}{3} \pi \cos 3\pi - 0 + 0 - 0$$

$$= \frac{1}{3} \pi$$

2 $\int_1^e x \ln x \, dx$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = x \, dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}$$

$$= \left[\frac{1}{2} x^2 \ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} x^2 \ln x \right]_1^e - \left[\frac{1}{4} x^2 \right]_1^e$$

$$= \frac{1}{2} e^2 \ln e - \frac{1}{2} \ln 1 - \left(\frac{1}{4} e^2 - \frac{1}{4} \right)$$

$$= \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{4} e^2 + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{4} (e^2 + 1)$$

$$3 \int_0^{\pi} e^{-x} \sin 4x \, dx$$

We berekenen eerst $\int e^{-x} \sin 4x \, dx$.

$$\int e^{-x} \sin 4x \, dx$$

$$u = e^{-x} \Rightarrow du = -e^{-x} dx$$

$$dv = \sin 4x \, dx \Rightarrow v = -\frac{1}{4} \cos 4x$$

$$= -\frac{1}{4} e^{-x} \cos 4x - \frac{1}{4} \int e^{-x} \cos 4x \, dx$$

$$u = e^{-x} \Rightarrow du = -e^{-x} dx$$

$$dv = \cos 4x \, dx \Rightarrow v = \frac{1}{4} \sin 4x$$

$$= -\frac{1}{4} e^{-x} \cos 4x - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} e^{-x} \sin 4x + \frac{1}{4} \int e^{-x} \sin 4x \, dx \right)$$

$$= -\frac{1}{4} e^{-x} \cos 4x - \frac{1}{16} e^{-x} \sin 4x - \frac{1}{16} \int e^{-x} \sin 4x \, dx$$

$$\Rightarrow \frac{17}{16} \int e^{-x} \sin 4x \, dx = -\frac{1}{16} e^{-x} (4 \cos 4x + \sin 4x)$$

$$\Rightarrow \int e^{-x} \sin 4x \, dx = -\frac{1}{17} e^{-x} (4 \cos 4x + \sin 4x) + c$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi} e^{-x} \sin 4x \, dx = -\frac{1}{17} e^{-\pi} (4 \cos 4\pi + \sin 4\pi) - \left(-\frac{1}{17} (4 \cos 0 + \sin 0) \right)$$

$$= -\frac{4}{17} e^{-\pi} + \frac{4}{17}$$

$$= \frac{4}{17} (1 - e^{-\pi})$$

$$= \frac{4}{17} \cdot \frac{e^{\pi} - 1}{e^{\pi}}$$

Opdracht 23 bladzijde 109

Bereken de oppervlakte van het gebied begrensd door de grafiek van de functie met voorschrift $f(x) = (x - 2) \ln x$ en de x-as.

- Nulpunten:

$$(x - 2) \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 2 \quad \text{of} \quad x = 1$$

- Tussen 1 en 2 ligt de grafiek onder de x-as, zodat

$$A = - \int_1^2 (x - 2) \ln x \, dx$$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$


$$dv = (x - 2) dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2} - 2x$$

$$= - \left(\left[\left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 \left(\frac{x}{2} - 2 \right) dx \right)$$

$$= - \left[\left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \ln x \right]_1^2 + \left[\frac{x^2}{4} - 2x \right]_1^2$$

$$= - (-2 \ln 2 - 0) + \left(-3 + \frac{7}{4} \right)$$

$$= 2 \ln 2 - \frac{5}{4}$$

**Opdracht 24 bladzijde 109**

Bepaal de waarde van $k \neq 0$ zodat $\int_1^k x^2 \ln x \, dx = \frac{1}{9}$.

We berekenen eerst $\int x^2 \ln x \, dx$.

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = x^2 dx \Rightarrow v = \frac{x^3}{3}$$

$$= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx$$

$$= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9} x^3 + c$$

$$= \frac{1}{9} x^3 (3 \ln x - 1) + c$$

$$\Rightarrow \int_1^k x^2 \ln x \, dx = \frac{1}{9} \Leftrightarrow \left[\frac{1}{9} x^3 (3 \ln x - 1) \right]_1^k = \frac{1}{9}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{9} k^3 (3 \ln k - 1) + \frac{1}{9} = \frac{1}{9}$$

$$\Leftrightarrow k^3(3 \ln k - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln k = \frac{1}{3}$$

$$k \neq 0$$

$$\Leftrightarrow k = e^{\frac{1}{3}}$$

$$\Leftrightarrow k = \sqrt[3]{e}$$

Opdracht 25 bladzijde 112

Bereken

$$1 \quad \int \frac{x^2 - 4x + 2}{x + 1} dx$$

$$\begin{array}{r} x^2 - 4x + 2 \quad | \quad x + 1 \\ \hline \mp x^2 \mp x \\ \hline -5x + 2 \\ \pm 5x \pm 5 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$= \int \left(x - 5 + \frac{7}{x + 1} \right) dx$$

$$= \frac{x^2}{2} - 5x + 7 \int \frac{d(x + 1)}{x + 1}$$

$$= \frac{x^2}{2} - 5x + 7 \ln |x + 1| + c$$

$$2 \quad \int \frac{3x}{1 - \frac{1}{2}x} dx$$

$$\begin{array}{r} 3x \quad | \quad -\frac{1}{2}x + 1 \\ \hline \mp 3x \pm 6 \\ \hline -6 \end{array}$$

$$\frac{-6}{6}$$

$$= \int \left(-6 + \frac{6}{1 - \frac{1}{2}x} \right) dx$$

$$= -6x + 6 \cdot (-2) \int \frac{d\left(1 - \frac{1}{2}x\right)}{1 - \frac{1}{2}x}$$

$$= -6x - 12 \ln \left| 1 - \frac{1}{2}x \right| + c$$

Opdracht 26 bladzijde 112

- 1 Bepaal A en B zodat $\frac{3x+1}{x^2-1} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}$ voor alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

$$\begin{aligned}\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} &= \frac{A(x-1) + B(x+1)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{(A+B)x - A + B}{x^2 - 1}\end{aligned}$$

$$\frac{3x+1}{x^2-1} = \frac{(A+B)x - A + B}{x^2-1}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A+B=3 \\ B-A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=2 \end{cases}$$

- 2 Bereken $\int \frac{3x+1}{x^2-1} dx$ door gebruik te maken van 1.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x+1}{x^2-1} dx &= \int \frac{1}{x+1} dx + \int \frac{2}{x-1} dx \\ &= \int \frac{d(x+1)}{x+1} + 2 \int \frac{d(x-1)}{x-1} \\ &= \ln|x+1| + 2 \ln|x-1| + c\end{aligned}$$

Opdracht 27 bladzijde 115

Bereken

1 $\int \frac{2x+3}{x^2-6x-7} dx$

- $x^2 - 6x - 7 = (x-7)(x+1)$
- $\frac{2x+3}{x^2-6x-7} = \frac{A}{x-7} + \frac{B}{x+1} = \frac{(A+B)x + A - 7B}{(x-7)(x+1)}$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=2 \\ A-7B=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{17}{8} \\ B = -\frac{1}{8} \end{cases}$$

- $\int \frac{2x+3}{x^2-6x-7} dx = \frac{17}{8} \int \frac{d(x-7)}{x-7} - \frac{1}{8} \int \frac{d(x+1)}{x+1}$
 $= \frac{17}{8} \ln|x-7| - \frac{1}{8} \ln|x+1| + c$

$$2 \int \frac{x-5}{x^2+2x+1} dx$$

$$\bullet x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$$

$$\bullet \frac{x-5}{x^2+2x+1} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{Ax + A + B}{(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ A + B = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -6 \end{cases}$$

$$\bullet \int \frac{x-5}{x^2+2x+1} dx = \int \frac{d(x+1)}{x+1} - 6 \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2}$$

$$= \ln|x+1| + \frac{6}{x+1} + c$$

$$3 \int \frac{x^3+3}{2x^2+5x+3} dx$$

• euclidische deling

$$\begin{array}{r} x^3 \qquad \qquad + 3 \quad \left| \begin{array}{l} 2x^2 + 5x + 3 \\ \hline \frac{1}{2}x - \frac{5}{4} \end{array} \right. \\ \underline{+ x^3 + \frac{5}{2}x^2 + \frac{3}{2}x} \qquad \qquad \qquad \\ -\frac{5}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 3 \\ \underline{+ \frac{5}{2}x^2 + \frac{25}{4}x + \frac{15}{4}} \\ \frac{19}{4}x + \frac{27}{4} \end{array}$$

$$\bullet \int \frac{x^3+3}{2x^2+5x+3} dx = \int \left(\frac{1}{2}x - \frac{5}{4} + \frac{\frac{19}{4}x + \frac{27}{4}}{2x^2+5x+3} \right) dx$$

$$= \frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{4}x + \int \frac{\frac{19}{4}x + \frac{27}{4}}{2x^2+5x+3} dx$$

$$\bullet 2x^2 + 5x + 3 = 2(x+1) \left(x + \frac{3}{2} \right)$$

$$= (x+1)(2x+3)$$

$$\bullet \frac{\frac{19}{4}x + \frac{27}{4}}{2x^2+5x+3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{2x+3}$$

$$= \frac{(2A+B)x + 3A+B}{(x+1)(2x+3)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2A + B = \frac{19}{4} \\ 3A + B = \frac{27}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = \frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bullet \int \frac{19x + \frac{27}{4}}{2x^2 + 5x + 3} dx &= 2 \int \frac{d(x+1)}{x+1} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+3)}{2x+3} \\ &= 2 \ln|x+1| + \frac{3}{8} \ln|2x+3| + c \end{aligned}$$

$$\bullet \int \frac{x^3 + 3}{2x^2 + 5x + 3} dx = \frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{4}x + 2 \ln|x+1| + \frac{3}{8} \ln|2x+3| + c$$


Opdracht 28 bladzijde 115

Bereken de oppervlakte van het gebied tussen de grafiek van de functie met voorschrift

$$f(x) = \frac{-x^2 + 4}{x^2 - 9} \text{ en de } x\text{-as.}$$

- Tekenverloop van $f(x) = \frac{-x^2 + 4}{x^2 - 9}$:

x	-3	-2	2	3					
t(x)	-	-	0	+	0	-	-	-	
n(x)	+	0	-	-	-	-	0	+	
f(x)	-		+	0	-	0	+		-



$$\begin{aligned} \bullet A &= - \int_{-2}^2 \frac{-x^2 + 4}{x^2 - 9} dx \\ &= \int_{-2}^2 \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9} dx \quad \text{symmetrie} = 2 \int_0^2 \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9} dx \end{aligned}$$

$$\bullet \int \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9} dx$$

- euclidische deling:

$$\begin{array}{r} x^2 - 4 \quad | \quad x^2 - 9 \\ \hline \mp x^2 \pm 9 \quad | \quad 1 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \bullet \int \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9} dx &= \int \left(1 + \frac{5}{x^2 - 9} \right) dx \\ &= x + 5 \int \frac{dx}{x^2 - 9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \frac{1}{x^2 - 9} &= \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 3} \\ &= \frac{(A + B)x + 3A - 3B}{(x - 3)(x + 3)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ 3A - 3B = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{6} \\ B = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bullet \int \frac{dx}{x^2 - 9} &= \frac{1}{6} \int \frac{d(x - 3)}{x - 3} - \frac{1}{6} \int \frac{d(x + 3)}{x + 3} \\ &= \frac{1}{6} \ln|x - 3| - \frac{1}{6} \ln|x + 3| + c \\ &= \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x - 3}{x + 3} \right| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 2 \left[x + \frac{5}{6} \ln \left| \frac{x - 3}{x + 3} \right| \right]_0^2 \\ &= 2 \left(2 + \frac{5}{6} \ln \frac{1}{5} - 0 \right) \\ &= 4 + \frac{5}{3} \ln \frac{1}{5} \\ &= 4 - \frac{5}{3} \ln 5 \end{aligned}$$

Opdracht 29 bladzijde 117

Bereken

$$\begin{aligned} 1 \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 13} &= \int \frac{dx}{(x - 2)^2 + 9} = \int \frac{d(x - 2)}{(x - 2)^2 + 9} = \frac{1}{3} \operatorname{Bgtan} \left(\frac{x - 2}{3} \right) + c \\ &\quad \hookrightarrow D < 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \int \frac{16x + 8}{4x^2 + 3} dx &= \int \frac{2 \cdot 8x + 8}{4x^2 + 3} dx = 2 \int \frac{8x}{4x^2 + 3} dx + 8 \int \frac{dx}{(2x)^2 + 3} \\ &\quad \hookrightarrow D < 0 \\ &= 2 \ln(4x^2 + 3) + \frac{8}{2} \int \frac{d(2x)}{(2x)^2 + 3} = 2 \ln(4x^2 + 3) + \frac{4}{\sqrt{3}} \operatorname{Bgtan} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} x \right) + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3 \quad \int \frac{x}{x^2 + 6x + 10} dx &= \int \frac{\frac{1}{2}(2x+6) - 3}{x^2 + 6x + 10} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+6}{x^2 + 6x + 10} dx - 3 \int \frac{dx}{x^2 + 6x + 10} \\
 &\quad \hookrightarrow D < 0 \\
 &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 6x + 10) - 3 \int \frac{d(x+3)}{(x+3)^2 + 1} \\
 &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 6x + 10) - 3 \operatorname{Bgtan}(x+3) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4 \quad \int \frac{2x+3}{4x^2+x+1} dx &= \int \frac{\frac{1}{4}(8x+1) + \frac{11}{4}}{4x^2+x+1} dx \\
 &\quad \hookrightarrow D < 0 \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{8x+1}{4x^2+x+1} dx + \frac{11}{4} \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d\left(2x + \frac{1}{4}\right)}{\left(2x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{15}{16}} \\
 &= \frac{1}{4} \ln(4x^2+x+1) + \frac{11}{8} \cdot \frac{4}{\sqrt{15}} \operatorname{Bgtan}\left(\frac{4}{\sqrt{15}}\left(2x + \frac{1}{4}\right)\right) + c \\
 &= \frac{1}{4} \ln(4x^2+x+1) + \frac{11}{2\sqrt{15}} \operatorname{Bgtan}\left(\frac{8x+1}{\sqrt{15}}\right) + c
 \end{aligned}$$

Opdracht 30 bladzijde 120

Bereken

$$\begin{aligned}
 1 \quad \int \frac{x+1}{x^3+x^2-6x} dx \\
 &\bullet \quad x^3+x^2-6x = x(x^2+x-6) = x(x-2)(x+3) \\
 &\bullet \quad \frac{x+1}{x^3+x^2-6x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+3} \\
 &\quad = \frac{A(x^2+x-6) + B(x^2+3x) + C(x^2-2x)}{x(x-2)(x+3)} \\
 &\quad = \frac{(A+B+C)x^2 + (A+3B-2C)x - 6A}{x(x-2)(x+3)} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} A+B+C=0 \\ A+3B-2C=1 \\ -6A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-\frac{1}{6} \\ B=\frac{3}{10} \\ C=-\frac{2}{15} \end{cases} \\
 \int \frac{x+1}{x^3+x^2-6x} dx &= -\frac{1}{6} \int \frac{dx}{x} + \frac{3}{10} \int \frac{d(x-2)}{x-2} - \frac{2}{15} \int \frac{d(x+3)}{x+3} \\
 &= -\frac{1}{6} \ln|x| + \frac{3}{10} \ln|x-2| - \frac{2}{15} \ln|x+3| + c
 \end{aligned}$$

$$2 \int \frac{x+2}{x^4-1} dx$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \frac{x+2}{x^4-1} &= \frac{x+2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} \\
 &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1} \\
 &= \frac{A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} \\
 &= \frac{(A+B+C)x^3 + (A-B+D)x^2 + (A+B-C)x + A-B-D}{x^4-1}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B+C=0 \\ A-B+D=0 \\ A+B-C=1 \\ A-B-D=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=\frac{3}{4} \\ B=-\frac{1}{4} \\ C=-\frac{1}{2} \\ D=-1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \int \frac{x+2}{x^4-1} dx &= \frac{3}{4} \int \frac{d(x-1)}{x-1} - \frac{1}{4} \int \frac{d(x+1)}{x+1} + \int \frac{-\frac{1}{2}x-1}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{3}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x+1| - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} - B \tan x \\
 &= \frac{3}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x+1| - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) - B \tan x + c
 \end{aligned}$$

$$3 \int \frac{2x-1}{x^4+x^2} dx$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \frac{2x-1}{x^4+x^2} &= \frac{2x-1}{x^2(x^2+1)} \\
 &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} \\
 &= \frac{Ax(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)x^2}{x^4+x^2} \\
 &= \frac{(A+C)x^3 + (B+D)x^2 + Ax + B}{x^4+x^2}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+C=0 \\ B+D=0 \\ A=2 \\ B=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=-1 \\ C=-2 \\ D=1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \int \frac{2x-1}{x^4+x^2} dx &= 2 \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{-2x+1}{x^2+1} dx \\
 &= 2 \ln|x| + \frac{1}{x} - \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} + B \tan x \\
 &= 2 \ln|x| + \frac{1}{x} - \ln(x^2+1) + B \tan x + c
 \end{aligned}$$

Opdracht 31 bladzijde 120

Bereken

$$1 \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x}}$$

$$t^2 = x \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t \, dt = dx$$

$$= \int \frac{2t \, dt}{(t^2+1)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2+1} = 2 B \tan t + c = 2 B \tan \sqrt{x} + c$$

$$2 \int \frac{x}{1+\sqrt[3]{x}} dx$$

$$t^3 = x \Rightarrow 3t^2 \, dt = dx$$

$$= \int \frac{t^3}{1+t} \cdot 3t^2 \, dt$$

$$= 3 \int \frac{t^5}{t+1} dt$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 t^5 \\
 \overline{+ t^5 + t^4} \\
 - t^4 \\
 \overline{+ t^4 + t^3} \\
 t^3 \\
 \overline{+ t^3 + t^2} \\
 - t^2 \\
 \overline{+ t^2 + t} \\
 t \\
 \overline{+ t + 1} \\
 - 1
 \end{array}
 \end{array}
 \quad \left| \begin{array}{r}
 t+1 \\
 \hline
 t^4 - t^3 + t^2 - t + 1
 \end{array} \right.$$

$$= 3 \int \left(t^4 - t^3 + t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right) dt$$

$$= 3 \left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t - \ln|t+1| \right) + c$$

$$= \frac{3}{5} \sqrt[3]{x^5} - \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + x - \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} - 3 \ln|\sqrt[3]{x} + 1| + c$$

$$3 \int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt[3]{x}} dx$$

$$t^6 = x \Rightarrow 6t^5 dt = dx$$

$$= \int \frac{t^3}{1 + t^2} \cdot 6t^5 dt$$

$$= 6 \int \frac{t^8}{t^2 + 1} dt$$

$$\begin{array}{r} t^8 \\ \hline \mp t^8 \mp t^6 \\ - t^6 \\ \hline \pm t^6 \pm t^4 \\ t^4 \\ \hline \mp t^4 \mp t^2 \\ - t^2 \\ \hline \pm t^2 \pm 1 \\ 1 \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} t^2 + 1 \\ \hline t^6 - t^4 + t^2 - 1 \end{array} \right.$$

$$= 6 \int \left(t^6 - t^4 + t^2 - 1 + \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt$$

$$= \frac{6}{7} t^7 - \frac{6}{5} t^5 + 2t^3 - 6t + 6 \operatorname{Bgtan} t + c$$

$$= \frac{6}{7} \sqrt[6]{x^7} - \frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} + 2\sqrt{x} - 6\sqrt[6]{x} + 6 \operatorname{Bgtan} \sqrt[6]{x} + c$$

$$4 \int \frac{x^2}{\sqrt{9 - 4x^2}} dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \frac{x}{\sqrt{9 - 4x^2}} dx \Rightarrow v = -\frac{1}{8} \int \frac{d(9 - 4x^2)}{\sqrt{9 - 4x^2}} = -\frac{1}{4} \sqrt{9 - 4x^2}$$

$$= -\frac{1}{4} x \sqrt{9 - 4x^2} + \frac{1}{4} \int \sqrt{9 - 4x^2} dx$$

$$= -\frac{1}{4} x \sqrt{9 - 4x^2} + \frac{1}{4} \int \frac{\sqrt{9 - 4x^2} \sqrt{9 - 4x^2}}{\sqrt{9 - 4x^2}} dx$$

$$= -\frac{1}{4} x \sqrt{9 - 4x^2} + \frac{1}{4} \int \frac{9 - 4x^2}{\sqrt{9 - 4x^2}} dx$$

$$= -\frac{1}{4} x \sqrt{9 - 4x^2} + \frac{9}{4} \int \frac{dx}{\sqrt{9 - 4x^2}} - \int \frac{x^2}{\sqrt{9 - 4x^2}} dx$$

$$\Rightarrow 2 \int \frac{x^2}{\sqrt{9 - 4x^2}} dx = -\frac{1}{4} x \sqrt{9 - 4x^2} + \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{9 - (2x)^2}}$$

$$= -\frac{1}{4} x \sqrt{9 - 4x^2} + \frac{9}{8} \operatorname{Bgsin} \left(\frac{2x}{3} \right) + c$$

$$\Rightarrow \int \frac{x^2}{\sqrt{9 - 4x^2}} dx = -\frac{1}{8} x \sqrt{9 - 4x^2} + \frac{9}{16} \operatorname{Bgsin} \left(\frac{2x}{3} \right) + c$$

$$\begin{aligned}
5 \quad & \int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 25}} dx \\
&= \int \frac{x}{x^2\sqrt{x^2 - 25}} dx \\
&\quad t^2 = x^2 - 25 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = 2x dx \\
&= \int \frac{t}{(t^2 + 25)t} dt \\
&= \int \frac{dt}{t^2 + 25} \\
&= \frac{1}{5} \operatorname{Bgtan} \frac{t}{5} + c \\
&= \frac{1}{5} \operatorname{Bgtan} \frac{\sqrt{x^2 - 25}}{5} + c
\end{aligned}$$

Opdracht 32 bladzijde 126

Bereken

$$1 \quad \int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + c$$

$$2 \quad \int \frac{dx}{x^{\frac{4}{3}}} = \int x^{-\frac{4}{3}} dx = \frac{x^{-\frac{1}{3}}}{-\frac{1}{3}} + c = -\frac{3}{x^{\frac{1}{3}}} + c$$

$$\begin{aligned}
3 \quad \int \frac{x^2 \sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} dx &= \int \frac{x^2 \cdot x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{3}}} dx = \int x^{\frac{13}{6}} dx \\
&= \frac{x^{\frac{19}{6}}}{\frac{19}{6}} + c = \frac{6}{19} \sqrt[6]{x^{19}} + c
\end{aligned}$$

$$4 \quad \int \frac{dx}{4 + 4x^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{1}{4} \operatorname{Bgtan} x + c$$

$$5 \quad \int \frac{dx}{\cos^2 x - 1} = - \int \frac{dx}{1 - \cos^2 x} = - \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \cot x + c$$

Opdracht 33 bladzijde 126

Bereken

$$1 \quad \int (-2x^2 + 5x - 6) dx = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 6x + c$$

$$2 \quad \int (2x - 3)(3x + 2) dx = \int (6x^2 - 5x - 6) dx \\ = 2x^3 - \frac{5}{2}x^2 - 6x + c$$

$$3 \quad \int (x^2 - 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1) dx = \int (x^4 - 1)(x^4 + 1) dx = \int (x^8 - 1) dx = \frac{x^9}{9} - x + c$$

$$4 \quad \int \frac{3x - 4}{2x} dx = \int \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{x} \right) dx = \frac{3}{2}x - 2 \ln |x| + c$$

$$5 \quad \int \frac{x^2 - 4}{\sqrt{3x}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \left(\frac{x^2}{\sqrt{x}} - \frac{4}{\sqrt{x}} \right) dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \left(x^{\frac{3}{2}} - 4x^{-\frac{1}{2}} \right) dx \\ = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - 4 \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \right) + c = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{2}{5} \sqrt{x^5} - 8\sqrt{x} \right) + c$$

$$6 \quad \int \frac{x^2 + 5}{x^2 + 1} dx = \int \frac{(x^2 + 1) + 4}{x^2 + 1} dx = \int \left(1 + \frac{4}{x^2 + 1} \right) dx \\ = x + 4 \operatorname{Bgtan} x + c$$

Opdracht 34 bladzijde 126Bepaal het voorschrift van f als

$$1 \quad f'(x) = x^2 - x \quad \text{en} \quad f(3) = 4$$

$$\bullet \quad f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + c$$

$$\bullet \quad f(3) = 4 \Leftrightarrow 9 - \frac{9}{2} + c = 4 \Leftrightarrow c = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

2 $f''(x) = x + 1, f'(0) = 0$ en $f(0) = 5$

- $f'(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + c$

- $f'(0) = 0 \Leftrightarrow c = 0$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2}x^2 + x$$

- $f(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + c$

- $f(0) = 5 \Leftrightarrow c = 5$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 5$$

3 $f''(x) = \frac{1}{x^3}, f'(-1) = 1$ en $f(1) = 0$

- $f'(x) = \frac{x^{-2}}{-2} + c = -\frac{1}{2x^2} + c$

- $f'(-1) = 1 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} + c = 1 \Leftrightarrow c = \frac{3}{2}$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{2x^2} + \frac{3}{2}$$

- $f(x) = \frac{x^{-1}}{2} + \frac{3}{2}x + c = \frac{1}{2x} + \frac{3}{2}x + c$

- $f(1) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + c = 0 \Leftrightarrow c = -2$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2x} + \frac{3}{2}x - 2$$

Opdracht 35 bladzijde 126

Bereken

1
$$\int \frac{2^{x+1}}{3^{x+2}} dx = \frac{2}{9} \int \frac{2^x}{3^x} dx = \frac{2}{9} \int \left(\frac{2}{3}\right)^x dx$$

$$= \frac{2}{9} \cdot \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^x}{\ln \frac{2}{3}} + c = \frac{2}{9 \ln \frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x + c$$

2
$$\int \frac{6^{3x}}{4^{3x-5}} dx = 4^5 \int \left(\frac{6}{4}\right)^{3x} dx = 4^5 \int \left(\left(\frac{3}{2}\right)^3\right)^x dx$$

$$= 4^5 \int \left(\frac{27}{8}\right)^x dx = \frac{1024}{\ln \frac{27}{8}} \cdot \left(\frac{27}{8}\right)^x + c = \frac{1024}{3 \ln \frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{3x} + c$$

$$3 \quad \int \frac{1 + \cos^2 x}{1 + \cos 2x} dx = \int \frac{1 + \cos^2 x}{2 \cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + 1 \right) dx = \frac{1}{2} (\tan x + x) + c$$

\downarrow
 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$

$$4 \quad \int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx = -\cot x - \tan x + c$$

Opdracht 36 bladzijde 127

Bereken

$$1 \quad \int (-3x + 5)^4 dx$$

$$u = -3x + 5 \Rightarrow du = -3dx$$

$$= -\frac{1}{3} \int u^4 dt = -\frac{1}{3} \cdot \frac{u^5}{5} + c = -\frac{1}{15} (-3x + 5)^5 + c$$

$$\text{of } \int (-3x + 5)^4 dt = -\frac{1}{3} \int (-3x + 5)^4 d(-3x + 5) = -\frac{1}{3} \frac{(-3x + 5)^5}{5} + c$$

$$= -\frac{1}{15} (-3x + 5)^5 + c$$

$$2 \quad \int \frac{dx}{-2x + 9} = -\frac{1}{2} \int \frac{d(-2x + 9)}{-2x + 9} = -\frac{1}{2} \ln |-2x + 9| + c$$

$$3 \quad \int e^{3x+14} dx = \frac{1}{3} \int e^{3x+14} d(3x+14) = \frac{1}{3} e^{3x+14} + c$$

$$4 \quad \int \frac{dx}{\sin^2(2-x)} = - \int \frac{d(2-x)}{\sin^2(2-x)} = \cot(2-x) + c$$

$$5 \quad \int \cos[\pi(x-1)] dx = \frac{1}{\pi} \int \cos[\pi(x-1)] d(\pi(x-1)) = \frac{1}{\pi} \sin[\pi(x-1)] + c$$

$$6 \quad \int 4^{-2x+3} dx = -\frac{1}{2} \int 4^{-2x+3} d(-2x+3) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{4^{-2x+3}}{\ln 4} + c = -\frac{4^{-2x+3}}{4 \ln 2} = -\frac{64 \cdot 2^{-4x}}{4 \ln 2} + c$$

$$= -\frac{16}{\ln 2} \cdot 2^{-4x} + c$$

Opdracht 37 bladzijde 127

Bereken

$$1 \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{1-(2x)^2}} = \frac{1}{2} \text{Bgsin}(2x) + c$$

$$2 \quad \int \frac{dx}{9x^2+1} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x)}{1+(3x)^2} = \frac{1}{3} \text{Bgtan}(3x) + c$$

$$3 \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 + 7}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{(\sqrt{3}x)^2 + 7}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln |\sqrt{3}x + \sqrt{3x^2 + 7}| + c$$

$$4 \quad \int \frac{dx}{\sqrt{25 - 36x^2}} = \frac{1}{6} \int \frac{d(6x)}{\sqrt{25 - (6x)^2}} = \frac{1}{6} \operatorname{Bgsin}\left(\frac{6x}{5}\right) + c$$

$$5 \quad \int \frac{dx}{\sqrt{100x^2 - 49}} = \frac{1}{10} \int \frac{d(10x)}{\sqrt{(10x)^2 - 49}} = \frac{1}{10} \ln |10x + \sqrt{100x^2 - 49}| + c$$

$$6 \quad \int \frac{dx}{81x^2 + 64} = \frac{1}{9} \int \frac{d(9x)}{(9x)^2 + 64} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{8} \operatorname{Bgtan}\left(\frac{9x}{8}\right) + c$$

$$= \frac{1}{72} \operatorname{Bgtan}\left(\frac{9x}{8}\right) + c$$

Opdracht 38 bladzijde 127

Bereken

$$1 \quad \int (x^3 - 1)^3 x^2 dx$$

$$u = x^3 - 1 \Rightarrow du = 3x^2 dx$$

$$= \frac{1}{3} \int u^3 dt = \frac{1}{3} \frac{u^4}{4} + c = \frac{1}{12} (x^3 - 1)^4 + c$$

$$2 \quad \int x^2 e^{2x^3 + 3} dx$$

$$u = 2x^3 + 3 \Rightarrow du = 6x^2 dx$$

$$= \frac{1}{6} \int e^u du = \frac{1}{6} e^u + c = \frac{1}{6} e^{2x^3 + 3} + c$$

$$3 \quad \int e^{\cos x} \sin x dx$$

$$u = \cos x \Rightarrow du = -\sin x dx$$

$$= -\int e^u du = -e^u + c = -e^{\cos x} + c$$

$$4 \quad \int \frac{dx}{x \ln^2 x}$$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$= \int \frac{du}{u^2} = \int u^{-2} du = \frac{u^{-1}}{-1} + c = -\frac{1}{u} + c = -\frac{1}{\ln x} + c$$

$$5 \int \frac{\sqrt{3 + \ln x}}{x} dx$$

$$u = 3 + \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$= \int \sqrt{u} du = \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{3} \sqrt{(3 + \ln x)^3} + c$$

$$6 \int \frac{3x + 1}{(3x^2 + 2x)^3} dx$$

$$u = 3x^2 + 2x \Rightarrow du = (6x + 2) dx = 2(3x + 1) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int u^{-3} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{-2}}{-2} + c = -\frac{1}{4(3x^2 + 2x)^2} + c$$

$$7 \int \frac{\cos x - \sin x}{(\cos x + \sin x)^2} dx$$

$$u = \cos x + \sin x \Rightarrow du = (-\sin x + \cos x) dx$$

$$= \int \frac{du}{u^2} = \frac{u^{-1}}{-1} + c = -\frac{1}{\cos x + \sin x} + c$$

$$8 \int \frac{\cos x - x \sin x}{x \cos x} dx$$

$$u = x \cos x \Rightarrow du = (-x \sin x + \cos x) dx$$

$$= \int \frac{du}{u} = \ln|u| + c = \ln|x \cos x| + c$$

Opdracht 39 bladzijde 127

De onbepaalde integraal $\int x e^{\frac{2}{3}x^2} dx$ is gelijk aan

A $\frac{4}{3} e^{\frac{2}{3}x^2} + c$

B $\frac{3}{4} e^{\frac{2}{3}x^2} + c$

C $\frac{2}{3} e^{\frac{2}{3}x^2} + c$

D $\frac{3}{2} e^{\frac{2}{3}x^2} + c$

(Bron © Toelatingsproef arts-tandarts)

$$u = \frac{2}{3}x^2 \Rightarrow du = \frac{4}{3}x dx$$

$$= \frac{3}{4} \int e^u du = \frac{3}{4} e^u + c = \frac{3}{4} e^{\frac{2}{3}x^2} + c$$

Antwoord B is juist.

Opdracht 40 bladzijde 128

Bereken

$$\begin{aligned}
 1 \quad \int_4^5 \frac{2}{(x-3)^3} dx &= 2 \int_4^5 (x-3)^{-3} d(x-3) = 2 \left[\frac{(x-3)^{-2}}{-2} \right]_4^5 \\
 &= - \left[\frac{1}{(x-3)^2} \right]_4^5 = - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

$$2 \quad \int_{-2}^2 x \sqrt{4-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^0 \sqrt{u} du = 0$$

$$u = 4 - x^2 \Rightarrow du = -2x dx$$

$$x = -2 \Rightarrow u = 0$$

$$x = 2 \Rightarrow u = 0$$

$$3 \quad \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cot x dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{du}{u} = \left[\ln |u| \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$u = \sin x \Rightarrow du = \cos x dx$$

$$x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow u = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{4} \Rightarrow u = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \ln \frac{\sqrt{2}}{2} - \ln \frac{1}{2} = \ln \sqrt{2} - \ln 2 + \ln 2 = \ln \sqrt{2}$$

$$4 \quad \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx = - \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{du}{u} = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{du}{u} = \left[\ln |u| \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}$$

$$u = 1 + \cos x \Rightarrow du = -\sin x dx$$

$$x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow u = \frac{3}{2}$$

$$x = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow u = \frac{1}{2}$$

$$= \ln \frac{3}{2} - \ln \frac{1}{2} = \ln 3$$

$$5 \int_0^3 (x-2)e^{-x^2+4x-4} dx$$

$$u = -x^2 + 4x - 4 \Rightarrow du = (-2x + 4) dx = -2(x - 2) dx$$

$$x = 0 \Rightarrow u = -4$$

$$x = 3 \Rightarrow u = -1$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{-4}^{-1} e^u du = -\frac{1}{2} [e^u]_{-4}^{-1} = -\frac{1}{2} [e^{-1} - e^{-4}]$$

$$= -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{e} - \frac{1}{e^4} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - e^3}{e^4} = \frac{1 - e^3}{2e^4}$$

$$6 \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^0 \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx = \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^0 \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{1}{2} [\text{Bgsin } u]_{\frac{1}{2}}^0$$

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow u = \frac{1}{2}$$

$$x = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$= \frac{1}{2} \left[\text{Bgsin } 0 - \text{Bgsin } \frac{1}{2} \right] = -\frac{\pi}{12}$$

Opdracht 41 bladzijde 128

$\int_0^\pi \sin^2 x dx$ is gelijk aan

A $-\pi$

B $-\frac{\pi}{2}$

C $\frac{\pi}{2}$

D π

(Bron © Toelatingsproef arts-tandarts)

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$= \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \sin 2x \right]_0^\pi = \frac{1}{2}\pi - 0 - (0 - 0) = \frac{\pi}{2}$$

Antwoord C is juist.

Opdracht 42 bladzijde 128

Bereken de volgende integralen door gebruik te maken van de omgekeerde formules van Simpson.

1 $\int \cos 5x \cos 2x \, dx$

3 $\int \sin 3x \sin x \, dx$

2 $\int \sin 2x \cos 3x \, dx$

4 $\int \sin x \cos x \cos 2x \, dx$

Omgekeerde formules van Simpson:

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)]$$

$$1 \quad \int \cos 5x \cos 2x \, dx = \int \frac{1}{2} (\cos 7x + \cos 3x) \, dx = \frac{1}{14} \sin 7x + \frac{1}{6} \sin 3x + c$$

$$2 \quad \int \sin 2x \cos 3x \, dx = \int \frac{1}{2} (\sin 5x + \sin(-x)) \, dx = -\frac{1}{10} \cos 5x + \frac{1}{2} \cos x + c$$

$$3 \quad \int \sin 3x \sin x \, dx = \int \frac{1}{2} (\cos 2x - \cos 4x) \, dx = \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{8} \sin 4x + c$$

$$4 \quad \int \sin x \cos x \cos 2x \, dx = \int \frac{1}{2} \sin 2x \cos 2x \, dx = \int \frac{1}{4} \sin 4x \, dx = -\frac{1}{16} \cos 4x + c$$

Opdracht 43 bladzijde 128

Gegeven is de grafiek van de functie met voorschrift $f(x) = \sin x \sqrt{\cos x}$ over $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Bereken de oppervlakte van het gekleurde gebied.

Wegens symmetrie geldt:


$$A = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \sqrt{\cos x} \, dx$$

$$u = \cos x \Rightarrow du = -\sin x \, dx$$

$$x = 0 \Rightarrow u = 1$$

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = 0$$

$$= -2 \int_1^0 \sqrt{u} \, du = 2 \int_0^1 u^{\frac{1}{2}} \, du = 2 \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{4}{3}$$



Opdracht 44 bladzijde 129

Bereken de oppervlakte van het gebied begrensd door de grafiek van de functie met voorschrift $f(x) = xe^{-x^2}$, de x-as en de verticale rechten door het maximum en het buigpunt met strikt positieve x-waarde.

$$f(x) = xe^{-x^2}$$

$$\bullet f'(x) = e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2} = (1 - 2x^2)e^{-x^2}$$

$$\text{nulpunten: } \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\bullet f''(x) = -4xe^{-x^2} - 2x(1 - 2x^2)e^{-x^2} \\ = (4x^3 - 6x)e^{-x^2}$$

$$\text{nulpunten: } 0, -\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}$$

\Rightarrow verticale rechten door $\frac{1}{\sqrt{2}}$ en door $\sqrt{\frac{3}{2}}$

$$\bullet f \text{ is positief over } \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}} \right]$$

$$\Rightarrow A = \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\sqrt{\frac{3}{2}}} x e^{-x^2} dx$$


$$u = -x^2 \Rightarrow du = -2x dx$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow u = -\frac{1}{2}$$

$$x = \sqrt{\frac{3}{2}} \Rightarrow u = -\frac{3}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{2}}^{-\frac{3}{2}} e^u du = \frac{1}{2} \left[e^u \right]_{-\frac{3}{2}}^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left[e^{-\frac{1}{2}} - e^{-\frac{3}{2}} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{e}} - \frac{1}{e\sqrt{e}} \right) = \frac{e-1}{2e\sqrt{e}}$$

**Opdracht 45 bladzijde 129**

Bereken

$$1 \int \frac{1 + \tan^2 x}{\cos^2 x} dx = \int (1 + u^2) du = u + \frac{u^3}{3} + c$$

$$u = \tan x \Rightarrow du = \frac{1}{\cos^2 x} dx$$

$$= \tan x + \frac{\tan^3 x}{3} + c$$

$$2 \int \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \sqrt{u} du = 2 \cdot \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{4}{3} \sqrt{(1+\sqrt{x})^3} + c$$

$$u = 1 + \sqrt{x} \Rightarrow du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$3 \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{3-4e^{4x}}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{du}{\sqrt{3-u^2}} = \frac{1}{4} \operatorname{Bgsin} \frac{u}{\sqrt{3}} + c$$

$$u = 2e^{2x} \Rightarrow du = 4e^{2x} dx$$

$$= \frac{1}{4} \operatorname{Bgsin} \frac{2e^{2x}}{\sqrt{3}} + c$$

$$4 \int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx = \int \cos u du = \sin u + c = \sin(\ln x) + c$$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$5 \int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{1-4\tan^2 x}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{1}{2} \operatorname{Bgsin} u + c$$

$$u = 2 \tan x \Rightarrow du = \frac{2}{\cos^2 x} dx$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Bgsin}(2 \tan x) + c$$

$$6 \int \frac{\cos 3x}{8 + \sin^2 3x} dx = \frac{1}{3} \int \frac{du}{8+u^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \operatorname{Bgtan} \frac{u}{2\sqrt{2}} + c$$

$$u = \sin 3x \Rightarrow du = 3 \cos 3x dx$$

$$= \frac{1}{6\sqrt{2}} \operatorname{Bgtan} \frac{\sin 3x}{2\sqrt{2}} + c$$

$$7 \int \frac{\sqrt{\operatorname{Bgsin} 5x}}{\sqrt{1-25x^2}} dx = \frac{1}{5} \int \sqrt{u} du = \frac{1}{5} \cdot \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c$$

$$u = \operatorname{Bgsin} 5x \Rightarrow du = \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}} dx$$

$$= \frac{2}{15} \sqrt{(\operatorname{Bgsin} 5x)^3} + c$$

$$8 \int \frac{x^2}{x^6+9} dx = \int \frac{x^2}{(x^3)^2+9} dx = \frac{1}{3} \int \frac{du}{u^2+9} = \frac{1}{9} \operatorname{Bgtan} \frac{x^3}{3} + c$$

$$u = x^3 \Rightarrow du = 3x^2 dx$$

$$9 \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{4-25\ln^2 x}}$$

$$u = 5 \ln x \Rightarrow du = \frac{5}{x} dx$$

$$= \frac{1}{5} \int \frac{du}{\sqrt{4-u^2}} = \frac{1}{5} \operatorname{Bgsin} \frac{u}{2} + c = \frac{1}{5} \operatorname{Bgsin} \left(\frac{5}{2} \ln x \right) + c$$

$$10 \quad \int \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx = \int \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \int \frac{du}{1+u^2} = \operatorname{Bgtan}(\sin x) + c$$

$$u = \sin x \Rightarrow du = \cos x dx$$

$$11 \quad \int \cot x \ln(\sin x) dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} \ln(\sin x) dx = \int u du = \frac{u^2}{2} + c$$

$$u = \ln(\sin x) \Rightarrow du = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x dx$$

$$= \frac{\ln^2(\sin x)}{2} + c$$

$$12 \quad \int x^3(1+x^2)^4 dx = \int x^2 \cdot x \cdot (1+x^2)^4 dx$$

$$u = 1 + x^2 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (u-1) \cdot u^4 du = \frac{1}{2} \int (u^5 - u^4) du = \frac{u^6}{12} - \frac{u^5}{10} + c$$

$$= \frac{(1+x^2)^6}{12} - \frac{(1+x^2)^5}{10} + c$$

$$13 \quad \int \frac{xe^{-2x^2}}{3 - e^{-2x^2}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{4} \ln |u| + c = \frac{1}{4} \ln |3 - e^{-2x^2}| + c$$

$$u = 3 - e^{-2x^2} \Rightarrow du = 4x e^{-2x^2} dx$$

$$14 \quad \int \frac{\cos 3x}{\sqrt{4 - \sin^2 3x}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{du}{\sqrt{4-u^2}} = \frac{1}{3} \operatorname{Bgsin} \frac{u}{2} + c$$

$$u = \sin 3x \Rightarrow du = 3 \cos 3x dx$$

$$= \frac{1}{3} \operatorname{Bgsin} \frac{\sin 3x}{2} + c$$

Opdracht 46 bladzijde 129

De integraal $\int \sin x \cos x \, dx$ kun je op drie manieren berekenen:

$$\int \sin x \cos x \, dx = \int \sin x \, d(\sin x) = \frac{1}{2} \sin^2 x + c$$

$$\int \sin x \cos x \, dx = - \int \cos x \, d(\cos x) = -\frac{1}{2} \cos^2 x + c$$

$$\int \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2} \int \sin 2x \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \sin 2x \, d(2x) = -\frac{1}{4} \cos 2x + c$$

Verklaar dit verschil in resultaten.

We steunen op het feit dat een onbepaalde integraal op een constante na bepaald is.

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \sin x \cos x \, dx = \int \sin x \, d(\sin x) = \frac{1}{2} \sin^2 x + c_1 \\ &= \frac{1}{2}(1 - \cos^2 x) + c_1 = -\frac{1}{2} \cos^2 x + \frac{1}{2} + c_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \sin x \cos x \, dx = - \int \cos x \, d(\cos x) = -\frac{1}{2} \cos^2 x + c_2 \\ \Rightarrow I_1 &= I_2 \quad \left(c_2 = \frac{1}{2} + c_1 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \int \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2} \int \sin 2x \, dx = -\frac{1}{4} \cos 2x + c_3 \\ &= -\frac{1}{4}(2 \cos^2 x - 1) + c_3 = -\frac{1}{2} \cos^2 x + \frac{1}{4} + c_3 \\ \Rightarrow I_3 &= I_2 \quad \left(c_2 = \frac{1}{4} + c_3 \right) \end{aligned}$$

Opdracht 47 bladzijde 130

$\int \frac{\cos 2x}{(\cos x + \sin x)^2} \, dx$ is gelijk aan

A $\frac{1}{2} \ln(\cos x + \sin x) + c$

C $\frac{1}{2} \ln(\cos x - \sin x) + c$

B $\frac{1}{2} \ln(1 + \sin 2x) + c$

D $\frac{1}{2} \ln(1 - \sin 2x) + c$

(Bron © ACTM State Math Contest, 2009)

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos 2x}{(\cos x + \sin x)^2} \, dx &= \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x + 2 \cos x \sin x + \sin^2 x} \, dx \\ &= \int \frac{\cos 2x}{1 + \sin 2x} \, dx \end{aligned}$$

$$u = 1 + \sin 2x \Rightarrow du = 2 \cos 2x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + c = \frac{1}{2} \ln |1 + \sin 2x| + c = \frac{1}{2} \ln(1 + \sin 2x) + c \quad (\text{want } \sin 2x \text{ ligt tussen } -1 \text{ en } 1)$$

Antwoord B is juist.

Opdracht 48 bladzijde 130

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heeft als voorschrift $f(t) = ae^{-\frac{t}{T}}$, met a en T constant.
Verder weten we dat $f(0) = e$ en $f(2) = 1$.

Bereken $\int_0^2 f(t) dt$.

A $e - 1$

B $2e - 2$

C $2e$

D $2 - \frac{2}{e}$

E 1

(Bron © IJkingstoets burgerlijk ingenieur, 2012)

$$\bullet \quad f(t) = a e^{-\frac{t}{T}}$$

$$f(0) = e \Leftrightarrow a = e$$

$$f(2) = 1 \underset{a=e}{\Leftrightarrow} e \cdot e^{-\frac{2}{T}} = 1 \Leftrightarrow e^{1-\frac{2}{T}} = 1 \Leftrightarrow T = 2$$

$$\Rightarrow f(t) = e \cdot e^{-\frac{t}{2}} = e^{1-\frac{t}{2}}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \int_0^2 e^{1-\frac{t}{2}} dt &= -2 \int_0^2 e^{1-\frac{t}{2}} d\left(1 - \frac{t}{2}\right) \\ &= -2 \left[e^{1-\frac{t}{2}} \right]_0^2 = -2(1 - e) = 2e - 2 \end{aligned}$$

Antwoord B is juist.

Opdracht 49 bladzijde 130

Bereken $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin x} dx$.

(Bron © University of Cincinnati Math Contest, 2007)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin x} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right)^2} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right) dx$$

$\cos x$ en $\sin x$ zijn positief in het eerste kwadrant

$$= \left[2 \sin \frac{x}{2} - 2 \cos \frac{x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 2 \left(\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} - (\sin 0 - \cos 0) \right)$$

$$= 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right)$$

$$= 2$$

Opdracht 50 bladzijde 130**Integralen van de vorm $\int \sin^n x \cos^m x dx$ met m of n oneven***Voorbeeld*

Om de integraal $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$ te berekenen, schrijven we $\cos^3 x$ als

$\cos^2 x \cos x = (1 - \sin^2 x) \cos x$. Nu kunnen we de substitutie $u = \sin x$ toepassen.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \cos^3 x dx &= \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \cos x dx & u = \sin x &\Rightarrow du = \cos x dx \\
 &= \int u^2 (1 - u^2) du \\
 &= \int (u^2 - u^4) du \\
 &= \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + c \\
 &= \frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + c
 \end{aligned}$$

Bereken op analoge manier.

$$1 \quad \int \sin^3 2x \cos^2 2x dx = \int \sin^2 2x \cdot \cos^2 2x \cdot \sin 2x dx = \int (1 - \cos^2 2x) \cos^2 2x \cdot \sin 2x dx$$

$$u = \cos 2x \Rightarrow du = -2 \sin 2x dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int (1 - u^2) u^2 du = -\frac{1}{2} \int (u^2 - u^4) du$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} \right) + c$$

$$= -\frac{1}{6} \cos^3 2x + \frac{1}{10} \cos^5 2x + c$$

$$2 \quad \int \sin^5 x dx = \int \sin^4 x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^2 \sin x dx$$

$$u = \cos x \Rightarrow du = -\sin x dx$$

$$= -\int (1 - u^2)^2 du = -\int (1 - 2u^2 + u^4) du$$

$$= -\frac{u^5}{5} + \frac{2}{3} u^3 - u + c$$

$$= -\frac{1}{5} \cos^5 x + \frac{2}{3} \cos^3 x - \cos x + c$$

Opdracht 51 bladzijde 131**Integralen van de vorm $\int \sin^n x \cos^m x \, dx$ met m en n even***Voorbeeld*

Om de integraal $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$ te berekenen, moeten we beroep doen op goniometrische formules.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \cos^2 x \, dx &= \int (\sin x \cos x)^2 \, dx & \sin 2x &= 2 \sin x \cos x \\
 &= \int \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right)^2 \, dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \sin^2 2x \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{1 - \cos 4x}{2} \, dx \\
 &= \frac{1}{8} \int dx - \frac{1}{8} \int \cos 4x \, dx \\
 &= \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + c
 \end{aligned}$$

Bereken op analoge manier.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1} \quad & \int \cos^4 x \, dx \\
 &= \int \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 \, dx = \frac{1}{4} \int (1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{4} x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2x \, d(2x) + \frac{1}{4} \int \frac{1 + \cos 4x}{2} \, dx \\
 &= \frac{1}{4} x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} x + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \int \cos 4x \, d(4x) \\
 &= \frac{3}{8} x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2} \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \, dx \\
 & \cdot \int \sin^4 x \, dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 \, dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{4} x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2x \, d(2x) + \frac{1}{4} \int \frac{1 + \cos 4x}{2} \, dx \\
 &= \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} x + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \int \cos 4x \, d(4x) \\
 &= \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + c \\
 & \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \, dx = \left[\frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{3\pi}{16}
 \end{aligned}$$

Opdracht 52 bladzijde 131**De t-formules**

Sommige goniometrische integralen kunnen berekend worden met de volgende substitutie:

$$t = \tan \frac{x}{2} \Rightarrow dt = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \left(1 + \tan^2 \frac{x}{2} \right) dx = \frac{1+t^2}{2} dx$$

$$\Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

Dan is:

$$\tan x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1-t^2}$$

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1+t^2} - 1 = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\sin x = \cos x \tan x = \frac{2t}{1+t^2}$$

Voorbeeld

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin x} &= \int \frac{1+t^2}{2t} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt & t = \tan \frac{x}{2} \\ &= \int \frac{dt}{t} \\ &= \ln |t| + c \\ &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c \end{aligned}$$

Bereken door gebruik te maken van de t-formules.

$$\begin{aligned} \mathbf{1} \quad \int \frac{dx}{1 + \sin x} &= \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} dt & t = \tan \frac{x}{2} \\ &= \int \frac{2}{1+t^2+2t} dt = 2 \int \frac{d(t+1)}{(t+1)^2} \\ &= 2 \cdot \frac{(t+1)^{-1}}{-1} + c = -\frac{2}{t+1} + c \\ &= -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \quad & \int \frac{dx}{\sin x + \cos x + 1} \quad t = \tan \frac{x}{2} \\
 &= \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} + 1} dt \\
 &= \int \frac{2}{2t+1-t^2+1+t^2} dt = \int \frac{1}{t+1} d(t+1) \\
 &= \ln|t+1| + c = \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| + c
 \end{aligned}$$

Opdracht 53 bladzijde 132

Bereken de volgende integralen door ze te herleiden tot $\int \frac{du}{\sqrt{k-u^2}}$ of $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+k}}$.

$$\begin{aligned}
 1 \quad & \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 4x + 5}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(2x+1)^2 + 4}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+1)}{\sqrt{(2x+1)^2 + 4}} \\
 &= \frac{1}{2} \ln |2x+1 + \sqrt{4x^2 + 4x + 5}| + c \\
 2 \quad & \int \frac{dx}{\sqrt{-25x^2 - 20x}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4 - (5x+2)^2}} = \frac{1}{5} \int \frac{d(5x+2)}{\sqrt{4 - (5x+2)^2}} \\
 &= \frac{1}{5} \text{Bgsin} \left(\frac{5}{2}x + 1 \right) + c \\
 3 \quad & \int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 + 20x}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(5x+2)^2 - 4}} = \frac{1}{5} \int \frac{d(5x+2)}{\sqrt{(5x+2)^2 - 4}} \\
 &= \frac{1}{5} \ln |5x+2 + \sqrt{25x^2 + 20x}| + c \\
 4 \quad & \int \frac{dx}{\sqrt{12 - 12x - 9x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{16 - (3x+2)^2}} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x+2)}{\sqrt{16 - (3x+2)^2}} \\
 &= \frac{1}{3} \text{Bgsin} \frac{3x+2}{4} + c
 \end{aligned}$$

Opdracht 54 bladzijde 132

$$\begin{aligned}
 1 \quad & \text{Bereken } \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx. \\
 & \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = - \int_0^\pi \frac{d(\cos x)}{1 + \cos^2 x} = - [\text{Bgtan}(\cos x)]_0^\pi \\
 &= -(\text{Bgtan}(-1) - \text{Bgtan}(1)) = - \left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

2 Toon aan dat voor een functie f , die continu is in $[0, a]$, geldt:

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

$$\int_0^a f(a-x) dx$$

$$u = a - x \Rightarrow du = -dx$$

$$x = 0 \Rightarrow u = a$$

$$x = a \Rightarrow u = 0$$

$$= -\int_a^0 f(u) du = \int_0^a f(u) du = \int_0^a f(x) dx$$

3 Maak gebruik van 1 en 2 om $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ te berekenen.

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^\pi \frac{(\pi - x) \sin(\pi - x)}{1 + \cos^2(\pi - x)} dx$$

$$= \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx - \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$\begin{aligned} \sin(\pi - x) &= \sin x \\ \cos(\pi - x) &= -\cos x \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2 \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{4}$$

Opdracht 55 bladzijde 132

Als $I(n) = \int_0^\pi \sin(nx) dx$, bepaal dan $\sum_{n=0}^{+\infty} I(5^n)$.

(Bron © Rice University Mathematics Tournament, 2007)

$$\begin{aligned} \bullet \quad I(n) &= \int_0^\pi \sin(nx) dx = \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin(nx) d(nx) \\ &= -\frac{1}{n} [\cos(nx)]_0^\pi = -\frac{1}{n} (\cos(n\pi) - 1) \\ &= -\frac{1}{n} (\pm 1 - 1) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{als } n \text{ even is} \\ \frac{2}{n} & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\bullet \quad \sum_{n=0}^{+\infty} I(5^n) = I(5^0) + I(5^1) + I(5^2) + \dots$$

$$= I(1) + I(5) + I(25) + \dots$$

$$= 2 + \frac{2}{5} + \frac{2}{25} + \dots$$

$$\Downarrow \text{som van een oneindige MR, } u_1 = 2, q = \frac{1}{5}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{5}{2}$$

Opdracht 56 bladzijde 133

Bereken

$$1 \quad \int x \sin 3x \, dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \sin 3x \, dx \Rightarrow v = \frac{1}{3} \int \sin 3x \, d(3x) = -\frac{1}{3} \cos 3x$$

$$= -\frac{1}{3} x \cos 3x + \frac{1}{3} \int \cos 3x \, dx$$

$$= -\frac{1}{3} x \cos 3x + \frac{1}{9} \int \cos 3x \, d(3x)$$

$$= -\frac{1}{3} x \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x + c$$

$$2 \quad \int \ln(4x) \, dx$$

$$u = \ln(4x) \Rightarrow du = \frac{1}{4x} \cdot 4 \, dx = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x \ln(4x) - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$= x \ln(4x) - x + c$$

$$3 \quad \int x^2 e^{-\frac{1}{2}x} \, dx$$

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x \, dx$$

$$dv = e^{-\frac{1}{2}x} \Rightarrow v = -2 \int e^{-\frac{1}{2}x} \, d\left(-\frac{1}{2}x\right) = -2e^{-\frac{1}{2}x}$$

$$= -2x^2 e^{-\frac{1}{2}x} + 4 \int x e^{-\frac{1}{2}x} \, dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = e^{-\frac{1}{2}x} \Rightarrow v = -2e^{-\frac{1}{2}x}$$

$$= -2x^2 e^{-\frac{1}{2}x} + 4 \left(-2x e^{-\frac{1}{2}x} + 2 \int e^{-\frac{1}{2}x} \, dx \right)$$

$$= -2x^2 e^{-\frac{1}{2}x} + 4 \left(-2x e^{-\frac{1}{2}x} - 4 e^{-\frac{1}{2}x} \right) + c$$

$$= -2x^2 e^{-\frac{1}{2}x} - 8x e^{-\frac{1}{2}x} - 16 e^{-\frac{1}{2}x} + c$$

$$4 \quad \int e^{-x} \cos 4x \, dx$$

$$u = \cos 4x \Rightarrow du = -4 \sin 4x \, dx$$

$$dv = e^{-x} \, dx \Rightarrow v = \int e^{-x} \, dx = -\int e^{-x} \, d(-x) = -e^{-x}$$

$$= -e^{-x} \cos 4x - 4 \int e^{-x} \sin 4x \, dx$$

$$u = \sin 4x \Rightarrow du = 4 \cos 4x \, dx$$

$$dv = e^{-x} \, dx \Rightarrow v = -e^{-x}$$

$$= -e^{-x} \cos 4x - 4 \left(-e^{-x} \sin 4x + 4 \int e^{-x} \cos 4x \, dx \right)$$

$$= -e^{-x} \cos 4x + 4e^{-x} \sin 4x - 16 \int e^{-x} \cos 4x \, dx$$

$$\Rightarrow 17 \int e^{-x} \cos 4x \, dx = -e^{-x} \cos 4x + 4e^{-x} \sin 4x + c$$

$$\Rightarrow \int e^{-x} \cos 4x \, dx = -\frac{1}{17} e^{-x} \cos 4x + \frac{4}{17} e^{-x} \sin 4x + c$$

$$5 \quad \int x^4 \ln x \, dx$$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} \, dx$$

$$dv = x^4 \, dx \Rightarrow v = \int x^4 \, dx = \frac{x^5}{5}$$

$$= \frac{x^5}{5} \ln x - \frac{1}{5} \int \frac{1}{x} \cdot x^5 \, dx$$

$$= \frac{x^5}{5} \ln x - \frac{1}{5} \int x^4 \, dx$$

$$= \frac{x^5}{5} \ln x - \frac{1}{25} x^5 + c$$

$$= \frac{1}{25} x^5 (5 \ln x - 1) + c$$

$$6 \quad \int (\ln x)^2 \, dx$$

$$u = (\ln x)^2 \Rightarrow du = 2(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x \, dx$$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} \, dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x(\ln x)^2 - 2 \left(x \ln x - \int dx \right)$$

$$= x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + c$$

$$7 \int 2^x \sin x \, dx$$

$$u = 2^x \Rightarrow du = 2^x \cdot (\ln 2) dx$$

$$dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x$$

$$= -2^x \cos x + (\ln 2) \int 2^x \cos x \, dx$$

$$u = 2^x \Rightarrow du = 2^x \cdot (\ln 2) dx$$

$$dv = \cos x \, dx \Rightarrow v = \sin x$$

$$= -2^x \cos x + (\ln 2) \left(2^x \sin x - (\ln 2) \int 2^x \sin x \, dx \right)$$

$$= -2^x \cos x + 2^x \cdot (\ln 2) \cdot \sin x - (\ln^2 2) \cdot \int 2^x \sin x \, dx$$

$$\Rightarrow (1 + \ln^2 2) \int 2^x \sin x \, dx = -2^x \cos x + 2^x (\ln 2) \sin x + c$$

$$\Rightarrow \int 2^x \sin x \, dx$$

$$= \frac{-2^x}{1 + \ln^2 2} \cos x + \frac{2^x}{1 + \ln^2 2} (\ln 2) \sin x + c$$

$$8 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \sin x \, dx$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow du = \frac{x}{1-x^2} dx$$

$$dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cos x - \int \frac{x}{1-x^2} \cos x \, dx$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cos x + \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cos x + \sqrt{1-x^2} + c$$

Opdracht 57 bladzijde 133

Bereken

$$1 \int_{-1}^1 x^2 e^x \, dx$$

$$\bullet \int x^2 e^x \, dx$$

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x \, dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$$

$$= x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$$

$$= x^2 e^x - 2 \left(x e^x - \int e^x \, dx \right)$$

$$= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + c$$

$$= e^x (x^2 - 2x + 2) + c$$

$$\bullet \int_{-1}^1 x^2 e^x \, dx = \left[e^x (x^2 - 2x + 2) \right]_{-1}^1 = e - \frac{1}{e} \cdot 5 = \frac{e^2 - 5}{e}$$

$$2 \int_1^e \ln x \, dx$$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx$$

$$= [x \ln x]_1^e - [x]_1^e$$

$$= e - (e - 1)$$

$$= 1$$

$$3 \int_0^\pi x^2 \sin 3x \, dx$$

$$\cdot \int x^2 \sin 3x \, dx$$

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x \, dx$$

$$dv = \sin 3x \, dx \Rightarrow v = \frac{1}{3} \int \sin 3x \, d(3x) = -\frac{1}{3} \cos 3x$$

$$= -\frac{1}{3} x^2 \cos 3x + \frac{2}{3} \int x \cos 3x \, dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \cos 3x \, dx \Rightarrow v = \frac{1}{3} \int \cos 3x \, d(3x) = \frac{1}{3} \sin 3x$$

$$= -\frac{1}{3} x^2 \cos 3x + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} x \sin 3x - \frac{1}{9} \int \sin 3x \, d(3x) \right)$$

$$= -\frac{1}{3} x^2 \cos 3x + \frac{2}{9} x \sin 3x + \frac{2}{27} \cos 3x + c$$

$$\cdot \int_0^\pi x^2 \sin 3x \, dx = \left[-\frac{1}{3} x^2 \cos 3x + \frac{2}{9} x \sin 3x + \frac{2}{27} \cos 3x \right]_0^\pi$$

$$= \frac{1}{3} \pi^2 - \frac{2}{27} - \frac{2}{27}$$

$$= \frac{1}{3} \pi^2 - \frac{4}{27}$$

$$= \frac{9\pi^2 - 4}{27}$$

$$4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \sin \frac{1}{2}x \, dx$$

$$\bullet \int e^{2x} \sin \frac{1}{2}x \, dx$$

$$u = \sin \frac{1}{2}x \Rightarrow du = \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2}x \, dx$$

$$dv = e^{2x} dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$= \frac{1}{2} e^{2x} \sin \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \int e^{2x} \cos \frac{1}{2}x \, dx$$

$$u = \cos \frac{1}{2}x \Rightarrow du = -\frac{1}{2} \sin \frac{1}{2}x \, dx$$

$$dv = e^{2x} dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$= \frac{1}{2} e^{2x} \sin \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} e^{2x} \cos \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \int e^{2x} \sin \frac{1}{2}x \, dx \right)$$

$$= \frac{1}{2} e^{2x} \sin \frac{1}{2}x - \frac{1}{8} e^{2x} \cos \frac{1}{2}x - \frac{1}{16} \int e^{2x} \sin \frac{1}{2}x \, dx$$

$$\Rightarrow \frac{17}{16} \int e^{2x} \sin \frac{1}{2}x \, dx = \frac{1}{8} e^{2x} \left(4 \sin \frac{1}{2}x - \cos \frac{1}{2}x \right) + c$$

$$\Rightarrow \int e^{2x} \sin \frac{1}{2}x \, dx = \frac{2}{17} e^{2x} \left(4 \sin \frac{1}{2}x - \cos \frac{1}{2}x \right) + c$$

$$\bullet \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \sin \frac{1}{2}x \, dx = \frac{2}{17} \left[e^{2x} \left(4 \sin \frac{1}{2}x - \cos \frac{1}{2}x \right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{2}{17} \left(e^{\pi} \left(4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - (-1) \right)$$

$$= \frac{2}{17} \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} e^{\pi} + 1 \right)$$

$$= \frac{3\sqrt{2}e^{\pi} + 2}{17}$$

Opdracht 58 bladzijde 133

De bepaalde integraal $\int_0^{\pi} x(\sin x + \cos x) dx$ is gelijk aan

A $\frac{\pi}{2}$

B $-\frac{\pi}{2}$

C $\pi + 2$

D $\pi - 2$

(Bron © Toelatingsproef arts-tandarts)

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = (\sin x + \cos x) dx \Rightarrow v = -\cos x + \sin x$$

$$= [x(\sin x - \cos x)]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (\sin x - \cos x) dx$$

$$= [x(\sin x - \cos x)]_0^{\pi} - [-\cos x - \sin x]_0^{\pi}$$

$$= \pi(0 + 1) + (-1 - (-1))$$

$$= \pi - 2$$

Antwoord D is juist.

Opdracht 59 bladzijde 133

Bereken de oppervlakte van het gebied begrensd door de grafiek van de functie met voorschrift $f(x) = (x^2 - 1)e^{-x}$ en de x-as.

- nulpunten van f: -1 en 1

- f is negatief over $[-1, 1]$

- $A = - \int_{-1}^1 (x^2 - 1) e^{-x} dx$

- $\int (x^2 - 1) e^{-x} dx$

$$u = x^2 - 1 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$dv = e^{-x} dx \Rightarrow v = -e^{-x}$$

$$= -(x^2 - 1) e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = e^{-x} dx \Rightarrow v = -e^{-x}$$

$$= -(x^2 - 1) e^{-x} + 2(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx)$$

$$= -(x^2 - 1) e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + c$$


$$= -e^{-x}(x^2 - 1 + 2x + 2) + c$$

$$= -e^{-x}(x^2 + 2x + 1) + c$$

$$= -e^{-x}(x + 1)^2 + c$$

- $A = [e^{-x}(x + 1)^2]_{-1}^1$

$$= \frac{4}{e}$$



Opdracht 60 bladzijde 133

Bereken

$$1 \quad \int \cos(\ln x) \, dx$$

$$u = \cos(\ln x) \Rightarrow du = -\sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) \, dx$$

$$u = \sin(\ln x) \Rightarrow du = \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) \, dx$$

$$\Rightarrow 2 \int \cos(\ln x) \, dx = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) + c$$

$$\Rightarrow \int \cos(\ln x) \, dx = \frac{1}{2} x \cos(\ln x) + \frac{1}{2} x \sin(\ln x) + c$$

$$2 \quad \int \frac{x-1}{x^2} \ln x \, dx$$

$$= \int \frac{\ln x}{x} \, dx - \int \frac{1}{x^2} \ln x \, dx$$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} \, dx$$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} \, dx$$

$$dv = \frac{1}{x^2} \, dx \Rightarrow v = -\frac{1}{x}$$

$$= \int u \, du - \left(-\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{1}{x^2} \, dx \right)$$

$$= \frac{u^2}{2} + \frac{1}{x} \ln x + \frac{1}{x} + c$$

$$= \frac{\ln^2 x}{2} + \frac{1}{x} \ln x + \frac{1}{x} + c$$

$$3 \quad \int \frac{x}{\cos^2 x} \, dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \frac{1}{\cos^2 x} \, dx \Rightarrow v = \tan x$$

$$= x \tan x - \int \tan x \, dx$$

$$= x \tan x - \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx$$

$$= x \tan x + \int \frac{d(\cos x)}{\cos x}$$

$$= x \tan x + \ln |\cos x| + c$$

$$\begin{aligned}
4 \quad & \int (2x + e^x)^2 dx \\
&= \int (4x^2 + 4xe^x + e^{2x}) dx \\
&= \frac{4x^3}{3} + 4 \int \underset{\substack{\downarrow \\ u=x \Rightarrow du=dx \\ dv=e^x dx \Rightarrow v=e^x}}{xe^x} dx + \frac{1}{2} \int e^{2x} d(2x) \\
&= \frac{4}{3}x^3 + 4 \left(xe^x - \int e^x dx \right) + \frac{1}{2}e^{2x} \\
&= \frac{4}{3}x^3 + 4xe^x - 4e^x + \frac{1}{2}e^{2x} + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
5 \quad & \int x^3 e^{x^2} dx \\
&\bullet \text{ We voeren eerst de substitutie } t = x^2 \text{ uit:} \\
&\quad t = x^2 \Rightarrow dt = 2x dx \\
&\quad \int x^3 e^{x^2} dx = \int x^2 \cdot e^{x^2} \cdot x dx \\
&\quad = \frac{1}{2} \int t e^t dt \\
&\bullet \frac{1}{2} \int t e^t dt \\
&\quad u = t \Rightarrow du = dt \\
&\quad dv = e^t dt \Rightarrow v = e^t \\
&= \frac{1}{2} (te^t - \int e^t dt) \\
&= \frac{1}{2} (te^t - e^t) + c \\
&= \frac{1}{2} e^t (t - 1) + c \\
&\bullet \int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} (x^2 - 1) + c
\end{aligned}$$

Opdracht 61 bladzijde 134

Bereken de oppervlakte van het gebied begrensd door de grafiek van de functie met voorschrift $f(x) = 4xe^{-x}$, de x-as en de verticale rechten door het maximum en het buigpunt van de grafiek van f .

- $f(x) = 4xe^{-x}$

$$f'(x) = 4(e^{-x} - xe^{-x}) = 4e^{-x}(1 - x)$$

$$\Rightarrow \text{nulpunt: } 1 \text{ (met tekenwissel)}$$

$$f''(x) = -4e^{-x}(1 - x) - 4e^{-x} = -4e^{-x}(2 - x)$$

$$\Rightarrow \text{nulpunt: } 2 \text{ (met tekenwissel)}$$

De verticale rechten hebben als vergelijking $x = 1$ en $x = 2$.

- f is positief over $[1, 2]$

$$\Rightarrow A = 4 \int_1^2 xe^{-x} dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$


$$dv = e^{-x} dx \Rightarrow v = -e^{-x}$$

$$= 4 \left(-[xe^{-x}]_1^2 + \int_1^2 e^{-x} dx \right)$$

$$= 4 \left(-\left(\frac{2}{e^2} - \frac{1}{e}\right) - [e^{-x}]_1^2 \right)$$

$$= 4 \left(-\frac{2}{e^2} + \frac{1}{e} - \frac{1}{e^2} + \frac{1}{e} \right)$$

$$= 4 \cdot \frac{2e - 3}{e^2}$$

**Opdracht 62 bladzijde 134**

Door partiële integratie wordt

$$\int_a^b Bg \sin \sqrt{x} dx = b Bg \sin \sqrt{b} - a Bg \sin \sqrt{a} - \int_a^b \sqrt{q(x)} dx$$

Bepaal de rationale functie $q(x)$.

$$\int Bg \sin \sqrt{x} dx$$

$$u = Bg \sin \sqrt{x} \Rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x Bg \sin \sqrt{x} - \int \frac{x}{2\sqrt{1-x} \cdot \sqrt{x}} dx$$

$$= x Bg \sin \sqrt{x} - \int \sqrt{\frac{x^2}{4x - 4x^2}} dx$$

$$\Rightarrow q(x) = \frac{x^2}{4x - 4x^2}$$

Opdracht 63 bladzijde 134

Bereken $\int x \operatorname{Bgsin} x \, dx$.

$$\int x \operatorname{Bgsin} x \, dx$$

$$u = \operatorname{Bgsin} x \Rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

$$dv = x \, dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} x^2$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{Bgsin} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \Rightarrow v = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2}$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{Bgsin} x - \frac{1}{2} \left(-x \sqrt{1-x^2} + \int \sqrt{1-x^2} \, dx \right)$$

$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx = \int \frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \operatorname{Bgsin} x - \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

$$\Rightarrow 2 \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = -x \sqrt{1-x^2} + \operatorname{Bgsin} x + c$$

$$\Rightarrow \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = -\frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \operatorname{Bgsin} x + c$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{Bgsin} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{4} \operatorname{Bgsin} x + c$$

Opdracht 64 bladzijde 134

Gegeven: $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} \, dx \quad (n \in \mathbb{N})$

- 1 Toon aan dat $I_0 = \frac{2}{3}$.

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_0^1 \sqrt{1-x} \, dx \\ &= -\int_0^1 \sqrt{1-x} \, d(1-x) \\ &= -\frac{2}{3} \left[(1-x)^{3/2} \right]_0^1 \\ &= -\frac{2}{3} (0-1) \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

- 2 Toon met behulp van partiële integratie aan dat $I_n = \frac{2n}{2n+3} \cdot I_{n-1}$.

$$\begin{aligned} &\int x^n \sqrt{1-x} \, dx \\ &u = x^n \Rightarrow du = nx^{n-1} dx \\ &dv = \sqrt{1-x} \, dx \Rightarrow v = -\int (1-x)^{\frac{1}{2}} d(1-x) = -\frac{2}{3} (1-x)^{\frac{3}{2}} \\ &= -\frac{2}{3} x^n \sqrt{(1-x)^3} + \frac{2}{3} n \int x^{n-1} (1-x)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= -\frac{2}{3} x^n \sqrt{(1-x)^3} + \frac{2}{3} n \int x^{n-1} (1-x) \sqrt{1-x} \, dx \\ &= -\frac{2}{3} x^n \sqrt{(1-x)^3} + \frac{2}{3} n \int x^{n-1} \sqrt{1-x} \, dx - \frac{2}{3} n \int x^n \sqrt{1-x} \, dx \\ &\Rightarrow \left(1 + \frac{2}{3} n \right) \int x^n \sqrt{1-x} \, dx = -\frac{2}{3} x^n \sqrt{(1-x)^3} + \frac{2}{3} n \int x^{n-1} \sqrt{1-x} \, dx \\ &\Rightarrow \int x^n \sqrt{1-x} \, dx = \frac{3}{2n+3} \left(-\frac{2}{3} x^n \sqrt{(1-x)^3} + \frac{2}{3} n \int x^{n-1} \sqrt{1-x} \, dx \right) \\ &\text{Dus: } \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} \, dx = \frac{3}{2n+3} \left(0-0 + \frac{2}{3} n \int_0^1 x^{n-1} \sqrt{1-x} \, dx \right) \\ &= \frac{2n}{2n+3} I_{n-1} \end{aligned}$$

- 3 Maak gebruik van 1 en 2 om aan te tonen dat $I_2 = \frac{16}{105}$.

$$I_2 = \frac{4}{7} I_1 = \frac{4}{7} \cdot \frac{2}{5} I_0 = \frac{8}{35} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{105}$$

Opdracht 65 bladzijde 134

Gegeven: $G(n) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx$ met $n \in \mathbb{N}_0$

- 1 Toon aan dat $G(1) = 1$. Hou rekening met de eigenschap $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$.

$$\begin{aligned}
 G(1) &= \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \\
 &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a x e^{-x} dx \\
 &\quad u = x \Rightarrow du = dx \\
 &\quad dv = e^{-x} dx \Rightarrow v = -e^{-x} \\
 \int_0^a x e^{-x} dx &= -[x e^{-x}]_0^a + \int_0^a e^{-x} dx \\
 &= -[x e^{-x}]_0^a - [e^{-x}]_0^a \\
 &= -a e^{-a} - (e^{-a} - 1) \\
 &= -a e^{-a} - e^{-a} + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 G(1) &= \lim_{a \rightarrow +\infty} (-a e^{-a} - e^{-a} + 1) \\
 &= -\lim_{a \rightarrow +\infty} a e^{-a} - \lim_{a \rightarrow +\infty} e^{-a} + 1 \\
 &= 0 - 0 + 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

- 2 Toon met behulp van partiële integratie aan dat $G(n+1) = (n+1)G(n)$.

$$\begin{aligned}
 G(n+1) &= \int_0^{+\infty} x^{n+1} e^{-x} dx \\
 &\bullet \int x^{n+1} e^{-x} dx \\
 &\quad u = x^{n+1} \Rightarrow du = (n+1)x^n dx \\
 &\quad dv = e^{-x} dx \Rightarrow v = -e^{-x} \\
 &= -x^{n+1} e^{-x} + (n+1) \int x^n e^{-x} dx \\
 &\bullet \int_0^{+\infty} x^{n+1} e^{-x} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} (-a^{n+1} e^{-a}) + (n+1) \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx \\
 &\quad = 0 + (n+1) \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx \\
 &\Rightarrow G(n+1) = (n+1) G(n)
 \end{aligned}$$

- 3 Maak gebruik van 1 en 2 om aan te tonen dat $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$.

$$G(1) = 1! \quad \text{uit 1}$$

$$G(2) = 2 \cdot G(1) = 2 \cdot 1 = 2! \quad \text{uit 2}$$

$$G(3) = 3 \cdot G(2) = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! \quad \text{uit 2}$$

...

$$\Rightarrow G(n) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n! \quad \text{voor elk natuurlijk getal } n$$

Opmerking:

We hebben hier een bewijs door inductie gebruikt (zie opdracht 42 hoofdstuk 4)

Opdracht 66 bladzijde 135

$\int \frac{x^5}{1+x^2} dx$ is gelijk aan

A $\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \ln \sqrt{1+x^2} + c$

B $\frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + \ln \sqrt{1+x^2} + c$

C $\frac{x^4}{4} + \frac{3x^2}{2} + \ln \sqrt{1+x^2} + c$

D $\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + \ln \sqrt{1+x^2} + c$

E geen van de voorgaande

(Bron © University of Central Arkansas Regional Math Contest, 2009)

$$\int \frac{x^5}{1+x^2} dx$$

$$\begin{aligned} &= \int \left(x^3 - x + \frac{x}{1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} \\ &= \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + c \\ &= \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \ln(1+x^2)^{\frac{1}{2}} + c \\ &= \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \ln \sqrt{1+x^2} + c \end{aligned}$$

Antwoord A is juist.

$$\begin{array}{r} x^5 \quad \overline{) x^2 + 1} \\ \underline{\mp x^5 \mp x^3} \quad x^3 - x \\ -x^3 \\ \underline{\pm x^3 \pm x} \quad x \end{array}$$

Opdracht 67 bladzijde 135

Bereken

1 $\int \frac{2x^2 + 3x}{2x-1} dx$

$$\begin{aligned} &= \int \left(x + 2 + \frac{2}{2x-1} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} + 2x + 2 \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d(2x-1)}{2x-1} \\ &= \frac{x^2}{2} + 2x + \ln|2x-1| + c \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 3x \quad \overline{) 2x - 1} \\ \underline{\mp 2x^2 \pm x} \quad x + 2 \\ 4x \\ \underline{\mp 4x \pm 2} \quad 2 \end{array}$$

$$2 \int \frac{x^3}{3x-1} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{9}x + \frac{1}{27} + \frac{\frac{1}{27}}{3x-1} \right) dx$$

$$= \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{18}x^2 + \frac{1}{27}x + \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{3} \int \frac{d(3x-1)}{3x-1}$$

$$= \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{18}x^2 + \frac{1}{27}x + \frac{1}{81} \ln |3x-1| + c$$

$$\begin{array}{r} x^3 \quad \quad \quad | \quad 3x-1 \\ \hline \mp x^3 \pm \frac{1}{3}x^2 \\ \hline \frac{1}{3}x^2 \\ \mp \frac{1}{3}x^2 \pm \frac{1}{9}x \\ \hline \frac{1}{9}x \\ \mp \frac{1}{9}x \pm \frac{1}{27} \\ \hline \frac{1}{27} \end{array}$$

$$3 \int \frac{2x^4}{x^2+1} dx$$

$$= 2 \int \frac{x^4}{x^2+1} dx$$

$$= 2 \int \left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2+1} \right) dx$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - 2x + 2 \operatorname{Bgtan} x + c$$

$$\begin{array}{r} x^4 \quad \quad \quad | \quad x^2+1 \\ \hline \mp x^4 \mp x^2 \\ \hline -x^2 \\ \pm x^2 \pm 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$4 \int \frac{dx}{x(x+1)}$$

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} = \frac{(A+B)x + A}{x(x+1)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \end{cases}$$

$$= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x+1}$$

$$= \ln|x| - \ln|x+1| + c$$

$$= \ln \left| \frac{x}{x+1} \right| + c$$

$$5 \int \frac{dx}{x^2 - 2x}$$

$$\frac{1}{x^2 - 2x} = \frac{1}{x(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} = \frac{(A+B)x - 2A}{x(x-2)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ -2A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-\frac{1}{2} \\ B=\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-2}$$

$$= -\frac{1}{2} \ln |x| + \frac{1}{2} \ln |x-2| + c$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-2}{x} \right| + c$$

$$6 \int \frac{2x+1}{x^2 - 2x + 1} dx$$

$$\frac{2x+1}{x^2 - 2x + 1} = \frac{2x+1}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} = \frac{Ax - A + B}{(x-1)^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A=2 \\ -A+B=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=3 \end{cases}$$

$$= 2 \int \frac{dx}{x-1} + 3 \int \frac{dx}{(x-1)^2}$$

$$= 2 \ln |x-1| - \frac{3}{x-1} + c$$

$$7 \int \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 2x + 2} dx$$

$$= \int \frac{x^2 + 2x + 2 - 5}{x^2 + 2x + 2} dx \quad (\text{of euclidische deling})$$

$$= \int dx - 5 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$$

$\hookrightarrow D < 0$

$$= x - 5 \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 1}$$

$$= x - 5 \operatorname{Bgtan}(x+1) + c$$

$$8 \quad \int \frac{x+1}{2x^2-9x+4} dx$$

\downarrow
 $D > 0$

$$\frac{x+1}{2x^2-9x+4} = \frac{x+1}{(x-4)(2x-1)} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{2x-1} = \frac{(2A+B)x - A - 4B}{(x-4)(2x-1)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2A+B=1 \\ -A-4B=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=\frac{5}{7} \\ B=-\frac{3}{7} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{5}{7} \int \frac{dx}{x-4} - \frac{3}{7} \int \frac{dx}{2x-1} \\ &= \frac{5}{7} \int \frac{d(x-4)}{x-4} - \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d(2x-1)}{2x-1} \\ &= \frac{5}{7} \ln|x-4| - \frac{3}{14} \ln|2x-1| + c \end{aligned}$$

$$9 \quad \int \frac{x^3-4}{x^2+4x+4} dx$$

\downarrow
 $D > 0$

$$\begin{aligned} &= \int \left(x-4 + \frac{12x+12}{x^2+4x+4} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} - 4x + \int \frac{12x+12}{x^2+4x+4} dx \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} x^3 \quad \quad \quad - 4 \quad \left| \begin{array}{l} x^2+4x+4 \\ \hline x^3 \quad \quad \quad 4x^2 \quad \quad \quad 4x \end{array} \right. \\ \hline -4x^2 \quad -4x \quad -4 \\ \hline \pm 4x^2 \pm 16x \pm 16 \\ \hline 12x+12 \end{array}$$

$$\frac{12x+12}{x^2+4x+4} = \frac{12x+12}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} = \frac{Ax+2A+B}{(x+2)^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A=12 \\ 2A+B=12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=12 \\ B=-12 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{x^2}{2} - 4x + 12 \int \frac{dx}{x+2} - 12 \int \frac{dx}{(x+2)^2} \\ &= \frac{x^2}{2} - 4x + 12 \ln|x+2| + \frac{12}{x+2} + c \end{aligned}$$

$$10 \quad \int \frac{2x+3}{x^2+2x+4} dx$$

\downarrow
 $D < 0$

$$= \int \frac{(2x+2)+1}{x^2+2x+4} dx$$

$$= \int \frac{2x+2}{x^2+2x+4} dx + \int \frac{1}{x^2+2x+4} dx$$

$$= \ln(x^2+2x+4) + \int \frac{1}{(x+1)^2+3} dx$$

$$= \ln(x^2+2x+4) + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{Bgtan} \frac{x+1}{\sqrt{3}} + c$$

Opdracht 68 bladzijde 135

Bereken

$$1 \quad \int \frac{dx}{x^3 - x}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^3 - x} &= \frac{1}{x(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1} \\ &= \frac{(A+B+C)x^2 + (B-C)x - A}{x^3 - x} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B+C=0 \\ B-C=0 \\ -A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=\frac{1}{2} \\ C=\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= -\int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} \\ &= -\ln|x| + \frac{1}{2} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| + c \end{aligned}$$

$$2 \quad \int \frac{x^4 - x^3 - x - 1}{x^3 - x^2} dx$$

$$\begin{array}{r} x^4 - x^3 - x - 1 \quad | \quad x^3 - x^2 \\ \hline -x^4 + x^3 \quad \quad \quad x \\ \hline -x - 1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} &= \int \left(x - \frac{x+1}{x^3 - x^2} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} - \int \frac{x+1}{x^3 - x^2} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{x^3 - x^2} &= \frac{x+1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} = \frac{Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2}{x^3 - x^2} \\ &= \frac{(A+C)x^2 + (-A+B)x - B}{x^3 - x^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+C=0 \\ -A+B=1 \\ -B=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-2 \\ B=-1 \\ C=2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{x^2}{2} - \left(-2 \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x^2} + 2 \int \frac{dx}{x-1} \right) \\ &= \frac{x^2}{2} + 2 \ln|x| - \frac{1}{x} - 2 \ln|x-1| + c \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + 2 \ln \left| \frac{x}{x-1} \right| + c \end{aligned}$$

$$3 \int \frac{4x-3}{x^3-3x^2} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{4x-3}{x^3-3x^2} &= \frac{4x-3}{x^2(x-3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-3} \\ &= \frac{Ax(x-3) + B(x-3) + Cx^2}{x^3-3x^2} = \frac{(A+C)x^2 + (-3A+B)x - 3B}{x^3-3x^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+C=0 \\ -3A+B=4 \\ -3B=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \\ C=1 \end{cases}$$

$$= - \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{x-3}$$

$$= -\ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x-3| + c$$

$$= -\frac{1}{x} + \ln \left| \frac{x-3}{x} \right| + c$$

$$4 \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} \\ &= \frac{A(x-1)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)^2}{(x^2+1)(x-1)^2} \\ &= \frac{(A+C)x^3 + (-A+B-2C+D)x^2 + (A+C-2B)x - A+B+D}{(x^2+1)(x-1)^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+C=0 \\ -A+B-2C+D=0 \\ A+C-2B=-2 \\ -A+B+D=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-2 \\ B=1 \\ C=2 \\ D=1 \end{cases}$$

$$= -2 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{dx}{(x-1)^2} + \int \frac{2x+1}{x^2+1} dx$$

$$= -2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} + \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= -2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + \ln(x^2+1) + B \tan x + c$$

$$5 \int \frac{dx}{x^4 - 16}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^4 - 16} &= \frac{1}{(x-2)(x+2)(x^2+4)} \\ &= \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} + \frac{Cx+D}{x^2+4} \\ &= \frac{A(x+2)(x^2+4) + B(x-2)(x^2+4) + (Cx+D)(x^2-4)}{x^4 - 16} \\ &= \frac{(A+B+C)x^3 + (2A-2B+D)x^2 + (4A+4B-4C)x + 8A-8B-4D}{x^4 - 16} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B+C=0 \\ 2A-2B+D=0 \\ 4A+4B-4C=0 \\ 8A-8B-4D=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{32} \\ B = -\frac{1}{32} \\ C = 0 \\ D = -\frac{1}{8} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{32} \int \frac{dx}{x-2} - \frac{1}{32} \int \frac{dx}{x+2} - \frac{1}{8} \int \frac{dx}{x^2+4} \\ &= \frac{1}{32} \ln|x-2| - \frac{1}{32} \ln|x+2| - \frac{1}{16} \operatorname{Bgtan} \frac{x}{2} + c \\ &= \frac{1}{32} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| - \frac{1}{16} \operatorname{Bgtan} \frac{x}{2} + c \end{aligned}$$

$$6 \int \frac{x^3 + x^2 + x + 2}{x^4 + 3x^2 + 2} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{x^3 + x^2 + x + 2}{x^4 + 3x^2 + 2} &= \frac{x^3 + x^2 + x + 2}{(x^2+1)(x^2+2)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2+2} \\ &= \frac{(A+C)x^3 + (B+D)x^2 + (2A+C)x + 2B+D}{x^4 + 3x^2 + 2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+C=1 \\ B+D=1 \\ 2A+C=1 \\ 2B+D=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=0 \\ B=1 \\ C=1 \\ D=0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{dx}{x^2+1} + \int \frac{x}{x^2+2} dx \\ &= \operatorname{Bgtan} x + \frac{1}{2} \ln(x^2+2) + c \end{aligned}$$

Opdracht 69 bladzijde 135


Bereken de oppervlakte van het gebied begrensd door de grafiek van de functie met voorschrift

$$f(x) = \frac{3x-1}{x^2+2x+5}, \text{ de } x\text{-as en de } y\text{-as.}$$

- nulpunt teller: $\frac{1}{3}$

nulpunt noemer: /

x		$\frac{1}{3}$	
f(x)	-	0	+



- $A = - \int_0^{\frac{1}{3}} \frac{3x-1}{x^2+2x+5} dx$

- $$\int \frac{3x-1}{x^2+2x+5} dx = \int \frac{\frac{3}{2}(2x+2) - 4}{x^2+2x+5} dx$$

$\downarrow D < 0$

$$= \frac{3}{2} \ln(x^2+2x+5) - 4 \int \frac{dx}{(x+1)^2+4}$$

$$= \frac{3}{2} \ln(x^2+2x+5) - 2 \operatorname{Bgtan} \frac{x+1}{2} + c$$

- $$A = \left[2 \operatorname{Bgtan} \frac{x+1}{2} - \frac{3}{2} \ln(x^2+2x+5) \right]_0^{\frac{1}{3}}$$

$$= 2 \operatorname{Bgtan} \frac{2}{3} - \frac{3}{2} \ln \frac{52}{9} - \left(2 \operatorname{Bgtan} \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \ln 5 \right)$$

$$= 2 \left(\operatorname{Bgtan} \frac{2}{3} - \operatorname{Bgtan} \frac{1}{2} \right) + \frac{3}{2} \ln \frac{45}{52}$$

Opdracht 70 bladzijde 136

Bereken

$$1 \quad \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x}}$$

$$t^2 = x \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t \, dt = dx$$

$$= \int \frac{2t \, dt}{(t^2 - 1)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2 - 1}$$

$$\frac{1}{t^2 - 1} = \frac{A}{t - 1} + \frac{B}{t + 1} = \frac{(A + B)t + A - B}{t^2 - 1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ A - B = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$= \int \frac{dt}{t - 1} - \int \frac{dt}{t + 1}$$

$$= \ln|t - 1| - \ln|t + 1| + c = \ln \left| \frac{t - 1}{t + 1} \right| + c = \ln \left| \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} \right| + c$$

$$2 \quad \int \frac{dx}{(x + 2)\sqrt{x + 1}}$$

$$t^2 = x + 1 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t \, dt = dx$$

$$= \int \frac{2t \, dt}{(t^2 + 1)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 1} = 2 \operatorname{Bgtan} t + c$$

$$= 2 \operatorname{Bgtan} \sqrt{x + 1} + c$$

$$3 \quad \int \frac{1 - \sqrt{3x + 2}}{1 + \sqrt{3x + 2}} dx$$

$$t^2 = 3x + 1 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t \, dt = 3 \, dx$$

$$= \frac{2}{3} \int \frac{1 - t}{1 + t} \cdot t \, dt = \frac{2}{3} \int \frac{-t^2 + t}{1 + t} dt$$

$$\begin{array}{r} -t^2 + t \quad \left| \begin{array}{l} t + 1 \\ -t + 2 \end{array} \right. \\ \hline \pm t^2 \pm t \\ \hline 2t \\ \hline \mp 2t \mp 2 \\ \hline -2 \end{array}$$

$$= \frac{2}{3} \int \left(-t + 2 - \frac{2}{t + 1} \right) dt$$

$$= -\frac{t^2}{3} + \frac{4}{3}t - \frac{4}{3} \ln|t + 1| + c$$

$$= -\frac{1}{3}(3x + 2) + \frac{4}{3}\sqrt{3x + 2} - \frac{4}{3} \ln|\sqrt{3x + 2} + 1| + c$$

$$\begin{aligned}
 4 \quad & \int \frac{x^3}{\sqrt{x-1}} dx \\
 & t^2 = x - 1 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = dx \\
 & = 2 \int \frac{(t^2 + 1)^3}{t} t dt \\
 & = 2 \int (t^6 + 3t^4 + 3t^2 + 1) dt \\
 & = \frac{2}{7} t^7 + \frac{6}{5} t^5 + 2t^3 + 2t + c \\
 & = \frac{2}{7} \sqrt{(x-1)^7} + \frac{6}{5} \sqrt{(x-1)^5} + 2 \sqrt{(x-1)^3} + 2 \sqrt{x-1} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 \quad & \int \frac{dx}{x + \sqrt[3]{x}} \\ & t^3 = x \Rightarrow 3t^2 dt = dx \\ & = 3 \int \frac{t^2}{t^3 + t} dt = 3 \int \frac{t}{t^2 + 1} dt = \frac{3}{2} \int \frac{d(t^2 + 1)}{t^2 + 1} \\ & = \frac{3}{2} \ln(t^2 + 1) + c = \frac{3}{2} \ln(\sqrt[3]{x^2} + 1) + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6 \quad & \int \frac{dx}{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}} \\
 & t^4 = x \text{ met } t > 0 \Rightarrow 4t^3 dt = dx \\
 & = 4 \int \frac{t^3}{t^2 - t} dt = 4 \int \frac{t^2}{t - 1} dt \\
 & \begin{array}{r}
 t^2 \quad \quad | \quad t - 1 \\
 \hline
 \bar{+} t^2 \pm t \quad | \quad t + 1 \\
 \hline
 t \\
 \hline
 \bar{+} t \pm 1 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 4 \int \left(t + 1 + \frac{1}{t-1} \right) dt \\ &= 2t^2 + 4t + 4 \ln|t-1| + c \\ &= 2\sqrt{x} + 4\sqrt[4]{x} + 4 \ln|\sqrt[4]{x}-1| + c \end{aligned}$$

Opdracht 71 bladzijde 136

$\int x^3 \sqrt{1+x^2} dx$ is gelijk aan

A $\frac{x^4 \sqrt{1+x^2}}{4} + c$

D $x^3 \sqrt{1 + \frac{x^3}{3}} + c$

B $\frac{x^4}{4} \sqrt{1 + \frac{x^3}{3}} + c$

E geen van de voorgaande

C $\frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}(3x^2-2)}{15} + c$

(Bron © ACTM State Math Contest, 2008)

$$\int x^3 \sqrt{1+x^2} dx = \int x^2 \sqrt{1+x^2} \cdot x dx$$

$$t = 1 + x^2 \Rightarrow dt = 2x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (t-1) \sqrt{t} dt = \frac{1}{2} \int \left(t^{\frac{3}{2}} - t^{\frac{1}{2}} \right) dt$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{t^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) + c$$

$$= \frac{\sqrt{t^5}}{5} - \frac{\sqrt{t^3}}{3} + c = \frac{\sqrt{t^3}}{15} (3t-5) + c$$

$$= \frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}{15} (3+3x^2-5) + c = \frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}} \cdot (3x^2-2)}{15} + c$$

Antwoord C is juist.

Opdracht 72 bladzijde 136

Bereken

1 $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x}}$

$$t^2 = 1 - x \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = -dx$$

$$= - \int \frac{2t dt}{(1-t^2)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2-1}$$

$$\frac{1}{t^2-1} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} = \frac{(A+B)t + A-B}{t^2-1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{2} \\ B=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{dt}{t-1} - \int \frac{dt}{t+1} \\
&= \ln|t-1| - \ln|t+1| + c \\
&= \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + c \\
&= \ln \left| \frac{\sqrt{1-x}-1}{\sqrt{1-x}+1} \right| + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2 \quad &\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3+1}} dx \\
&\quad t^4 = x \text{ met } t > 0 \Rightarrow 4t^3 dt = dx \\
&= 4 \int \frac{t^2}{t^3+1} t^3 dt = 4 \int \frac{t^5}{t^3+1} dt \\
&\quad \frac{t^5}{t^3+1} = \frac{t^2(t^3+1) - t^2}{t^3+1} = t^2 - \frac{t^2}{t^3+1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 4 \int \left(t^2 - \frac{t^2}{t^3+1} \right) dt \\
&= 4 \frac{t^3}{3} - \frac{4}{3} \int \frac{d(t^3+1)}{t^3+1} \\
&= \frac{4}{3} (\sqrt[4]{x^3} - \ln |\sqrt[4]{x^3} + 1|) + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3 \quad &\int \frac{x^3}{(4-9x^2)^{\frac{3}{2}}} dx \\
&\quad t^2 = 4 - 9x^2 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = -18x dx \\
&\quad \Rightarrow t dt = -9x dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{4-t^2}{t^3} \cdot \left(-\frac{1}{9}t \right) dt \\
&= \frac{1}{81} \int \frac{t^2-4}{t^2} dt \\
&= \frac{1}{81} \int (1 - 4t^{-2}) dt \\
&= \frac{1}{81} \left(t + \frac{4}{t} \right) + c \\
&= \frac{1}{81} \frac{t^2+4}{t} + c \\
&= \frac{1}{81} \frac{8-9x^2}{\sqrt{4-9x^2}} + c \\
&= \frac{8-9x^2}{81\sqrt{4-9x^2}} + c
\end{aligned}$$

$$4 \int \frac{\sqrt{2x+1}}{x} dx$$

$$t^2 = 2x + 1 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = 2 dx$$

$$= \int \frac{t}{\frac{t^2-1}{2}} \cdot t dt = 2 \int \frac{t^2}{t^2-1} dt = 2 \int \frac{t^2-1+1}{t^2-1} dt$$

$$= 2 \int dt + 2 \int \frac{dt}{t^2-1}$$

$$\frac{1}{t^2-1} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} = \frac{(A+B)t + A-B}{t^2-1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$= 2t + \int \frac{dt}{t-1} - \int \frac{dt}{t+1}$$

$$= 2t + \ln|t-1| - \ln|t+1| + c$$

$$= 2\sqrt{2x+1} + \ln \left| \frac{\sqrt{2x+1}-1}{\sqrt{2x+1}+1} \right| + c$$

$$5 \int \frac{dx}{x\sqrt{x^3-1}}$$

$$t^2 = x^3 - 1 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = 3x^2 dx$$

$$= \int \frac{x^2 dx}{x^3 \sqrt{x^3-1}} = \frac{2}{3} \int \frac{t}{(t^2+1)t} dt = \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t^2+1} = \frac{2}{3} \text{Bgtan } t + c$$

$$= \frac{2}{3} \text{Bgtan } \sqrt{x^3-1} + c$$

$$\begin{aligned}
6 \quad & \int \frac{dx}{x(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}} \\
& t^2 = x^2 - 1 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t \, dt = 2x \, dx \\
& = \int \frac{x}{x^2(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}} \, dx = \int \frac{t}{(1 + t^2)t^2 \cdot t} \, dt \\
& = \int \frac{dt}{t^2(1 + t^2)} \\
& \frac{1}{t^2(1 + t^2)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{Ct + D}{t^2 + 1} \\
& = \frac{At(t^2 + 1) + B(t^2 + 1) + (Ct + D)t^2}{t^2(1 + t^2)} \\
& = \frac{(A + C)t^3 + (B + D)t^2 + At + B}{t^2(1 + t^2)} \\
& \Rightarrow \begin{cases} A + C = 0 \\ B + D = 0 \\ A = 0 \\ B = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 1 \\ C = 0 \\ D = -1 \end{cases} \\
& = \int \frac{dt}{t^2} - \int \frac{dt}{t^2 + 1} \\
& = -\frac{1}{t} - B \tan^{-1} t + c \\
& = -\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} - B \tan^{-1} \sqrt{x^2 - 1} + c
\end{aligned}$$

Opdracht 73 bladzijde 137

Bereken

$$\begin{aligned}
1 \quad & \int_0^3 \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}} \\
& \cdot \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}} \\
& t^2 = x + 1 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t \, dt = dx \\
& = 2 \int \frac{t}{1 + t} \, dt = 2 \int \frac{t + 1 - 1}{t + 1} \, dt = 2 \left(\int dt - \int \frac{dt}{t + 1} \right) \\
& = 2(t - \ln |t + 1|) + c = 2(\sqrt{x+1} - \ln |\sqrt{x+1} + 1|) + c \\
& \cdot \int_0^3 \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}} = 2 \left[\sqrt{x+1} - \ln |\sqrt{x+1} + 1| \right]_0^3 \\
& = 2(2 - \ln 3 - (1 - \ln 2)) = 2 \left(1 + \ln \frac{2}{3} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 2 \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt{4-x}} \\
& \cdot \int \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt{4-x}} \\
& \quad t^2 = 4 - x \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t \, dt = -dx \\
& = -2 \int \frac{t}{\sqrt{4-t^2} \, t} \, dt = -2 \int \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} = -2 \operatorname{Bgsin} \frac{t}{2} + c \\
& = -2 \operatorname{Bgsin} \frac{\sqrt{4-x}}{2} + c \\
& \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt{4-x}} = -2 \left[\operatorname{Bgsin} \frac{\sqrt{4-x}}{2} \right]_1^3 \\
& = -2 \left[\operatorname{Bgsin} \frac{1}{2} - \operatorname{Bgsin} \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \\
& \cdot = -2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} \right) \\
& = \frac{1}{3} \pi
\end{aligned}$$

Opdracht 74 bladzijde 137

Bereken

$$\begin{aligned}
1 \quad & \int \sqrt{\frac{x+9}{x-9}} \, dx = \int \sqrt{\frac{(x+9)^2}{x^2-81}} \, dx = \int \frac{x+9}{\sqrt{x^2-81}} \, dx \\
& = \int \frac{x}{\sqrt{x^2-81}} \, dx + 9 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-81}} \\
& = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-81)}{\sqrt{x^2-81}} + 9 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-81}} \\
& = \sqrt{x^2-81} + 9 \ln|x + \sqrt{x^2-81}| + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2 \quad & \int \sqrt{x^2+2x-3} \, dx = \int \frac{x^2+2x-3}{\sqrt{x^2+2x-3}} \, dx \\
& = \int \frac{(x+1)^2-4}{\sqrt{(x+1)^2-4}} \, dx \\
& \quad t = x+1 \Rightarrow dt = dx \\
& = \int \frac{t^2-4}{\sqrt{t^2-4}} \, dt = \int \frac{t^2}{\sqrt{t^2-4}} \, dt - 4 \ln|t + \sqrt{t^2-4}|
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \int \frac{t^2}{\sqrt{t^2 - 4}} dt \\
& u = t \Rightarrow du = dt \\
& dv = \frac{t}{\sqrt{t^2 - 4}} dt \Rightarrow v = \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2 - 4)}{\sqrt{t^2 - 4}} = \sqrt{t^2 - 4} \\
& = t\sqrt{t^2 - 4} - \int \sqrt{t^2 - 4} dt \\
& = t\sqrt{t^2 - 4} - \int \frac{t^2 - 4}{\sqrt{t^2 - 4}} dt \\
& = t\sqrt{t^2 - 4} - \int \frac{t^2}{\sqrt{t^2 - 4}} dt + 4 \ln|t + \sqrt{t^2 - 4}| \\
& \Rightarrow 2 \int \frac{t^2}{\sqrt{t^2 - 4}} dt = t\sqrt{t^2 - 4} + 4 \ln|t + \sqrt{t^2 - 4}| + c \\
& \Rightarrow \int \frac{t^2}{\sqrt{t^2 - 4}} dt = \frac{1}{2} t\sqrt{t^2 - 4} + 2 \ln|t + \sqrt{t^2 - 4}| + c \\
& = \frac{1}{2} t\sqrt{t^2 - 4} - 2 \ln|t + \sqrt{t^2 - 4}| + c \\
& = \frac{1}{2} (x + 1) \sqrt{x^2 + 2x - 3} - 2 \ln|x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x - 3}| + c
\end{aligned}$$

Opdracht 75 bladzijde 137

Bereken met de gegeven substitutie.

$$\begin{aligned}
& \mathbf{1} \int \frac{\sqrt{x+1}}{(x-1)^{\frac{5}{2}}} dx \quad x-1 = \frac{1}{u} \Rightarrow dx = -\frac{1}{u^2} du \\
& = - \int \frac{\sqrt{\frac{1}{u} + 2}}{\left(\frac{1}{u}\right)^{\frac{5}{2}}} \cdot \frac{1}{u^2} du \\
& = - \int \frac{\sqrt{1+2u}}{\sqrt{u}} \cdot \frac{u^{\frac{5}{2}}}{u^2} du \\
& = -\frac{1}{2} \int \sqrt{1+2u} d(1+2u) \\
& = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (1+2u)^{\frac{3}{2}} + c \\
& = -\frac{1}{3} \sqrt{\left(1 + \frac{2}{x-1}\right)^3} + c \\
& = -\frac{1}{3} \sqrt{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^3} + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2 \quad & \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{49 - x^2}} \quad x = 7 \sin t \text{ met } t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\Rightarrow dx = 7 \cos t \, dt \\
&= 7 \int \frac{\cos t \, dt}{49 \sin^2 t \cdot 7 \cos t} \\
&= \frac{1}{49} \int \frac{dt}{\sin^2 t} = -\frac{1}{49} \cot t + c \\
&= -\frac{1}{49} \frac{\cos t}{\sin t} + c = -\frac{1}{49} \frac{\sqrt{1 - \frac{x^2}{49}}}{\frac{x}{7}} + c \\
&= -\frac{1}{49} \frac{\sqrt{49 - x^2}}{x} + c \\
&= -\frac{\sqrt{49 - x^2}}{49x} + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3 \quad & \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 4}} \quad x = 2 \tan t \text{ met } t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\Rightarrow dx = \frac{2}{\cos^2 t} \, dt \\
&= 2 \int \frac{\frac{dt}{\cos^2 t}}{4 \tan^2 t \sqrt{4(1 + \tan^2 t)}} = \frac{1}{2} \int \frac{\frac{dt}{\cos^2 t}}{\tan^2 t \cdot \frac{2}{\cos t}} \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{dt}{\cos t \cdot \tan^2 t} = \frac{1}{4} \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} \, dt \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{d(\sin t)}{\sin^2 t} = -\frac{1}{4 \sin t} + c = -\frac{1}{4 \cos t \tan t} + c \\
&= -\frac{\sqrt{1 + \tan^2 t}}{4 \tan t} + c = -\frac{\sqrt{1 + \frac{x^2}{4}}}{4 \cdot \frac{x}{2}} = -\frac{\sqrt{4 + x^2}}{4x} + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4 \quad & \int_{2\sqrt{3}}^6 \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}} \quad x = \frac{3}{\cos t} \text{ met } t \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[\\
&\Rightarrow \bullet \, x^2 - 9 = 9 \left(\frac{1}{\cos^2 t} - 1 \right) = 9 \tan^2 t \\
&\bullet \, dx = -3(\cos t)^{-2}(-\sin t)dt = \frac{3 \sin t}{\cos^2 t} dt \\
&\bullet \, x = 2\sqrt{3} \Leftrightarrow 2\sqrt{3} = \frac{3}{\cos t} \\
&\Leftrightarrow \cos t = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{6} \\
&x = 6 \Leftrightarrow 6 = \frac{3}{\cos t} \Leftrightarrow \cos t = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{3 \sin t}{\cos^2 t}}{\frac{9}{\cos^2 t} \cdot 3 \tan t} dt \\
&= \frac{1}{9} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos t \, dt \\
&= \frac{1}{9} \left[\sin t \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \\
&= \frac{1}{9} \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{9} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{18}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
5 \quad & \int_{-3}^{-1} \frac{dx}{(x^2 + 6x + 13)^{\frac{3}{2}}} \quad x = 2 \tan t - 3 \text{ met } t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \\
& dx = \frac{2}{\cos^2 t} dt \\
& x = -3 \Rightarrow \tan t = 0 \Rightarrow t = 0 \\
& x = -1 \Rightarrow \tan t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{4} \\
& = \int_{-3}^{-1} \frac{dx}{((x+3)^2 + 4)^{\frac{3}{2}}} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{\cos^2 t}}{(4 \tan^2 t + 4)^{\frac{3}{2}}} dt \\
& = \frac{2}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos^2 t \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 t} \right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos t \, dt \\
& = \frac{1}{4} \left[\sin t \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4} \left(\sin \frac{\pi}{4} - \sin 0 \right) \\
& = \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{8}
\end{aligned}$$

Opdracht 76 bladzijde 138

Bereken

$$\begin{aligned}
1 \quad & \int \frac{\sin 2x}{\cos^3 x} dx = \int \frac{2 \sin x \cos x}{\cos^3 x} dx = 2 \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx \\
& = -2 \int \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} = \frac{2}{\cos x} + c
\end{aligned}$$

$$2 \quad \int \frac{\ln^3 x}{2x} dx = \frac{1}{2} \int \ln^3 x \, d(\ln x) = \frac{\ln^4 x}{8} + c$$

$$\begin{aligned}
 3 \quad \int_0^{\pi} (\sin x + \cos x)^2 dx &= \int_0^{\pi} (\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x) dx \\
 &= \int_0^{\pi} (1 + \sin 2x) dx = \left[x - \frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\pi} = \pi - \frac{1}{2} - \left(0 - \frac{1}{2} \right) = \pi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4 \quad \int \frac{\sin 2x}{3 \sin^2 x + 5 \cos^2 x} dx &= \int \frac{\sin 2x}{3 + 2 \cos^2 x} dx \\
 u = 3 + 2 \cos^2 x &\Rightarrow du = 4 \cos x (-\sin x) dx = -2 \sin 2x dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = -\frac{1}{2} \ln|u| + c = -\frac{1}{2} \ln|3 + 2 \cos^2 x| + c \\
 &= -\frac{1}{2} \ln(3 + 2 \cos^2 x) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5 \quad \int \frac{3x^2 + 5}{x^2 + 1} dx \\
 \frac{3x^2 + 5}{x^2 + 1} &= \frac{3x^2 + 3 + 2}{x^2 + 1} = 3 + \frac{2}{x^2 + 1} \\
 &= \int \left(3 + \frac{2}{x^2 + 1} \right) dx = 3x + 2 \operatorname{Bgtan} x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6 \quad \int_1^5 \frac{e^{\sqrt{2x-1}}}{\sqrt{2x-1}} dx \\
 u = \sqrt{2x-1} &\Rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{2x-1}} dx \\
 x = 1 &\Rightarrow u = 1 \\
 x = 5 &\Rightarrow u = 3 \\
 &= \int_1^3 e^u du = [e^u]_1^3 = e^3 - e = e(e^2 - 1)
 \end{aligned}$$

$$7 \quad \int \frac{x}{\sqrt{25x^2 + 81}} dx = \frac{1}{50} \int \frac{d(25x^2 + 81)}{\sqrt{25x^2 + 81}} = \frac{1}{25} \sqrt{25x^2 + 81} + c$$

$$8 \quad \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} \stackrel{D < 0}{=} \int \frac{dx}{(2x+1)^2 + 4} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+1)}{(2x+1)^2 + 4} = \frac{1}{4} \operatorname{Bgtan} \frac{2x+1}{2} + c$$

$$9 \quad \int x^2 \ln 3x \, dx$$

$$u = \ln 3x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = x^2 dx \Rightarrow v = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$

$$= \frac{x^3}{3} \ln 3x - \frac{1}{3} \int x^2 dx$$

$$= \frac{x^3}{3} \ln 3x - \frac{x^3}{9} + c$$

$$= \frac{x^3}{9} (3 \ln 3x - 1) + c$$

$$10 \quad \int \frac{\sin x \cos x}{1 - \cos x} dx$$

$$u = 1 - \cos x \Rightarrow du = \sin x dx$$

$$= \int \frac{1-u}{u} du = \int \left(\frac{1}{u} - 1 \right) du = \ln|u| - u + c = \ln|1 - \cos x| - 1 + \cos x + c$$

$$= \ln|1 - \cos x| + \cos x + c$$

$$= \ln(1 - \cos x) + \cos x + c$$

$$11 \quad \int x^3 \sin 2x \, dx$$

$$u = x^3 \Rightarrow du = 3x^2 dx$$

$$dv = \sin 2x dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} \int \sin 2x d(2x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$$

$$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{2} \int x^2 \cos 2x dx$$

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$dv = \cos 2x dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x) = \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 \sin 2x - \int x \sin 2x dx \right)$$

$$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{4} x^2 \sin 2x - \frac{3}{2} \int x \sin 2x dx$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \sin 2x dx \Rightarrow v = -\frac{1}{2} \cos 2x$$

$$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{4} x^2 \sin 2x - \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x) \right)$$

$$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{4} x^2 \sin 2x + \frac{3}{4} x \cos 2x - \frac{3}{8} \sin 2x + c$$

$$= \frac{1}{4} x (3 - 2x^2) \cos 2x + \frac{3}{8} (2x^2 - 1) \sin 2x + c$$

$$\begin{aligned}
 12 \quad \int \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}}{x^2} dx &= \int \left(x^{-\frac{5}{3}} - x^{-\frac{3}{2}} \right) dx = \frac{x^{-\frac{2}{3}}}{-\frac{2}{3}} - \frac{x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + c \\
 &= -\frac{3}{2\sqrt[3]{x^2}} + \frac{2}{\sqrt{x}} + c
 \end{aligned}$$

$$13 \quad \int 4^{\tan x} (1 + \tan^2 x) dx = \int \frac{4^{\tan x}}{\cos^2 x} dx = \int 4^{\tan x} d(\tan x) = \frac{4^{\tan x}}{\ln 4} + c$$

$$\begin{aligned}
 14 \quad \int_{-2}^2 \ln(x+3) dx \\
 t = x+3 \Rightarrow dt = dx \\
 x = -2 \Rightarrow t = 1 \\
 x = 2 \Rightarrow t = 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_1^5 \ln t dt \\
 u = \ln t \Rightarrow du &= \frac{1}{t} dt \\
 dv = dt \Rightarrow v &= t
 \end{aligned}$$

$$= [t \ln t]_1^5 - \int_1^5 dt$$

$$= 5 \ln 5 - 0 - [t]_1^5$$

$$= 5 \ln 5 - 4$$

$$\begin{aligned}
 15 \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x \sqrt{9 - \cot^2 x}} &= - \int \frac{d(\cot x)}{\sqrt{9 - \cot^2 x}} \\
 &= - \operatorname{Bgsin} \frac{\cot x}{3} + c
 \end{aligned}$$

$$16 \quad \int \frac{e^{\sin x} \cos x}{\sqrt{4 + e^{2 \sin x}}} dx$$

$$u = e^{\sin x} \Rightarrow du = e^{\sin x} \cdot \cos x dx$$

$$= \int \frac{du}{\sqrt{4 + u^2}} = \ln |u + \sqrt{4 + u^2}| + c$$

$$= \ln |e^{\sin x} + \sqrt{4 + e^{2 \sin x}}| + c$$

$$= \ln (e^{\sin x} + \sqrt{4 + e^{2 \sin x}}) + c$$

$$17 \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} \operatorname{Bgsin} x} = \int \frac{d(\operatorname{Bgsin} x)}{\operatorname{Bgsin} x} = \ln |\operatorname{Bgsin} x| + c$$

$$\begin{aligned}
 18 \quad \int_2^3 \frac{2}{(7-4x)^3} dx &= \frac{-2}{4} \int_2^3 (7-4x)^{-3} d(7-4x) \\
 &= -\frac{1}{2} \left[\frac{(7-4x)^{-2}}{-2} \right]_2^3 = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{(7-4x)^2} \right]_2^3 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{25} - 1 \right) \\
 &= -\frac{6}{25}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 19 \quad \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{\text{Bgtan } 3x}{9x^2 + 1} dx &= \frac{1}{3} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \text{Bgtan } 3x d(\text{Bgtan } 3x) = \frac{1}{3} \left[(\text{Bgtan } 3x)^2 \right]_{\frac{1}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \\
 &= \frac{1}{6} \left(\left(\frac{\pi}{3} \right)^2 - \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 \right) = \frac{7\pi^2}{864}
 \end{aligned}$$

$$20 \quad \int \frac{e^x}{e^{2x} + 36} dx = \int \frac{d(e^x)}{(e^x)^2 + 36} = \frac{1}{6} \text{Bgtan } \frac{e^x}{6} + c$$

$$21 \quad \int \frac{x^3}{\sqrt{4-x^8}} dx = \int \frac{x^3}{\sqrt{4-(x^4)^2}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{d(x^4)}{\sqrt{4-(x^4)^2}} = \frac{1}{4} \text{Bgsin } \frac{x^4}{2} + c$$

$$22 \quad \int x e^{4x^2} dx = \frac{1}{8} \int e^{4x^2} d(4x^2) = \frac{1}{8} e^{4x^2} + c$$

$$\begin{aligned}
 23 \quad \int \frac{3x - \sqrt{\text{Bgsin } x}}{\sqrt{1-x^2}} dx &= 3 \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx - \int \frac{\sqrt{\text{Bgsin } x}}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= -\frac{3}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} - \int \sqrt{\text{Bgsin } x} d(\text{Bgsin } x) \\
 &= -3 \sqrt{1-x^2} - \frac{2}{3} \sqrt{(\text{Bgsin } x)^3} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 24 \quad \int \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} dx \\
 \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 \\
 = \int \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{1 - \cos^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} dx = 2 \int \frac{d \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} - \int dx = 2 \tan \frac{x}{2} - x + c
 \end{aligned}$$

$$25 \quad \int e^x \tan(1 + e^x) dx$$

$$\begin{aligned}
 u = 1 + e^x &\Rightarrow du = e^x dx \\
 &= \int \tan u du = \int \frac{\sin u}{\cos u} du = - \int \frac{d(\cos u)}{\cos u} = -\ln |\cos u| + c \\
 &= -\ln |\cos(1 + e^x)| + c
 \end{aligned}$$

$$26 \quad \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos^2 x} dx$$

$$\bullet \quad \int \frac{\ln(\tan x)}{\cos^2 x} dx$$

$$t = \tan x \Rightarrow dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$$

$$= \int \ln t \, dt$$

$$u = \ln t \Rightarrow du = \frac{1}{t} dt$$

$$dv = dt \Rightarrow v = t$$

$$= t \ln t - \int dt = t(\ln t - 1) + c$$

$$= \tan x(\ln \tan x - 1) + c$$

$$\bullet \quad \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos^2 x} dx = \left[\tan x (\ln \tan x - 1) \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \\ = \sqrt{3} (\ln \sqrt{3} - 1) + 1$$

$$27 \quad \int \frac{\sin 2x}{(2 + \sin x)^2} dx = \int \frac{2 \sin x \cos x}{(2 + \sin x)^2} dx$$

$$u = 2 + \sin x \Rightarrow du = \cos x \, dx$$

$$= 2 \int \frac{u-2}{u^2} du = 2 \int \left(\frac{1}{u} - 2u^{-2} \right) du$$

$$= 2 \left(\ln|u| + \frac{2}{u} \right) + c$$

$$= 2 \left(\ln(2 + \sin x) + \frac{2}{2 + \sin x} \right) + c$$

$$28 \quad \int_0^1 \left(x - \frac{\tan x}{\cos x} \right) dx$$

$$= \int_0^1 \left(x - \frac{\sin x}{\cos^2 x} \right) dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{1}{2} - \left[\frac{1}{\cos x} \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{\cos 1} - 1 \right)$$

$$= \frac{3}{2} - \frac{1}{\cos 1}$$

$$29 \quad \int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$$

$$t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{dx}{x}$$

$$= \int \ln t \, dt$$

$$u = \ln t \Rightarrow du = \frac{dt}{t}$$

$$dv = dt \Rightarrow v = t$$

$$= t \ln t - \int dt$$

$$= t \ln t - t + c$$

$$= t(\ln t - 1) + c$$

$$= \ln x(\ln(\ln x) - 1) + c$$

$$30 \quad \int x^2 \operatorname{Bgtan} x \, dx$$

$$u = \operatorname{Bgtan} x \Rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$dv = x^2 dx \Rightarrow v = \frac{x^3}{3}$$

$$= \frac{x^3}{3} \operatorname{Bgtan} x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{x^2+1} dx$$

$$\frac{x^3}{\frac{x^3}{x^2+1}}$$

$$\frac{\frac{x^3}{x^2+1} \cdot x}{-x}$$

$$= \frac{x^3}{3} \operatorname{Bgtan} x - \frac{1}{3} \int \left(x - \frac{x}{x^2+1} \right) dx$$

$$= \frac{x^3}{3} \operatorname{Bgtan} x - \frac{1}{6} x^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1}$$

$$= \frac{x^3}{3} \operatorname{Bgtan} x - \frac{1}{6} x^2 + \frac{1}{6} \ln(x^2+1) + c$$

Opdracht 77 bladzijde 139

We beschouwen twee uitdrukkingen:

$$1 \quad \int \ln x \, dx = \ln x + x + c$$

$$2 \quad \int \sin^2(2x) \, dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}\cos(4x) + c$$

Kies het juiste antwoord.

- A Uitdrukkingen 1 en 2 zijn juist.
- B** Uitdrukkingen 1 en 2 zijn fout.
- C Uitdrukking 1 is juist en uitdrukking 2 is fout.
- D Uitdrukking 1 is fout en uitdrukking 2 is juist.

(Bron © Toelatingsproef arts-tandarts)

Uitdrukking 1:

$$\int \ln x \, dx \neq \ln x + x + c$$

$$\text{want } \frac{d}{dx}(\ln x + x) = \frac{1}{x} + 1 \neq \ln x$$

Uitdrukking 2:

$$\int \sin^2 2x \, dx \neq \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}\cos(4x) + c \quad \text{want}$$

$$\begin{aligned} \int \sin^2 2x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 4x}{2} \, dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \int \cos 4x \, d(4x) \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{8} \sin 4x + c \end{aligned}$$

\Rightarrow Antwoord B is juist.

Opdracht 78 bladzijde 139

$$\int_1^4 \frac{\ln x}{x} \, dx \text{ is gelijk aan}$$

- A $\ln 4$
- B $0,5 \ln 4$
- C $2 \ln^2 4$
- D** $2 \ln^2 2$

(Bron © Toelatingsproef arts-tandarts)

$$\begin{aligned} \int_1^4 \frac{\ln x}{x} \, dx &= \int_1^4 \ln x \, d(\ln x) = \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_1^4 \\ &= \frac{1}{2}(\ln^2 4 - \ln^2 1) = \frac{1}{2}(2 \ln 2)^2 = 2 \ln^2 2 \end{aligned}$$

Antwoord D is juist.

Opdracht 79 bladzijde 139

$\int_0^{e-1} \frac{x-1}{x+1} dx$ is gelijk aan

A $e-5$ **B** $e-3$ **C** 0 **D** $e-1$

(Bron © Toelatingsproef arts-tandarts)

$$\begin{aligned}
 & \int_0^{e-1} \frac{x-1}{x+1} dx \\
 &= \int_0^{e-1} \frac{x+1-2}{x+1} dx \\
 &= \int_0^{e-1} \left(1 - \frac{2}{x+1}\right) dx \\
 &= [x]_0^{e-1} - 2 \int_0^{e-1} \frac{d(x+1)}{x+1} \\
 &= [x]_0^{e-1} - 2 [\ln|x+1|]_0^{e-1} \\
 &= e-1 - 2(\ln e - \ln 1) \\
 &= e-1-2 \\
 &= e-3
 \end{aligned}$$

⇒ Antwoord B is juist.


Opdracht 80 bladzijde 140

Bereken de oppervlakte van het gebied begrensd door de grafiek van

$f: x \mapsto \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 2x + 2}$ en de horizontale rechte door het snijpunt van de grafiek van f en de y -as.

- snijpunt van de grafiek van f en de y -as:

$$\left(0, -\frac{3}{2}\right)$$



- snijpunten van de grafiek van f en de rechte met vergelijking $y = -\frac{3}{2}$:

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 2x + 2} &= -\frac{3}{2} \Leftrightarrow 2x^2 + 4x - 6 = -3x^2 - 6x - 6 \\
 &\Leftrightarrow 5x^2 + 10x = 0 \\
 &\Leftrightarrow 5x(x + 2) = 0 \\
 &\Leftrightarrow x = 0 \text{ of } x = -2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A &= \int_{-2}^0 \left(-\frac{3}{2} - \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 2x + 2} \right) dx \\
&= \int_{-2}^0 \left(-\frac{3}{2} - \frac{x^2 + 2x + 2 - 5}{x^2 + 2x + 2} \right) dx \\
&\quad \quad \quad \downarrow D < 0 \\
&= \int_{-2}^0 \left(-\frac{3}{2} - 1 + \frac{5}{(x+1)^2 + 1} \right) dx \\
&= -\frac{5}{2} [x]_{-2}^0 + 5 \int_{-2}^0 \frac{d(x+1)}{(x+1)^2 + 1} \\
&= -5 + 5 [\text{Bgtan}(x+1)]_{-2}^0 \\
&= -5 + 5(\text{Bgtan } 1 - \text{Bgtan}(-1)) \\
&= -5 + 5 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) \\
&= 5 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)
\end{aligned}$$

Opdracht 81 bladzijde 140

Bereken

$$1 \quad \int \frac{1 - \tan^2 2x}{1 + \tan^2 2x} dx = \int \frac{\frac{\cos^2 2x - \sin^2 2x}{\cos^2 2x}}{\frac{1}{\cos^2 2x}} dx = \frac{1}{4} \int \cos 4x d(4x) = \frac{1}{4} \sin 4x + c$$

$$\begin{aligned}
2 \quad &\int \frac{5}{3x^2 - 2x - 1} dx \\
&\quad \quad \quad \downarrow D > 0 \\
&\frac{5}{3x^2 - 2x - 1} = \frac{5}{(x-1)(3x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{3x+1} \\
&\quad \quad \quad = \frac{(3A+B)x + A-B}{3x^2 - 2x - 1} \\
&\Rightarrow \begin{cases} 3A+B=0 \\ A-B=5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{5}{4} \\ B = -\frac{15}{4} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{5}{4} \int \frac{d(x-1)}{x-1} - \frac{15}{4} \cdot \frac{1}{3} \int \frac{d(3x+1)}{3x+1} \\
&= \frac{5}{4} \ln|x-1| - \frac{5}{4} \ln|3x+1| + c \\
&= \frac{5}{4} \ln \left| \frac{x-1}{3x+1} \right| + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3 \quad \int x^2 \cos^2 x \, dx &= \int x^2 \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{2} \int x^2 \, dx + \frac{1}{2} \int x^2 \cos 2x \, dx \\
&= \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{2} \int x^2 \cos 2x \, dx \\
&\quad u = x^2 \Rightarrow du = 2x \, dx \\
&\quad dv = \cos 2x \, dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} \sin 2x \\
&= \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 \sin 2x - \int x \sin 2x \, dx \right) \\
&\quad u = x \Rightarrow du = dx \\
&\quad dv = \sin 2x \, dx \Rightarrow v = -\frac{1}{2} \cos 2x \\
&= \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{4} x^2 \sin 2x - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \right) \\
&= \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{4} x^2 \sin 2x + \frac{1}{4} x \cos 2x - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x + c \\
&= \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{2x^2 - 1}{8} \sin 2x + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4 \quad \int \frac{x+1}{x^2+x+1} \, dx \\
\quad \quad \quad \downarrow D < 0 \\
&= \int \frac{\frac{1}{2}(2x+1) + \frac{1}{2}}{x^2+x+1} \, dx \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \\
&= \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{Bgtan} \frac{2\left(x + \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{3}} + c \\
&= \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{Bgtan} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + c
\end{aligned}$$

$$5 \int \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 2x - 8} dx$$

$$\frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 2x - 8} = \frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - 2x - 8} + \frac{5x + 4}{x^2 - 2x - 8}$$

$$= \int \left(1 + \frac{5x + 4}{x^2 - 2x - 8} \right) dx$$

$$= x + \int \frac{5x + 4}{x^2 - 2x - 8} dx$$

$$\frac{5x + 4}{x^2 - 2x - 8} = \frac{5x + 4}{(x - 4)(x + 2)} = \frac{A}{x - 4} + \frac{B}{x + 2} = \frac{(A + B)x + 2A - 4B}{(x - 4)(x + 2)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 5 \\ 2A - 4B = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 4 \\ B = 1 \end{cases}$$

$$= x + 4 \int \frac{d(x - 4)}{x - 4} + \int \frac{d(x + 2)}{x + 2}$$

$$= x + 4 \ln|x - 4| + \ln|x + 2| + c$$

$$6 \int \sin 5x \sin 9x dx = \int \sin 9x \sin 5x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (\cos 4x - \cos 14x) dx$$

$$= \frac{1}{8} \sin 4x - \frac{1}{28} \sin 14x + c$$

$$7 \int e^{ax} \sin bx dx$$

$$u = e^{ax} \Rightarrow du = ae^{ax} dx$$

$$dv = \sin bx dx \Rightarrow v = -\frac{1}{b} \cos bx$$

$$= -\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos bx dx$$

$$u = e^{ax} \Rightarrow du = ae^{ax} dx$$

$$dv = \cos bx dx \Rightarrow v = \frac{1}{b} \sin bx$$

$$= -\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b} \left(\frac{1}{b} e^{ax} \sin bx - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin bx dx \right)$$

$$= -\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b^2} e^{ax} \sin bx - \frac{a^2}{b^2} \int e^{ax} \sin bx dx$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 + b^2}{b^2} \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{1}{b^2} e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx) + c$$

$$\Rightarrow \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + c$$

$$8 \quad \int \ln(x^2 + 4) \, dx$$

$$u = \ln(x^2 + 4) \Rightarrow du = \frac{2x}{x^2 + 4} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x \ln(x^2 + 4) - 2 \int \frac{x^2}{x^2 + 4} dx$$

$$= x \ln(x^2 + 4) - 2 \int \frac{x^2 + 4 - 4}{x^2 + 4} dx$$

$$= x \ln(x^2 + 4) - 2x + 8 \int \frac{dx}{x^2 + 4}$$

$$= x \ln(x^2 + 4) - 2x + 4 \operatorname{Bgtan} \frac{x}{2} + c$$

$$9 \quad \int (1 - x^3)^{50} x^5 \, dx = \int (1 - x^3)^{50} x^3 \cdot x^2 \, dx$$

$$t = 1 - x^3 \Rightarrow dt = -3x^2 \, dx$$

$$= -\frac{1}{3} \int t^{50} (1 - t) dt = -\frac{1}{3} \int (t^{50} - t^{51}) dt$$

$$= -\frac{1}{3} \left(\frac{t^{51}}{51} - \frac{t^{52}}{52} \right) + c$$

$$= -\frac{1}{3} \left(\frac{(1 - x^3)^{51}}{51} - \frac{(1 - x^3)^{52}}{52} \right) + c$$

$$10 \quad \int \frac{e^{\cos x} \sin x}{\sqrt{4e^{2\cos x} - 12e^{\cos x} + 1}} \, dx$$

$$u = e^{\cos x} \Rightarrow du = e^{\cos x} (-\sin x) dx$$

$$= - \int \frac{du}{\sqrt{4u^2 - 12u + 1}} = - \int \frac{du}{\sqrt{(2u - 3)^2 - 8}}$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{d(2u - 3)}{\sqrt{(2u - 3)^2 - 8}}$$

$$= -\frac{1}{2} \ln |2u - 3 + \sqrt{4u^2 - 12u + 1}| + c$$

$$= -\frac{1}{2} \ln |2e^{\cos x} - 3 + \sqrt{4e^{2\cos x} - 12e^{\cos x} + 1}| + c$$

$$11 \quad \int_{\frac{1}{12}}^{\frac{1}{4}} \frac{2}{\sqrt{x} + 4x\sqrt{x}} dx$$

$$t^2 = x \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = dx$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad & \int \frac{2}{\sqrt{x} + 4x\sqrt{x}} dx = 4 \int \frac{t}{t + 4t^2 \cdot t} dt \\ & = 4 \int \frac{dt}{1 + 4t^2} = \frac{4}{2} \int \frac{d(2t)}{1 + (2t)^2} \\ & = 2 \operatorname{Bgtan}(2t) + c = 2 \operatorname{Bgtan}(2\sqrt{x}) + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad & \int_{\frac{1}{12}}^{\frac{1}{4}} \frac{2}{\sqrt{x} + 4x\sqrt{x}} dx = 2 \left[\operatorname{Bgtan} 2\sqrt{x} \right]_{\frac{1}{12}}^{\frac{1}{4}} \\ & = 2 \left(\operatorname{Bgtan} 1 - \operatorname{Bgtan} \frac{\sqrt{3}}{3} \right) \\ & = 2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) \\ & = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

$$12 \quad \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$$

$$\begin{aligned} u = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) & \Rightarrow du = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} dx \\ & = \frac{\frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \end{aligned}$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$\begin{aligned} & = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ & = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} \\ & = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + c \end{aligned}$$

$$13 \quad \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 1} = \int \frac{d(e^x)}{(e^x)^2 + 1} = \operatorname{Bgtan}(e^x) + c$$

$$14 \quad \int e^{\sqrt{x}} dx = 2 \int te^t dt$$

$$\begin{aligned} t^2 = x \text{ met } t > 0 & \quad u = t \Rightarrow du = dt \\ \Rightarrow 2t dt = dx & \quad dv = e^t dt \Rightarrow v = e^t \end{aligned}$$

$$= 2 \left(te^t - \int e^t dt \right) = 2e^t(t - 1) + c = 2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1) + c$$

$$15 \quad \int \frac{\sqrt{3x-1}}{x+1} dx$$

$$t^2 = 3x - 1 \Rightarrow 2t dt = 3 dx$$

$$= \frac{2}{3} \int \frac{t^2}{\frac{t^2+1}{3} + 1} dt = 2 \int \frac{t^2 + 4 - 4}{t^2 + 4} dt = 2 \left(\int dt - 4 \int \frac{dt}{t^2 + 4} \right)$$

$$= 2 \left(t - 2 \operatorname{Bgtan} \frac{t}{2} \right) + c = 2 \left(\sqrt{3x-1} - 2 \operatorname{Bgtan} \frac{\sqrt{3x-1}}{2} \right) + c$$

$$16 \quad \int \frac{4x^4 + 2x^3 - 12x^2 + 9}{x^3 - 3x + 2} dx$$

$$\begin{array}{r} 4x^4 + 2x^3 - 12x^2 \quad + 9 \quad \left| \begin{array}{l} x^3 - 3x + 2 \\ \hline \end{array} \right. \\ \underline{+ 4x^4} \quad \quad \underline{\pm 12x^2 \mp 8x} \quad \quad 4x + 2 \\ \quad \quad 2x^3 \quad \quad - 8x + 9 \\ \quad \quad \underline{\mp 2x^3} \quad \quad \underline{\pm 6x \mp 4} \\ \quad \quad \quad \quad - 2x + 5 \end{array}$$

$$= \int \left(4x + 2 + \frac{-2x + 5}{x^3 - 3x + 2} \right) dx$$

$$= 2x^2 + 2x + \int \frac{-2x + 5}{x^3 - 3x + 2} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{-2x + 5}{x^3 - 3x + 2} &= \frac{-2x + 5}{(x-1)^2 (x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2} \\ &= \frac{A(x-1)(x+2) + B(x+2) + C(x-1)^2}{x^3 - 3x + 2} \\ &= \frac{(A+C)x^2 + (A+B-2C)x - 2A + 2B + C}{x^3 - 3x + 2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + C = 0 \\ A + B - 2C = -2 \\ -2A + 2B + C = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \\ C = 1 \end{cases}$$

$$= 2x^2 + 2x - \int \frac{d(x-1)}{x-1} + \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2} + \int \frac{d(x+2)}{x+2}$$

$$= 2x^2 + 2x - \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + \ln|x+2| + c$$

$$= 2x^2 + 2x - \frac{1}{x-1} + \ln \left| \frac{x+2}{x-1} \right| + c$$

$$17 \int \frac{x^4}{x^3 + x^2 - x - 1} dx$$

$$\begin{array}{r} x^4 \\ \overline{+ x^4 + x^3 + x^2 + x} \quad \left| \begin{array}{l} x^3 + x^2 - x - 1 \\ x - 1 \end{array} \right. \\ \hline -x^3 + x^2 + x \\ \quad \overline{+ x^3 + x^2 + x + 1} \\ \hline \quad \quad 2x^2 \quad -1 \end{array}$$

$$= \int \left(x - 1 + \frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2 - x - 1} \right) dx$$

$$= \frac{x^2}{2} - x + \int \frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2 - x - 1} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2 - x - 1} &= \frac{2x^2 - 1}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} \\ &= \frac{A(x+1)^2 + B(x-1)(x+1) + C(x-1)}{(x-1)(x+1)^2} \\ &= \frac{(A+B)x^2 + (2A+C)x + A-B-C}{(x-1)(x+1)^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=2 \\ 2A+C=0 \\ A-B-C=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{4} \\ B=\frac{7}{4} \\ C=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$= \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{4} \int \frac{d(x-1)}{x-1} + \frac{7}{4} \int \frac{d(x+1)}{x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{4} \ln|x-1| + \frac{7}{4} \ln|x+1| + \frac{1}{2(x+1)} + c$$

$$18 \quad \int \frac{(1 + \sin x) \cos x}{2 \sin^2 x + 3 \sin x + 5} dx$$

$$t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$$

$$= \int \frac{1+t}{2t^2 + 3t + 5} dt$$

$$\quad \quad \quad \hookrightarrow D < 0$$

$$= \int \frac{\frac{1}{4}(4t+3) + \frac{1}{4}}{2t^2 + 3t + 5} dt$$

$$= \frac{1}{4} \ln(2t^2 + 3t + 5) + \frac{1}{8} \int \frac{d\left(t + \frac{3}{4}\right)}{\underbrace{t^2 + \frac{3}{2}t + \frac{5}{2}}_{\left(t + \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{31}{16}}}$$

$$= \frac{1}{4} \ln(2t^2 + 3t + 5) + \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{\sqrt{31}} \operatorname{Bgtan} \frac{4}{\sqrt{31}} \left(t + \frac{3}{4}\right) + c$$

$$= \frac{1}{4} \ln(2 \sin^2 x + 3 \sin x + 5) + \frac{1}{2\sqrt{31}} \operatorname{Bgtan} \frac{4 \sin x + 3}{\sqrt{31}} + c$$

$$19 \quad \int x^3 \sqrt{9 - 4x^2} dx$$

$$= \int x^2 \sqrt{9 - 4x^2} x dx$$

$$t^2 = 9 - 4x^2 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = -8x dx$$

$$= -\frac{1}{4} \int \frac{9 - t^2}{4} \cdot t \cdot t dt$$

$$= \frac{1}{16} \int (t^4 - 9t^2) dt = \frac{1}{16} \left(\frac{t^5}{5} - 3t^3 \right) + c$$

$$= \frac{1}{80} t^3 (t^2 - 15) + c$$

$$= \frac{1}{80} \sqrt{(9 - 4x^2)^3} (9 - 4x^2 - 15) + c$$

$$= -\frac{1}{40} \sqrt{(9 - 4x^2)^3} (3 + 2x^2) + c$$

$$20 \quad \int \frac{dx}{\cos^2 x (\tan^3 x + \tan^2 x)}$$

$$t = \tan x \Rightarrow dt = \frac{1}{\cos^2 x} dx$$

$$= \int \frac{dt}{t^3 + t^2} = \int \frac{dt}{t^2(t+1)}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{t^2(t+1)} &= \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t+1} = \frac{At(t+1) + B(t+1) + Ct^2}{t^2(t+1)} \\ &= \frac{(A+C)t^2 + (A+B)t + B}{t^3 + t^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+C=0 \\ A+B=0 \\ B=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \\ C=1 \end{cases}$$

$$= -\int \frac{dt}{t} + \int \frac{dt}{t^2} + \int \frac{d(t+1)}{t+1}$$

$$= -\ln|t| - \frac{1}{t} + \ln|1+t| + c$$

$$= \ln \left| \frac{1+\tan x}{\tan x} \right| - \cot x + c$$

$$21 \quad \int \frac{B \sin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$$

$$t = B \sin \sqrt{x} \Rightarrow dt = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow 2 \sin t dt = \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$$

$$\Downarrow \\ \sin t = \sqrt{x}$$

$$\sqrt{x} = \sin t$$

$$= 2 \int t \sin t dt$$

$$u = t \Rightarrow du = dt$$

$$dv = \sin t dt \Rightarrow v = -\cos t$$

$$= 2(-t \cos t + \int \cos t dt)$$

$$= 2(-t \cos t + \sin t) + c$$

$$= 2(- (B \sin \sqrt{x}) \cdot \sqrt{1-x} + \sqrt{x}) + c$$

$$= 2(\sqrt{x} - \sqrt{1-x} B \sin \sqrt{x}) + c$$

$$\begin{aligned}
 22 \quad & \int_1^{\sqrt{3}} \frac{3x^2 + x + 4}{x^3 + x} dx \\
 & \cdot \frac{3x^2 + x + 4}{x^3 + x} = \frac{3x^2 + x + 4}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} = \frac{A(x^2 + 1) + (Bx + C)x}{x(x^2 + 1)} \\
 & = \frac{(A + B)x^2 + Cx + A}{x^3 + x} \\
 & \Rightarrow \begin{cases} A + B = 3 \\ C = 1 \\ A = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 4 \\ B = -1 \\ C = 1 \end{cases} \\
 & \Rightarrow \int \frac{3x^2 + x + 4}{x^3 + x} dx = 4 \int \frac{dx}{x} + \int \frac{-x + 1}{x^2 + 1} dx \\
 & = 4 \ln|x| - \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} + B \tan x \\
 & = 4 \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + B \tan x + c \\
 & \cdot \int_1^{\sqrt{3}} \frac{3x^2 + x + 4}{x^3 + x} dx = 4 \ln \sqrt{3} - \frac{1}{2} \ln 4 + \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} \right) \\
 & = 4 \ln \sqrt{3} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{12} \pi \\
 & = 2 \ln 3 - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{12}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 23 \quad & \int \frac{dx}{x\sqrt{9+4x^2}} = \int \frac{x dx}{x^2 \sqrt{9+4x^2}} = \frac{1}{4} \int \frac{t}{\frac{t^2-9}{4} \cdot t} dt = \int \frac{dt}{t^2-9} \\
 & t^2 = 9 + 4x^2 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = 8x dx \\
 & \frac{1}{t^2-9} = \frac{A}{t-3} + \frac{B}{t+3} = \frac{(A+B)t + 3A-3B}{(t-3)(t+3)} \\
 & \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ 3A-3B=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{6} \\ B=-\frac{1}{6} \end{cases} \\
 & = \frac{1}{6} \int \frac{d(t-3)}{t-3} - \frac{1}{6} \int \frac{d(t+3)}{t+3} \\
 & = \frac{1}{6} \ln|t-3| - \frac{1}{6} \ln|t+3| \\
 & = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{\sqrt{9+4x^2}-3}{\sqrt{9+4x^2}+3} \right| + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 24 \quad & \int \frac{\tan x}{\sqrt{2 \cos x - 1}} dx = \int \frac{\sin x}{\cos x \sqrt{2 \cos x - 1}} dx \\
 & t^2 = 2 \cos x - 1 \text{ met } t > 0 \Rightarrow 2t dt = -2 \sin x dx \\
 & = - \int \frac{t}{\frac{t^2 + 1}{2} \cdot t} dt = -2 \int \frac{dt}{t^2 + 1} = -2 \operatorname{Bgtan} t + c \\
 & = -2 \operatorname{Bgtan}(\sqrt{2 \cos x - 1}) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 25 \quad & \int \frac{\sin x}{4 + \cos^2 x} dx \\
 & u = \cos x \Rightarrow du = -\sin x dx \\
 & = - \int \frac{du}{4 + u^2} \\
 & = -\frac{1}{2} \operatorname{Bgtan} \frac{u}{2} + c \\
 & = -\frac{1}{2} \operatorname{Bgtan} \left(\frac{\cos x}{2} \right) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 26 \quad & \int e^{\operatorname{Bgsin} x} dx \\
 & u = e^{\operatorname{Bgsin} x} \Rightarrow du = \frac{e^{\operatorname{Bgsin} x}}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 & dv = dx \Rightarrow v = x \\
 & = xe^{\operatorname{Bgsin} x} - \int \frac{e^{\operatorname{Bgsin} x} \cdot x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 & u = e^{\operatorname{Bgsin} x} \Rightarrow du = \frac{e^{\operatorname{Bgsin} x}}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 & dv = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \Rightarrow v = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2} \\
 & = xe^{\operatorname{Bgsin} x} + e^{\operatorname{Bgsin} x} \sqrt{1-x^2} - \int e^{\operatorname{Bgsin} x} dx \\
 & \Rightarrow 2 \int e^{\operatorname{Bgsin} x} dx = (x + \sqrt{1-x^2}) e^{\operatorname{Bgsin} x} + c \\
 & \Rightarrow \int e^{\operatorname{Bgsin} x} dx = \frac{1}{2} e^{\operatorname{Bgsin} x} (x + \sqrt{1-x^2}) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 27 \quad & \int \frac{\ln x}{x\sqrt{1-4\ln x - \ln^2 x}} dx \\
 & t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{dx}{x} \\
 & = \int \frac{t}{\sqrt{1-4t-t^2}} dt = \int \frac{t dt}{\sqrt{1-(t^2+4t)}} = \int \frac{t dt}{\sqrt{5-(t+2)^2}} \\
 & = \int \frac{t+2-2}{\sqrt{5-(t+2)^2}} dt = \int \frac{t+2}{\sqrt{5-(t+2)^2}} dt - 2 \int \frac{dt}{\sqrt{5-(t+2)^2}} \\
 & \quad \quad \quad \hookrightarrow u = 5-(t+2)^2 \\
 & \quad \quad \quad \Rightarrow du = -2(t+2) dt \\
 & = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} - 2 \int \frac{d(t+2)}{\sqrt{5-(t+2)^2}} \\
 & = -\sqrt{u} - 2 \operatorname{Bgsin} \frac{t+2}{\sqrt{5}} + c \\
 & = -\sqrt{5-(\ln x+2)^2} - 2 \operatorname{Bgsin} \frac{\ln x+2}{\sqrt{5}} + c \\
 & = -\sqrt{1-4\ln x - \ln^2 x} - 2 \operatorname{Bgsin} \frac{\ln x+2}{\sqrt{5}} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 28 \quad & \int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx \\
 & \begin{array}{r}
 x^5 + x^4 \qquad \qquad -8 \quad \left| \begin{array}{l} x^3 - 4x \\ x^2 + x + 4 \end{array} \right. \\
 \hline
 \mp x^5 \qquad \pm 4x^3 \\
 \hline
 x^4 + 4x^3 \qquad -8 \\
 \mp x^4 \qquad \pm 4x^2 \\
 \hline
 4x^3 + 4x^2 \qquad -8 \\
 \mp 4x^3 \qquad \pm 16x \\
 \hline
 4x^2 + 16x - 8
 \end{array} \\
 & = \int \left(x^2 + x + 4 + \frac{4x^2 + 16x - 8}{x^3 - 4x} \right) dx \\
 & = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 4 \int \frac{x^2 + 4x - 2}{x^3 - 4x} dx \\
 & \quad \quad \quad \frac{x^2 + 4x - 2}{x^3 - 4x} = \frac{x^2 + 4x - 2}{x(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+2} \\
 & \quad \quad \quad = \frac{A(x^2 - 4) + Bx(x+2) + Cx(x-2)}{x^3 - 4x} \\
 & \quad \quad \quad = \frac{(A+B+C)x^2 + (2B-2C)x - 4A}{x^3 - 4x}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 1 \\ 2B - 2C = 4 \\ -4A = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = \frac{5}{4} \\ C = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 4 \left(\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} + \frac{5}{4} \int \frac{d(x-2)}{x-2} - \frac{3}{4} \int \frac{d(x+2)}{x+2} \right)$$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 2 \ln|x| + 5 \ln|x-2| - 3 \ln|x+2| + c$$

29 $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x+2}} = 2 \int \frac{t \, dt}{(t^2-4)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2-4}$

$t^2 = x+2$ met $t > 0 \Rightarrow 2t \, dt = dx$

$$\frac{1}{t^2-4} = \frac{A}{t-2} + \frac{B}{t+2} = \frac{(A+B)t + 2A - 2B}{t^2-4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ 2A - 2B = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{4} \\ B = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{d(t-2)}{t-2} - \frac{1}{2} \int \frac{d(t+2)}{t+2}$$

$$= \frac{1}{2} \ln|t-2| - \frac{1}{2} \ln|t+2| + c$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x+2}+2} \right| + c$$

30 $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{-\cos^4 x + 4\cos^2 x + 1}} \, dx$

$t = \cos^2 x \Rightarrow dt = 2 \cos x (-\sin x) dx = -\sin 2x \, dx$

$$= - \int \frac{dt}{\sqrt{-t^2 + 4t + 1}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{5 - (t-2)^2}}$$

$$= - \int \frac{d(t-2)}{\sqrt{5 - (t-2)^2}} = -B \sin \frac{t-2}{\sqrt{5}} + c$$

$$= -B \sin \frac{\cos^2 x - 2}{\sqrt{5}} + c$$

Opdracht 82 bladzijde 140

Bereken de oppervlakte begrensd door de parabool met vergelijking $y = \frac{x^2}{2p}$ en de kromme met vergelijking $y = \frac{p^3}{x^2 + p^2}$ met $p > 0$.

- snijpunten:


$$\frac{x^2}{2p} = \frac{p^3}{x^2 + p^2} \Leftrightarrow x^4 + p^2x^2 = 2p^4 \Leftrightarrow x^4 + p^2x^2 - 2p^4 = 0$$

$$D = 9p^4$$

$$x^2 = \frac{-p^2 \pm 3p^2}{2} \begin{cases} -\frac{2}{p^2} \\ p^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = \pm p$$

$$\Rightarrow S_1\left(p, \frac{p}{2}\right), S_2\left(-p, \frac{p}{2}\right)$$



- Wegens symmetrie:

$$A = 2 \int_0^p \left(\frac{p^3}{x^2 + p^2} - \frac{x^2}{2p} \right) dx$$

$$= 2 \int_0^p \frac{2p^4 - x^4 - p^2x^2}{2p(x^2 + p^2)} dx$$

$$= \frac{-1}{p} \int_0^p \frac{x^4 + p^2x^2 - 2p^4}{x^2 + p^2} dx$$

$$\frac{x^4 + p^2x^2 - 2p^4}{x^2 + p^2} = \frac{x^4 + p^2x^2}{x^2 + p^2} - \frac{2p^4}{x^2 + p^2}$$

$$= -\frac{1}{p} \int_0^p \left(x^2 - \frac{2p^4}{x^2 + p^2} \right) dx$$

$$= -\frac{1}{3p} [x^3]_0^p + \frac{2p^3}{p} \left[\text{Bgtan} \frac{x}{p} \right]_0^p$$

$$= -\frac{p^2}{3} + 2p^2 (\text{Bgtan} 1 - \text{Bgtan} 0)$$

$$= -\frac{p^2}{3} + 2p^2 \cdot \frac{\pi}{4}$$

$$= p^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \right)$$

Opdracht 83 bladzijde 140

Bereken

$$1 \quad \int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx$$

$$u = xe^x \Rightarrow du = (e^x + xe^x)dx = e^x(x+1)dx$$

$$dv = \frac{dx}{(1+x)^2} \Rightarrow v = -\frac{1}{x+1}$$

$$= -\frac{xe^x}{x+1} + \int e^x dx$$

$$= -\frac{xe^x}{x+1} + e^x + c$$

$$= e^x \left(\frac{-x+x+1}{x+1} \right) + c$$

$$= \frac{e^x}{x+1} + c$$

$$2 \quad \int \sqrt{x^2 + 2x + 10} dx = \int \sqrt{(x+1)^2 + 9} dx$$

$$t = x+1 \Rightarrow dt = dx$$

$$= \int \sqrt{t^2 + 9} dt$$

$$u = \sqrt{t^2 + 9} \Rightarrow du = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 9}} dt$$

$$dv = dt \Rightarrow v = t$$

$$= t \sqrt{t^2 + 9} - \int \frac{t^2}{\sqrt{t^2 + 9}} dt$$

$$= t \sqrt{t^2 + 9} - \int \frac{t^2 + 9 - 9}{\sqrt{t^2 + 9}} dt$$

$$= t \sqrt{t^2 + 9} - \int \sqrt{t^2 + 9} dt + 9 \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 9}}$$

$$\Rightarrow 2 \int \sqrt{t^2 + 9} dt = t \sqrt{t^2 + 9} + 9 \ln |t + \sqrt{t^2 + 9}| + c$$

$$\Rightarrow \int \sqrt{t^2 + 9} dt = \frac{t}{2} \sqrt{t^2 + 9} + \frac{9}{2} \ln |t + \sqrt{t^2 + 9}| + c$$

$$\Rightarrow \int \sqrt{x^2 + 2x + 10} dx = \frac{x+1}{2} \sqrt{x^2 + 2x + 10} + \frac{9}{2} \ln |x+1 + \sqrt{x^2 + 2x + 10}| + c$$

$$3 \int (\text{Bgc} \cos x)^2 dx$$

$$u = (\text{Bgc} \cos x)^2 \Rightarrow du = 2 \text{Bgc} \cos x \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x (\text{Bgc} \cos x)^2 + 2 \int \text{Bgc} \cos x \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$u = \text{Bgc} \cos x \Rightarrow du = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$dv = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \Rightarrow v = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2}$$

$$= x(\text{Bgc} \cos x)^2 - 2 \sqrt{1-x^2} \text{Bgc} \cos x - 2 \int dx$$

$$= x(\text{Bgc} \cos x)^2 - 2 \sqrt{1-x^2} \text{Bgc} \cos x - 2x + c$$

$$4 \int \frac{x \text{Bgtan } 2x}{\sqrt{4x^2 + 1}} dx$$

$$u = \text{Bgtan } 2x \Rightarrow du = \frac{2}{1+4x^2} dx$$

$$dv = \frac{x}{\sqrt{4x^2 + 1}} dx \Rightarrow v = \frac{1}{8} \int \frac{d(4x^2 + 1)}{\sqrt{4x^2 + 1}} = \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 1}$$

$$= \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 1} \text{Bgtan } 2x - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{4x^2 + 1} dx$$

$$= \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 1} \text{Bgtan } 2x - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

$$= \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 1} \text{Bgtan } 2x - \frac{1}{4} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{(2x)^2 + 1}}$$

$$= \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 1} \text{Bgtan } 2x - \frac{1}{4} \ln |2x + \sqrt{4x^2 + 1}| + c$$

$$5 \int \cos^2(\ln x) dx$$

$$u = \cos^2(\ln x) \Rightarrow du = 2 \cos(\ln x)(-\sin(\ln x)) \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= x \cos^2(\ln x) + 2 \int \cos(\ln x) \sin(\ln x) dx$$

$$= x \cos^2(\ln x) + \int \sin(2 \ln x) dx$$

$$u = \sin(2 \ln x) \Rightarrow du = \cos(2 \ln x) \cdot \frac{2}{x} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$\Rightarrow \int \sin(2 \ln x) dx = x \sin(2 \ln x) - 2 \int \cos(2 \ln x) dx$$

$$u = \cos(2 \ln x) \Rightarrow du = -\sin(2 \ln x) \cdot \frac{2}{x} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$= \sin(2 \ln x) - 2x \cos(2 \ln x) - 4 \int \sin(2 \ln x) dx$$

$$\Rightarrow 5 \int \sin(2 \ln x) dx = x \sin(2 \ln x) - 2x \cos(2 \ln x) + c$$

$$\Rightarrow \int \sin(2 \ln x) dx = \frac{1}{5} x \sin(2 \ln x) - \frac{2}{5} x \cos(2 \ln x) + c$$

$$= x \cos^2(\ln x) + \frac{1}{5} x (\sin(2 \ln x) - 2 \cos(2 \ln x)) + c$$

$$6 \int \frac{\ln 2x}{x \ln 4x} dx = \int \frac{\ln 2 + \ln x}{x (\ln 4 + \ln x)} dx$$

$$t = \ln 4 + \ln x \Rightarrow dt = \frac{1}{x} dx$$

$$= \int \frac{\ln 2 + t - \ln 4}{t} dt$$

$$= \int \frac{\ln \frac{1}{2} + t}{t} dt$$

$$= \ln \frac{1}{2} \cdot \ln|t| + t + c$$


$$= \ln \frac{1}{2} \cdot \ln|\ln 4 + \ln x| + \ln 4 + \ln x + c$$

$$= \ln 4x - (\ln 2) \cdot \ln|\ln 4x| + c$$

Hersenbreker 1 bladzijde 142

In de figuur zie je een regelmatige negenhoek met al zijn diagonalen. Hoeveel gelijkbenige driehoeken zijn er waarvan de drie verschillende hoekpunten ook hoekpunten van de negenhoek zijn?

(Een driehoek is gelijkbenig als twee of drie zijden dezelfde lengte hebben.)

**A** 27**B** 30**C** 33**D** 36**E** 39

(Bron © NWO eerste ronde, 2012)

Noem de hoekpunten A, B, ...

Elk hoekpunt vormt met het dichtste hoekpunt links en rechts een gelijkbenige driehoek. Zo zijn er 9 gelijkbenige driehoeken: $\triangle ABI$, $\triangle BCA$...

Er zijn ook 9 gelijkbenige driehoeken van de vorm $\triangle ACH$ (steeds 2 hoekpunten verder).

Van de gelijkbenige driehoeken van de vorm $\triangle ADG$ (steeds 3 hoekpunten verder) zijn er maar 3: $\triangle ADG$, $\triangle BEH$ en $\triangle CFI$.

Van de gelijkbenige driehoeken van de vorm $\triangle AEF$ (4 hoekpunten verder) zijn er dan weer 9.

In totaal zijn er $9 + 9 + 3 + 9 = 30$ gelijkbenige driehoeken.

Antwoord B is juist.

Hersensbreker 2 bladzijde 142

Een getal bestaat uit drie verschillende cijfers. De som van de vijf andere getallen met drie verschillende cijfers die men met deze cijfers kan vormen, is 2003.

Bepaal dat getal.

(Bron © VWO finale, 2003)

Stel het gevraagde getal gelijk aan $A = 100x + 10y + z$.

$$\begin{aligned} \text{Er geldt dan dat } A + 2003 &= (100x + 10y + z) + (100x + 10z + y) + (100y + 10x + z) \\ &\quad + (100y + 10z + x) + (100z + 10x + y) + (100z + 10y + x) \\ &= 222(x + y + z). \end{aligned}$$

Aangezien A ligt tussen 102 en 987, zijn de mogelijkheden voor $x + y + z$ enkel 10, 11, 12 en 13. (Immers: $9 \times 222 < 2003$, $10 \times 222 = 2220$, ..., $14 \times 222 = 3108$ en $3108 - 2003 = 1105$ is een getal van 4 cijfers.)

Verschillende mogelijkheden:

$x + y + z$	$222(x + y + z)$	$A = 222(x + y + z) - 2003$	
10	2220	217	
11	2442	439	
12	2664	661	(gelijke cijfers)
13	2886	883	(gelijke cijfers)


- $217 + 271 + 127 + 172 + 712 + 721 = 2220 = 2003 + \textcircled{217}$
- $439 + 493 + 349 + 394 + 934 + 943 = 3552 = 2003 + 1549$

\Rightarrow Het gevraagde getal is 217.

Hersenbreker 3 bladzijde 142

Een balk met afmetingen $4 \times 4 \times h$ bevat een bol met straal 2 en acht kleinere bollen met straal 1. De kleine bollen raken telkens drie zijden van de balk en de grote bol raakt de kleine bollen.

Bereken h .



Verbind je de middelpunten van de klein bollen, dan vind je een balk met als grondvlak een vierkant met zijde 2.

In de rechthoekige driehoek ACG is

$$\begin{aligned} |CG| &= \sqrt{6^2 - 8} = \sqrt{28} \\ &= 2\sqrt{7} \end{aligned}$$

De hoogte is dan gelijk aan $2 + 2\sqrt{7}$.

