

Letzte Aktualisierung: 5. August 2026. Download unter <https://johannes-titz.github.io/formelsammlung/main.pdf>

Diese Formelsammlung wurde für Studierende der Psychologie entwickelt, dürfte aber auch für Studierende anderer Sozialwissenschaften nützlich sein. Sie basiert auf einer älteren Sammlung der Professur für Forschungsmethoden an der TU Chemnitz, die weder Autoren noch Lizenzangaben enthielt. Für eine sinnvolle Nutzung und Weiterentwicklung ist eine Lizenz erforderlich; deshalb wird das vorliegende Dokument unter der CC BY-SA 4.0 veröffentlicht. Die Formelsammlung orientiert sich am Lehrbuch von Sedlmeier und Renkewitz (2024). Die erste Version wurde von Johannes Titz, Nils Heimhuber und Feline Baumgärtel erstellt. Weitere Mitwirkende waren Vivien Lungwitz und Annika Sternkopf. Zahlreiche Korrekturen und Ergänzungen erfolgten durch Johannes Titz und Ulf Kröhne. Für wertvolle Hinweise bedanken wir uns bei Lea Haase.

Einige Hinweise vorab: Lateinische Buchstaben ($\bar{x}, s^2, s$) werden für die Stichprobe verwendet, griechische Buchstaben (μ, σ^2, σ) für die Population. Ein Dach über einer Statistik ($\hat{\sigma}$) steht für eine Schätzung des Parameters. Abkürzungen: MWU: Mittelwertsunterschied US: Unabhängige Stichproben AS: Abhängige Stichproben

Lagemaße

Modalwert

Der Modalwert ist der häufigste Wert aller Messwerte. Es kann mehrere Modal-Werte geben.

Mittelwert

Auch bezeichnet als arithmetisches Mittel, für den Mittelwert der Population wird der Buchstabe μ verwendet.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Median

Der Median ist der Wert in der Mitte aller in einer Rangreihe geordneten Messwerte.

$$\text{Tiefe}_{\text{Med}} = \frac{n+1}{2}$$

Quartile

Die Werte müssen in eine Rangreihe gebracht werden. Für das untere Quartil wird die Tiefe von unten gezählt, fürs obere Quartil von oben. Quartile werden manchmal auch als die Quantile Q_{25}, Q_{75} bezeichnet.

$$\text{Tiefe}_{\text{Quartil}} = \frac{\lfloor \text{Tiefe}_{\text{Med}} \rfloor + 1}{2}$$

Zäune bei Boxplots

Die Zäune werden benötigt um die Whiskers zu bestimmen. Die Whiskers sind durch tatsächlich vorkommende Werte repräsentiert. Von den Zäunen aus geht man in Richtung Box, bis man den ersten vorkommenden Wert findet.

$$\text{Zaun}_{\text{unten}} = Q_{25} - 1,5 \cdot \text{IQA}$$

$$\text{Zaun}_{\text{oben}} = Q_{75} + 1,5 \cdot \text{IQA}$$

Streuungsmaße

Standardabweichung

$$s = \sqrt{s^2}$$

Varianz

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Schätzung für Populationsvarianz

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} \cdot s^2$$

Hinweis: In der mathematischen Statistik wird die *Stichprobenvarianz* üblicherweise mit dem Nenner $n-1$ definiert, da dieser Schätzer erwartungstreu für die Populationsvarianz ist. In den Sozialwissenschaften wird hingegen oft die Variante mit n als *Varianz der Stichprobe* bezeichnet. Hat man dagegen die gesamte Population, so wird auch die *Populationsvarianz* mit n im Nenner berechnet.

Spannweite (Range)

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Mittlerer absoluter Abstand

$$\text{MAD} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

Interquartilsabstand

$$\text{IQA} = Q_{75} - Q_{25}$$

Transformation

z-Standardisierung

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$
$$\bar{z} = 0$$
$$s_z = 1$$

Zentrierung

$$c_i = x_i - \bar{x}$$

IQ-Standardisierung

$$IQ_i = z_i \cdot 15 + 100$$

Standardfehler für Stichprobenverteilungen

Binomialverteilung

$$\sigma_{\text{Anzahl}} = \sqrt{np(1-p)}$$

$$\sigma_{\text{Anteil}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Mittelwerte

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = \frac{s}{\sqrt{n-1}}$$

MWU für AS

$$\hat{\sigma}_{\bar{d}} = \frac{\hat{\sigma}_d}{\sqrt{n}}$$

MWU für US

wenn $n_A = n_B$:

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B} = \sqrt{\hat{\sigma}_{\bar{x}_A}^2 + \hat{\sigma}_{\bar{x}_B}^2}$$

wenn $n_A \neq n_B$

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B} = \sqrt{\frac{(n_A - 1) \cdot \hat{\sigma}_A^2 + (n_B - 1) \cdot \hat{\sigma}_B^2}{(n_A - 1) + (n_B - 1)} \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}$$

Bei Ungleichheit der Varianzen in der Population

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_A^2}{n_A} + \frac{\hat{\sigma}_B^2}{n_B}}$$

Einfache lineare Regression

$$\hat{\sigma}_{b_1} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$\hat{\sigma}_{b_0} = \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right)}$$

Zusammenhangsmaße

Kovarianz

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Korrelation

Pearson-Korrelationskoeffizient
(Produkt-Moment-Korrelation)

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{s_x s_y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_{x_i} \cdot z_{y_i}$$

Partialkorrelation

$$r_{xy.z} = \frac{r_{xy} - r_{xz} \cdot r_{yz}}{\sqrt{1 - r_{xz}^2} \cdot \sqrt{1 - r_{yz}^2}}$$

Phi-Koeffizient (für dichotome Variablen)

$$\Phi = \frac{a \cdot d - b \cdot c}{\sqrt{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}}$$

Rater A / Rater B	nein	ja	Summe
nein	a	b	a + b
ja	c	d	c + d
Summe	a + c	b + d	n

Yules Q (für dichotome Variablen)

$$Q = \frac{ad - bc}{ad + bc}$$

Interrater-Reliabilität (Kappa)

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

$$p_e = \sum_{i=1}^k p_{i \cdot} \cdot p_{\cdot i}$$

- p_o : beobachtete Übereinstimmung
- p_e : erwartete Übereinstimmung unter Zufall
- $p_{i \cdot}$: die Randwahrscheinlichkeit der Zeile i
- $p_{\cdot i}$: die Randwahrscheinlichkeit der Spalte i
- k : die Anzahl der Kategorien

Die Randverteilungen sind die Zeilen- und Spaltensummen der Vierfeldertafel. Für die in der Kappa-Formel verwendeten Randwahrscheinlichkeiten werden diese Summen durch n geteilt.

Einfache lineare Regression

Regressionsgleichung

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 \cdot x_i$$

$$b_1 = \frac{\text{cov}(x, y)}{s_x^2} = r \frac{s_y}{s_x}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

$$y_i = \hat{y}_i + e_i$$

Determinationskoeffizient

$$R^2 = \frac{s_{\hat{y}}^2}{s_y^2}$$

$$R_{\text{adj}}^2 = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n - 1}{n - 2}$$

Standardschätzfehler

$$s_e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} = s_y \cdot \sqrt{1 - r^2}$$

$$\hat{\sigma}_e = \hat{\sigma}_y \cdot \sqrt{1 - R_{\text{adj}}^2}$$

Multiple Regression

In den folgenden Formeln wird zur Veranschaulichung der Fall mit zwei Prädiktoren dargestellt. Für mehr als zwei Prädiktoren lassen sich die Regressionsgleichung, die Beziehung zwischen b und β , die Berechnung von b_0 sowie die Formeln für den Standardschätzfehler analog erweitern. Die Berechnung der β -Gewichte und von R^2 erfordert jedoch eine Matrixschreibweise, die nicht überall unterrichtet wird.

Regressionsgleichung

für Originalwerte:

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 \cdot x_{1i} + b_2 \cdot x_{2i}$$

wobei:

$$b_1 = \beta_1 \cdot \frac{s_y}{s_{x_1}}$$

$$b_2 = \beta_2 \cdot \frac{s_y}{s_{x_2}}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \cdot \bar{x}_1 - b_2 \cdot \bar{x}_2$$

für z-standardisierte Werte:

$$\hat{z}_{y_i} = \beta_1 \cdot z_{x_{1i}} + \beta_2 \cdot z_{x_{2i}}$$

wobei:

$$\beta_1 = \frac{r_{yx_1} - r_{yx_2} \cdot r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}$$

$$\beta_2 = \frac{r_{yx_2} - r_{yx_1} \cdot r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}$$

Gütemaße

Multipler Determinationskoeffizient

$$R^2 = \beta_1 \cdot r_{yx_1} + \beta_2 \cdot r_{yx_2}$$

$$R_{\text{adj}}^2 = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n - 1}{n - k - 1}$$

Multipler Korrelationskoeffizient

$$R = \sqrt{R^2}$$

Standardschätzfehler für Originalwerte

$$s_e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} = s_y \sqrt{1 - R^2}$$

$$\hat{\sigma}_e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - k - 1}} = \hat{\sigma}_y \cdot \sqrt{1 - R_{\text{adj}}^2}$$

Standardschätzfehler für z-standardisierte Werte

$$\hat{\sigma}_e = \sqrt{1 - R_{\text{adj}}^2}$$

Konfidenzintervalle

Binomialverteilung (Approximation)

Die folgende Approximation über die Normalverteilung ist nur nutzbar, wenn $\sigma_{\text{Anzahl}}^2 = n \cdot p \cdot (1 - p) > 9$

für Anteile

$$\hat{p} \pm \sigma_{\text{Anteil}} \cdot z_{\text{Konfidenz}}$$

für Anzahlen/Objekte

$$\hat{p} \cdot n \pm \sigma_{\text{Anzahl}} \cdot z_{\text{Konfidenz}}$$

Mittelwert

$$\bar{x} \pm \hat{\sigma}_{\bar{x}} \cdot t_{\text{df, Konfidenz}}$$

MWU, US

$$(\bar{x}_A - \bar{x}_B) \pm \hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B} \cdot t_{\text{df, Konfidenz}}$$

MWU, AS

$$\bar{d} \pm \hat{\sigma}_{\bar{d}} \cdot t_{\text{df, Konfidenz}}$$

Regressionskoeffizienten

$$b_1 \pm t_{n-2, 1-\alpha/2} \cdot \hat{\sigma}_{b_1}$$

$$b_0 \pm t_{n-2, 1-\alpha/2} \cdot \hat{\sigma}_{b_0}$$

Mittelwert gegen Konstante

wobei c (constant) vorgegeben

$$t = \frac{\bar{x} - c}{\hat{\sigma}_{\bar{x}}}$$

$$df = n - 1$$

MWU, US

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B}}$$

$$df = (n_A - 1) + (n_B - 1)$$

Hinweis: Berechnung der df gilt nur bei Gleichheit der Populationsvarianzen.

MWU, AS

$$t_{AS} = \frac{\bar{D}}{\hat{\sigma}_{\bar{D}}}$$

$$df_{AS} = n - 1$$

D : Differenz zwischen Mess-Werten

 α -Fehler-Kumulierung

Werden $j = \frac{k(k-1)}{2}$ paarweise Vergleiche durchgeführt, ergibt sich unter der Annahme unabhängiger Tests für die Wahrscheinlichkeit mindestens eines α -Fehlers:

$$\alpha_{\text{kum}} = 1 - (1 - \alpha)^j$$

Um die Familienfehlerwahrscheinlichkeit zu kontrollieren, ist eine Kontrastanalyse eine bessere Alternative zu paarweisen Vergleichen. Sind mehrere Tests zwingend erforderlich, werden häufig folgende Korrekturen verwendet:

Bonferroni:

$$\alpha' = \frac{\alpha}{j}$$

Šidák:

$$\alpha' = 1 - (1 - \alpha)^{1/j}$$

ANOVA US

F-Wert

$$F(df_{zw}, df_{inn}) = \frac{\hat{\sigma}_{zw}^2}{\hat{\sigma}_{inn}^2}$$

Schätzer der Populationsvarianzen

$$\hat{\sigma}_{zw}^2 = \frac{QS_{zw}}{df_{zw}}$$

$$\hat{\sigma}_{inn}^2 = \frac{QS_{inn}}{df_{inn}}$$

Hinweis: diese werden auch oft als Mean Squares (MS) bezeichnet.

Quadratsummenzerlegung

$$QS_{\text{ges}} = QS_{zw} + QS_{inn}$$

Quadratsummen

$$QS_{zw} = \sum_{j=1}^k n_j \cdot (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{inn} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

Freiheitsgrade

$$df_{zw} = k - 1$$

$$df_{inn} = \sum_{j=1}^k (n_j - 1) = N - k$$

Notation

k : Anzahl der Bedingungen

n_j : Anzahl der Messwerte pro Bedingung j

N : Gesamtzahl der Messwerte

$\bar{\bar{x}}$: Gesamtmittelwert

Hinweis: Gilt für balanciertes Design und unter Annahme von Sphärizität.

Sphärizität: Die Varianzen aller Differenzen zwischen den Bedingungen sind gleich, d. h.

$\text{Var}(X_j - X_{j'})$ ist konstant für alle $j \neq j'$

F-Wert

$$F = \frac{\hat{\sigma}_{UV}^2}{\hat{\sigma}_{\text{res}}^2}$$

Schätzer der Populationsvarianzen

$$\hat{\sigma}_{UV}^2 = \frac{QS_{UV}}{df_{UV}}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{res}}^2 = \frac{QS_{\text{res}}}{df_{\text{res}}}$$

Hinweis: diese werden auch oft als Mean Squares (MS) bezeichnet.

Quadratsummen

$$QS_{\text{ges}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (x_{ji} - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{UV} = \sum_{j=1}^k n \cdot (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{\text{Person}} = \sum_{i=1}^n k \cdot (\bar{x}_i - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{\text{res}} = QS_{\text{ges}} - QS_{UV} - QS_{\text{Person}}$$

Quadratsummenzerlegung

$$QS_{\text{ges}} = QS_{UV} + QS_{\text{Person}} + QS_{\text{res}}$$

Freiheitsgrade

$$df_{\text{gesamt}} = N - 1$$

$$df_{UV} = k - 1$$

$$df_{\text{Person}} = n - 1$$

$$df_{\text{res}} = (k - 1)(n - 1)$$

Residuum als Interaktionseffekt (additives Modell)

Erwarteter Wert ohne Interaktion:

$$x_{ji}^e = \bar{x}_{j\cdot} + \bar{x}_{\cdot i} - \bar{\bar{x}}$$

Da pro Zelle nur ein Wert vorliegt, entspricht der Zellmittelwert dem Einzelwert.

Die Residualquadratsumme ergibt sich äquivalent als:

$$QS_{\text{res}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (x_{ji} - x_{ji}^e)^2$$

Oft wird res als $UV \times \text{Person}$ bezeichnet, da der Fehler im abhängigen Fall der Interaktion entspricht.

Notation

k : Anzahl der Bedingungen

n : Anzahl der Personen

N : Gesamtzahl der Messwerte

$\bar{\bar{x}}$: Gesamtmittelwert

x_{ji}^e : erwarteter Wert unter keiner Interaktion

Zweifaktorielle Varianzanalyse

Hinweis: gilt nur bei balancierten Designs (gleiche Stichprobengröße)

F-Werte

$$F_A = \frac{\hat{\sigma}_A^2}{\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2}$$

$$F_B = \frac{\hat{\sigma}_B^2}{\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2}$$

$$F_{A \times B} = \frac{\hat{\sigma}_{A \times B}^2}{\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2}$$

Populationsvarianzen

$$\hat{\sigma}_A^2 = \frac{QS_A}{df_A}$$

$$\hat{\sigma}_B^2 = \frac{QS_B}{df_B}$$

$$\hat{\sigma}_{A \times B}^2 = \frac{QS_{A \times B}}{df_{A \times B}}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2 = \frac{QS_{\text{inn}}}{df_{\text{inn}}}$$

Freiheitsgrade

$$df_{\text{inn}} = \sum_j \sum_l (n_{jl} - 1) = N - km$$

$$df_A = k - 1$$

$$df_B = m - 1$$

$$df_{A \times B} = (k - 1)(m - 1)$$

Quadratsummen

$$QS_{\text{ges}} = QS_A + QS_B + QS_{A \times B} + QS_{\text{inn}}$$

$$QS_{\text{ges}} = \sum_j \sum_l \sum_i (x_{ijl} - \bar{x})^2$$

$$QS_{\text{inn}} = \sum_j \sum_l \sum_i (x_{ijl} - \bar{x}_{jl})^2$$

$$QS_A = n \cdot m \sum_j (\bar{x}_{j\cdot} - \bar{x})^2$$

$$QS_B = n \cdot k \sum_l (\bar{x}_{\cdot l} - \bar{x})^2$$

$$QS_{A \times B} = n \sum_{j=1}^k \sum_{l=1}^m (\bar{x}_{jl} - \bar{x}_{j\cdot} - \bar{x}_{\cdot l} + \bar{x})^2$$

$$QS_{A \times B} = QS_{\text{ges}} - QS_A - QS_B - QS_{\text{inn}}$$

Notation

N : Gesamtzahl der Messwerte der Untersuchung
 n : Anzahl der Messwerte pro Bedingung
 k : Anzahl der Stufen des Faktors A
 m : Anzahl der Stufen des Faktors B
 $\bar{x}$: Gesamtmittelwert
 $\bar{x}_{j\cdot}$: Mittelwert für Faktor A , Bedingung j
 $\bar{x}_{\cdot l}$: Mittelwert für Faktor B , Bedingung l

Kontrastanalyse US

Voraussetzung: $\sum_i \lambda_i = 0$

Orthogonalität zweier Kontraste λ_A, λ_B : $\sum_i \lambda_{A,i} \lambda_{B,i} = 0$

$$F_{\text{Kontrast}} = \frac{\hat{\sigma}_{\text{Kontrast}}^2}{\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2}$$

oder

$$F = t^2$$

$$|t_{\text{Kontrast}}| = \sqrt{F_{\text{Kontrast}}}$$

Geschätzte Populationsvarianz

$$\hat{\sigma}_{\text{Kontrast}}^2 = \frac{QS_{\text{Kontrast}}}{df_{\text{Kontrast}}}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2 = \frac{QS_{\text{inn}}}{df_{\text{inn}}}$$

Siehe auch ANOVA US.

Quadratsummen

$$QS_{\text{Kontrast}} = \frac{\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i \bar{x}_i \right)^2}{\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i^2}{n_i}}$$

Freiheitsgrade

$$df_{\text{Kontrast}} = 1$$

$$df_{\text{inn}} = N - k$$

Notation

N : Gesamtzahl der Messwerte
 i : Bedingung
 k : Anzahl der Bedingungen (Gruppen)
 n_i : Anzahl der Messwerte pro Bedingung i

Hinweis: Gilt für den Fall ohne Subgruppen.

Voraussetzung: $\sum_j^k \lambda_j = 0$

$$t_{\text{Kontrast}} = \frac{\bar{L}}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_L^2}{n}}}$$

$$L_i = \sum_{j=1}^k (x_{ij} \cdot \lambda_j)$$

$$\hat{\sigma}_L^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2$$

$$\text{df}_{\text{Kontrast}} = n - 1$$

Notation

$\bar{L}$: Mittelwert L -Werte

$\hat{\sigma}_L^2$: geschätzte Populationsvarianz der L -Werte

i : Objekt/Person

n : Anzahl der Objekte/Personen, für die mehrere Messungen durchgeführt wurden

j : Bedingung

k : Anzahl Bedingungen

χ^2 -Anpassungstest

für eine Variable

$$\chi^2 = \sum_i^k \frac{(f_{b,i} - f_{e,i})^2}{f_{e,i}}$$

$$f_{e,i} = N \cdot P_i$$

$$df = k - 1$$

für zwei Variablen

$$\chi^2 = \sum_i^k \sum_j^m \frac{(f_{b,ij} - f_{e,ij})^2}{f_{e,ij}}$$

$$f_{e,ij} = N \cdot P_{ij}$$

$$df = k \cdot m - 1$$

χ^2 -Unabhängigkeitstest

$$\chi^2 = \sum_i^k \sum_j^m \frac{(f_{b,ij} - f_{e,ij})^2}{f_{e,ij}}$$

$$f_{e,ij} = \frac{Z_i \cdot S_j}{N}$$

$$df = (k - 1) \cdot (m - 1)$$

Bei 2 dichotomen Variablen: $\chi^2 = \phi^2 \cdot N$

Pearson-Residuum

$$r_{ij} = \frac{f_{b,ij} - f_{e,ij}}{\sqrt{f_{e,ij}}}$$

$$\sum r_{ij}^2 = \chi^2$$

Faustregel: $|r_{ij}| > 2$ deutet auf eine auffällige Zelle hin.

χ^2 -Effektgrößen

Cohen's w :

$$w = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$$

Phi-Koeffizient (nur für 2×2 -Tabellen):

$$\phi = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$$

Cramér's V :

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot (\min(k, m) - 1)}}$$

Umrechnung von V in w :

$$w = V \sqrt{\min(k, m) - 1}$$

Für 2×2 -Kontingenztafeln gilt

$$w = \phi = V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$$

Die drei Effektgrößen sind in diesem Fall identisch und unterscheiden sich erst bei größeren Tabellen.

U-Test nach Mann und Whitney (Wilcoxon Rangsummen-Test)

1. Messwerte insgesamt in Rangreihe bringen und jedem Messwert einen Rangplatz zuweisen
2. T_1 : Summe der Rangplätze der Gruppe 1 T_2 : Summe der Rangplätze der Gruppe 2
3. $U = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1 \cdot (n_1 + 1)}{2} - T_1$
 $U' = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2 \cdot (n_2 + 1)}{2} - T_2 = n_1 \cdot n_2 - U$
4. Prüfgröße für die bei uns verwendete Tabelle ist der kleinere der beiden U-Werte

Approximation über Normalverteilung bei großen Stichproben:

$$z = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U}$$

$$\mu_U = \frac{n_1 \cdot n_2}{2}, \quad \sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

Wilcoxon-Test für AS (Vorzeichenrangtest)

1. Differenzen der Messwertpaare bilden
2. den Beträgen der Differenzen Rangplatz zuweisen (beim kleinsten Betrag mit Rangplatz 1 beginnen)
3. T_- : Summe der Rangplätze der negativen Differenzen
 T_+ : Summe der Rangplätze der positiven Differenzen
4. Prüfgröße für die Tabelle ist der kleinere der beiden T-Werte

Notation

$f_{b,i}$: beobachtete Häufigkeit

$f_{e,i}$: erwartete Häufigkeit

P_i : in der Merkmalsausprägung erwarteter Anteil

N : Anzahl der Untersuchungsteilnehmer

k, m : Anzahl der Merkmalsausprägungen beider Merkmale

Z_i : Zeilenhäufigkeit

S_j : Spaltenhäufigkeit

ϕ : Phi-Koeffizient

Faktorenanalyse

Bei z -standardisierten Variablen, Hauptkomponenten-Analyse und orthogonaler Extraktion gilt:

1. Faktorladung: $a_{m,f} = r_{m,f}$

2. Eigenwert: $\lambda_f = \sum_{m=1}^M a_{m,f}^2$

3. Kommunalität: $h_m^2 = \sum_{f=1}^F a_{m,f}^2$

4. Uniqueness: $u_m^2 = 1 - h_m^2$

5. durch Faktor aufgeklärter Varianzanteil: $\frac{\lambda_f}{M}$

6. Reproduktion der Korrelation zwischen Item m und m' :

$$r_{m,m'} = \sum_{f=1}^F a_{m,f} a_{m',f}$$

Notation

m : Variable

M : Anzahl der Variablen

f : Faktor

F : Anzahl der ausgewählten Faktoren

i : Person/Objekt

r : Korrelation

Clusteranalyse

Nominalskalierte Variablen

	Fall x	
	+	-
Fall y	+	a c
	-	b d

Tanimoto-Koeffizient

$$T = \frac{a}{a + b + c}$$

M-Koeffizient

$$M = \frac{a + d}{a + b + c + d}$$

Intervallskalierte Variablen

a, b : Fälle

J : Anzahl der Variablen (Dimensionen)

r : Minkowski-Konstante

Minkowski-Metrik

$$d_{a,b} = \left[\sum_{j=1}^J |x_{aj} - x_{bj}|^r \right]^{\frac{1}{r}}$$

Euklidische Distanz

$$d_{a,b} = \sqrt{\sum_{j=1}^J |x_{aj} - x_{bj}|^2}$$

Manhattan-Distanz / City-Block-Metrik

$$d_{a,b} = \sum_{j=1}^J |x_{aj} - x_{bj}|$$

Konventionen nach Cohen

Die folgenden Konventionen sind lediglich Orientierungshilfen und sollten *nicht* unkritisch angewendet werden. Man beachte Cohens eigene Warnungen:

„These values are necessarily somewhat arbitrary, but were chosen so as to seem reasonable. The reader can render his own judgment as to their reasonableness.“ (Cohen, 1962, S. 146)

„This is an operation fraught with many dangers: The definitions are arbitrary, such qualitative concepts as ‚large‘ are sometimes understood as absolute, sometimes as relative; and thus they run a risk of being misunderstood.“ (Cohen, 1988, S. 12)

	d/g	r/w/ ϕ	η^2	f
klein	± 0.2	± 0.1	0.01	0.10
mittel	± 0.5	± 0.3	0.06	0.25
groß	± 0.8	± 0.5	0.14	0.40

Basierend auf Cohen (1988), wobei dieser spezifisch für d , r und f die Größen angab. Die anderen Größen sind entsprechend umgerechnet.

Mittelwertsunterschiede (modern)

Für Mittelwertsunterschiede wird die populationsbezogene Effektgröße definiert als

$$\delta = \frac{\mu_A - \mu_B}{\sigma},$$

Für Stichproben ergibt sich entsprechend

$$d = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\hat{\sigma}},$$

mit der gepoolten Standardabweichung

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2}}.$$

Da d in endlichen Stichproben leicht nach oben verzerrt ist (Hedges, 1981), wird häufig die Korrektur nach Hedges verwendet:

$$g = J(df) \cdot d \quad \text{mit} \quad J(df) \approx 1 - \frac{3}{4df - 1}.$$

Für zwei unabhängige Stichproben gilt $df = n_A + n_B - 2$, für Einstichproben- und abhängige Stichproben $df = n - 1$. Für eine Stichprobe gegen eine vorgegebene Konstante c gilt

$$d = \frac{\bar{x} - c}{\hat{\sigma}}, \quad g = J(df) \cdot d.$$

Für abhängige Stichproben gilt mit D als Differenzwerten

$$d = \frac{\bar{D}}{\hat{\sigma}_D}, \quad g = J(df) \cdot d.$$

Mittelwertsunterschiede (historisch)

Nach Cohen (1988, Formel 2.2.1) ist die populationsbezogene Effektgröße definiert als

$$d = \frac{m_A - m_B}{\sigma},$$

wobei Cohen m für Populationsmittelwerte nutzt. Inhaltlich entspricht dies der modernen Schreibweise mit δ statt d .

Für Stichproben definiert Cohen (1988, Formel 2.5.1) den Schätzer

$$d_s = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{s},$$

mit

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_A - \bar{x}_A)^2 + \sum (x_B - \bar{x}_B)^2}{n_A + n_B - 2}}.$$

Diese Formulierung ist algebraisch äquivalent zur modernen Darstellung über die gepoolte Varianz. Cohen (1988) verweist bereits auf die Ergebnisse von Hedges (1981), nach denen d_s leicht nach oben verzerrt ist.

ANOVA

US

$$\eta^2 = \frac{QS_{zw}}{QS_{ges}}$$

$$\eta_p^2 = \frac{QS_{zw}}{QS_{zw} + QS_{Fehler}}$$

AS

$$\eta^2 = \frac{QS_{zw}}{QS_{ges}}$$

$$\eta_p^2 = \frac{QS_{zw}}{QS_{zw} + QS_{res}}$$

mehrfaktoriell

$$\eta^2 = \frac{QS_{Effekt}}{QS_{ges}}$$

$$\eta_p^2 = \frac{QS_{Effekt}}{QS_{Effekt} + QS_{inn}}$$

Kontrast-Analyse

$$r_{\text{effectsize}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(\lambda_i - \bar{\lambda})}{s_x \cdot s_\lambda}$$

$$r_{\text{contrast}}^2 = \frac{QS_{\text{Kontrast}}}{QS_{\text{Kontrast}} + QS_{\text{inn}}}$$

$$r_{\text{alerting}} = \frac{\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})(\lambda_j - \bar{\lambda})}{s_{\bar{x}} \cdot s_\lambda}$$

$$r_{\text{alerting}}^2 = \frac{QS_{\text{Kontrast}}}{QS_{\text{zw}}}$$

$$d_{\text{contrast}} = \frac{\bar{L}}{\hat{\sigma}_L}$$

$$g_{\text{contrast}} = J(\text{df}) \cdot d_{\text{contrast}}$$

Zusammenhang der drei Maße:

$$r_{\text{effectsize}} = \frac{r_{\text{contrast}}}{\sqrt{1 - r_{\text{contrast}}^2 + r_{\text{contrast}}^2 / r_{\text{alerting}}^2}}$$

mit $r_{\text{effectsize}} \leq r_{\text{alerting}}$ und $r_{\text{effectsize}} \leq r_{\text{contrast}}$ (Gleichheit $r_{\text{effectsize}} = r_{\text{contrast}}$ nur bei $r_{\text{alerting}} = 1$).

Effektgrößen aus Effektgrößen

Abstandsmaße aus Abstandsmaßen

$$d = \frac{g}{J(\text{df})}$$

$$g = J(\text{df}) \cdot d$$

Korrelationen aus Abstandsmaßen

$$r = \frac{d}{\sqrt{d^2 + \frac{\text{df}}{(n_A + n_B) \cdot p \cdot q}}}$$

$$r = \frac{\frac{g}{J(\text{df})}}{\sqrt{\left(\frac{g}{J(\text{df})}\right)^2 + \frac{\text{df}}{(n_A + n_B) \cdot p \cdot q}}}$$

Ohne Stichprobengrößen, approximativ mit $p = q = 0.5$ und $\text{df} \approx n_A + n_B$ (z. B. Cohen, 1988, Formel 2.26).

$$r \approx \frac{d}{\sqrt{d^2 + 4}}$$

Abstandsmaße aus Korrelationen

$$d = \frac{r}{\sqrt{1 - r^2}} \cdot \sqrt{\frac{(n_A + n_B) \cdot \text{df}}{n_A \cdot n_B}}$$

$$g = J(\text{df}) \cdot d$$

Ohne Stichprobengrößen, approximativ mit $p = q = 0.5$ und $\text{df} \approx n_A + n_B$.

$$d \approx \frac{2r}{\sqrt{1 - r^2}}$$

wobei

$$p = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

und

$$q = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

Sonstiges

Cohens f (aus η^2 , für Poweranalysen):

$$f = \sqrt{\frac{\eta^2}{1 - \eta^2}}$$

t-Test: Einstichprobenfall

$$d = \frac{t}{\sqrt{n}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

t-Test: US

$$d = t_{US} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

$$r = \sqrt{\frac{t_{US}^2}{t_{US}^2 + df}}$$

Letzteres gilt auch für F , wenn df_{zw} 1 sind, da in diesem Fall $F = t^2$.

Vereinfachung, wenn $n_A = n_B$:

$$d = \frac{2 \cdot t_{US}}{\sqrt{n_A + n_B}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

t-Test: AS

$$d = \frac{t_{AS}}{\sqrt{n}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

$$r = \sqrt{\frac{t_{AS}^2}{t_{AS}^2 + df}} \quad (df = n - 1)$$

Hinweis: d und r beziehen sich hier auf die Differenzwerte und sind nicht direkt mit den between-subjects-Maßen (US-Fall, $d \leftrightarrow r$ -Umrechnung) vergleichbar.

Kontrastanalyse US

aus F -Test

$$r_{\text{effectsize}} = \sqrt{\frac{F_{\text{Kontrast}}}{F_{zw} \cdot df_{zw} + df_{inn}}}$$

$$r_{\text{contrast}} = \sqrt{\frac{F_{\text{Kontrast}}}{F_{\text{Kontrast}} + df_{inn}}} = \sqrt{\frac{t_{\text{Kontrast}}^2}{t_{\text{Kontrast}}^2 + df}}$$

Kontrastanalyse AS

aus t-Test

$$d = \frac{t}{\sqrt{n}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

 χ^2 -Tests

$$w = \sqrt{\sum_{i=1}^k \frac{(P_{b,i} - P_{e,i})^2}{P_{e,i}}}$$

aus Ergebnis χ^2 -Test:

$$w = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$$

aus 2 dichotomen Variablen

$$w = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}} = \phi$$

ANOVA

US

$$\eta_p^2 = \frac{F \cdot df_{zw}}{F \cdot df_{zw} + df_{inn}}$$

Bei einfaktorieller ANOVA gilt: $\eta_p^2 = \eta^2$.

Odds Ratio (OR)

$$OR = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

	Krankheit	Keine Krankheit
Risikofaktor	a	b
Ohne Risikofaktor	c	d

Gewichteter Mittelwert

an der Stichprobengröße N gewichtet (Vereinfachung, nicht die Standardmethode):

$$\bar{\theta}_N = \frac{\sum_i N_i \theta_i}{\sum_i N_i}$$

Inverse-Varianz-Gewichtung:

$$\bar{\theta}_{IV} = \frac{\sum_i W_i \theta_i}{\sum_i W_i}, \quad W_i = \frac{1}{V_i}$$

$$SE(\bar{\theta}) = \sqrt{\frac{1}{\sum_i W_i}}$$

Varianz von d und g

$$Var(d) \approx \frac{n_A + n_B}{n_A n_B} + \frac{d^2}{2(n_A + n_B)}$$

$$Var(g) = J^2 Var(d), \quad SE(g) = J \cdot SE(d)$$

mit $SE = \sqrt{Var}$ und J (Bias-Korrektur, siehe Effektgrößen).

Fisher- z (für Korrelationen)

$$z = \operatorname{artanh}(r) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}, \quad r = \tanh(z)$$

$$V_z \approx \frac{1}{n-3}, \quad W_i = n_i - 3$$

Modell und Heterogenität

Fixed-Effects: $W_i = \frac{1}{V_i}$; Random-Effects: $W_i^* = \frac{1}{V_i + \tau^2}$

$$Q = \sum_i W_i (\theta_i - \bar{\theta})^2, \quad Q_{H_0} = df = k - 1$$

$$I^2 = \frac{Q - df}{Q} \cdot 100\%$$

Hinweis: Unter der H_0 folgt Q einer χ^2 -Verteilung, sodass der Erwartungswert den Freiheitsgraden entspricht.

Wahrscheinlichkeitstheorie

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B wird notiert als $P(A|B)$ und berechnet sich durch:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Hierbei ist $P(A \cap B)$ die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl A als auch B eintreten.

Additionssatz der Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der Ereignisse A oder B eintritt, ergibt sich zu:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Sind A und B *disjunkt* (d. h. $A \cap B = \emptyset$), so gilt die *Summenregel*:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Allgemeines Inklusions-Exklusions-Prinzip

Für drei Ereignisse A , B und C gilt:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - [P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)] \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Das Prinzip verallgemeinert sich für n Ereignisse abwechselnd mit Addition und Subtraktion der Schnittwahrscheinlichkeiten aller k -fachen Überlappungen.

Produktregel

Aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit folgt:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Alternativ kann die Produktregel auch in umgekehrter Reihenfolge geschrieben werden:

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

Stochastische Unabhängigkeit

Zwei Ereignisse A und B heißen *stochastisch unabhängig*, wenn das Eintreten des einen keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des anderen hat:

$$P(A|B) = P(A) \quad \text{bzw.} \quad P(B|A) = P(B)$$

Dann folgt unmittelbar:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit


Sei $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ eine Zerlegung des Ergebnisraums in paarweise disjunkte Ereignisse mit $P(B_i) > 0$. Dann gilt:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

Wahrscheinlichkeitsrevision (Bayes)

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(A^c) \cdot P(B|A^c)}$$

Messaxiome fürs Intervallskalenniveau lassen sich teilweise durch ein Conjoint-Measurement-Experiment prüfen. Hierbei geht man davon aus, dass $P = f(A, X)$ wobei f eine nicht-interaktive Funktion ist. Geprüft werden müssen die einfache Aufhebung (single cancellation) und die doppelte Aufhebung (double cancellation). Single cancellation erfordert, dass innerhalb jeder Zeile und innerhalb jeder Spalte die Ordnung der Präferenzen konsistent ist. Die Doppelaufhebung beschränkt die möglichen Ordnungen der Matrix. Wenn alle Spalten und Zeilen bereits geordnet sind, lässt sich über folgende Visualisierung die Doppelaufhebung prüfen. Hierbei entsprechen die Pfeile dem $\leq$ -Zeichen. Dünne Pfeile zwischen den Zellen repräsentieren die Antezedenz-Ordnungsbeziehungen, dicke Pfeile repräsentieren die Konsequenz-Ordnungsbeziehung.



Funktion	Verteilung	Parameter
<code>dnorm</code>	Normalverteilung	<code>x</code> , <code>mean</code> , <code>sd</code>
<code>pnorm</code>	Normalverteilung	<code>q</code> , <code>mean</code> , <code>sd</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>qnorm</code>	Normalverteilung	<code>p</code> , <code>mean</code> , <code>sd</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>rnorm</code>	Normalverteilung	<code>n</code> , <code>mean</code> , <code>sd</code>
<code>dbinom</code>	Binomialverteilung	<code>x</code> , <code>size</code> , <code>prob</code>
<code>pbinom</code>	Binomialverteilung	<code>q</code> , <code>size</code> , <code>prob</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>qbinom</code>	Binomialverteilung	<code>p</code> , <code>size</code> , <code>prob</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>rbinom</code>	Binomialverteilung	<code>n</code> , <code>size</code> , <code>prob</code>
<code>dt</code>	t-Verteilung	<code>x</code> , <code>df</code> , <code>ncp</code>
<code>pt</code>	t-Verteilung	<code>q</code> , <code>df</code> , <code>ncp</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>qt</code>	t-Verteilung	<code>p</code> , <code>df</code> , <code>ncp</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>rt</code>	t-Verteilung	<code>n</code> , <code>df</code> , <code>ncp</code>
<code>df</code>	F-Verteilung	<code>x</code> , <code>df1</code> , <code>df2</code> , <code>ncp</code>
<code>pf</code>	F-Verteilung	<code>q</code> , <code>df1</code> , <code>df2</code> , <code>ncp</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>qf</code>	F-Verteilung	<code>p</code> , <code>df1</code> , <code>df2</code> , <code>ncp</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>rf</code>	F-Verteilung	<code>n</code> , <code>df1</code> , <code>df2</code> , <code>ncp</code>

Präfix	Erklärung
<code>d</code>	Dichtefunktion: Berechnet die Wahrscheinlichkeitsdichte (z. B. $f(x)$)
<code>p</code>	Verteilungsfunktion: Berechnet die kumulierte Wahrscheinlichkeit (z. B. $P(X \leq x)$)
<code>q</code>	Quantilfunktion: Berechnet den Wert x , sodass $P(X \leq x) = p$
<code>r</code>	Zufallszahlengenerator: Generiert Zufallswerte aus der Verteilung

Parameter	Erklärung
<code>x</code>	Werte, an denen die Dichte berechnet wird
<code>q</code>	Quantile
<code>p</code>	Wahrscheinlichkeiten
<code>n</code>	Anzahl der zu generierenden Zufallswerte
<code>mean</code>	Mittelwert der Verteilung
<code>sd</code>	Standardabweichung
<code>size</code>	Anzahl der Versuche
<code>prob</code>	Erfolgswahrscheinlichkeit
<code>df</code>	Freiheitsgrade
<code>df1</code>	Freiheitsgrade des Zählers (F-Verteilung)
<code>df2</code>	Freiheitsgrade des Nenners (F-Verteilung)
<code>ncp</code>	Nichtzentralitätsparameter (optional)
<code>lower.tail</code>	Logisch; wenn TRUE (Standard), werden Wahrscheinlichkeiten $P[X \leq x]$ berechnet
<code>log.p</code>	Logisch; wenn TRUE, werden Wahrscheinlichkeiten als Log-Werte ausgegeben

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. Aufl.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Cohen, J. (1962). The statistical power of abnormal-social psychological research: A review. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 65(3), 145–153. <https://doi.org/10.1037/h0045186>
- Hedges, L. V. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. *Journal of Educational Statistics*, 6(2), 107–128. <https://doi.org/10.3102/10769986006002107>
- Sedlmeier, P., & Renkewitz, F. (2024). *Forschungsmethoden und Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler* (4. Aufl.). Pearson Studium. <https://www.pearson.de/forschungsmethoden-und-statistik-fuer-psychologen-und-sozialwissenschaftler-9783868944594>