

- 1. Task (Score: 12.0 / 12.0)

Lab 5

- 1. 提交作業之前，建議可以先點選上方工具列的**Kernel**，再選擇**Restart & Run All**，檢查一下是否程式跑起來都沒有問題，最後記得儲存。
- 2. 請先填上下方的姓名(name)及學號(stduent_id)再開始作答，例如：

```
name = "我的名字"
student_id= "B06201000"
```

- 3. 演算法的實作可以參考lab-5 (<https://yuanyuyuan.github.io/itcm/lab-5.html>), 有任何問題歡迎找助教詢問。
- 4. **Deadline: 12/11(Wed.)**

In [1]:

```
name = "馬宗儀"
student_id = "b06201006"
```

(Top)

Exercise 3

Analyse the convergence properties of the Jacobi and Gauss-Seidel methods for the solution of a linear system whose matrix is

\$\$\left[\begin{matrix}

```
\alpha &0 &1\\
0 &\alpha &0\\
1 &0 &\alpha
\end{matrix}\right],
\quad
\alpha \in \mathbb{R}.
```

By lecture slide: it hold for $\alpha \neq 0$, Let $D = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$

then for Jacobi methods, it converge for $\rho(G) < 1$ where $G = -D^{-1}(L + U)$, then $\rho(G) = \frac{1}{\alpha^2}$ ie. $\alpha > 1$

for Gauss-Seidel metohs, it converge for $\rho(G) < 1$ where $G = -(L + D)^{-1}U$, then $\rho(G) = \frac{1}{\alpha^2}$ ie. $\alpha > 1$

In []: