

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA



Ubicación Espacial

CURSO:
Estadística Espacial

DOCENTE:
Ing. Fred Torres Cruz

PRESENTADO POR:
Jose Carlos Iquise Pari

SEMESTRE:
X - B

PUNO-PERÚ
2026



Índice

1. Interpretación de mapas sobre uso de plaguicidas en el Perú	2
1.1. Uso correcto de plaguicidas	2
1.2. Equipo de protección personal para la aplicación de plaguicidas	3
1.3. Manejo de envases vacíos de plaguicidas	4
2. URL de Portafolio de Curso (Github)	4

1. Interpretación de mapas sobre uso de plaguicidas en el Perú

El análisis espacial de las siguientes figuras permite identificar patrones regionales en las prácticas agrícolas relacionadas con el uso de plaguicidas a nivel departamental en el Perú.

1.1 Uso correcto de plaguicidas:




Figura 1: Porcentaje de uso correcto de plaguicidas por departamento (P321B)

La Figura 1 muestra la distribución espacial del porcentaje de agricultores que aplican correctamente los plaguicidas. Los departamentos de la costa sur y parte de la sierra presentan los valores más altos (cerca del 100%), representados con tonos rojos intensos. En contraste, los departamentos de la selva y sierra norte registran porcentajes menores, indicados con tonos amarillos y anaranjados. Este patrón sugiere una correlación entre la región geográfica y el nivel de capacitación agrícola recibida.

1.2 Equipo de protección personal para la aplicación de plaguicidas:




Figura 2: Tipo de equipo de protección más utilizado por departamento (P325B)

La Figura 2 representa el equipo de protección personal predominante en cada departamento durante la aplicación de plaguicidas. Se observa que el uso de **mascarilla** (color verde) es la práctica más frecuente en la selva y sierra norte, mientras que los **guantes** (color azul) predominan en la costa y sierra sur. Esta heterogeneidad espacial refleja diferencias regionales en las normas de seguridad agrícola y en el acceso a equipos de protección adecuados.

1.3 Manejo de envases vacíos de plaguicidas:




Figura 3: Tipo de manejo de envases vacíos de plaguicidas por departamento (P326B)

La Figura 3 ilustra las prácticas de disposición de envases vacíos de plaguicidas. La **quema o incineración** (color rojo) constituye la práctica predominante en la mayor parte del territorio nacional, lo que representa un riesgo ambiental y para la salud pública significativo. El **entierro** (color azul) se concentra en algunos departamentos costeros. La distribución espacial de estas prácticas evidencia la necesidad de intervenciones diferenciadas por región para promover un manejo adecuado de residuos agroquímicos.

2. URL de Portafolio de Curso (Github)

Enlace de Portafolio

Mi Portafolio)