Stat-based joint prior over 27 role combos, per human env (shaded column = env's optimal combo; rows share stats, so curves repeat)

τ = 4.053 (Two types) · τ = 4.621 (Per-person ε_i, Beta prior) · τ = 4.638 (Mixed posterior) · τ = 5.535 (Unmixed P_N) · τ = 1 (reference)

411_141_114__FFM
P(optimal FFM): fitted τ 0.057–0.064 (1.55–1.73× uniform); τ=1 0.037 (1.01×)

411_141_114__FTF
P(optimal FTF): fitted τ 0.057–0.064 (1.55–1.73× uniform); τ=1 0.037 (1.01×)

411_141_114__FTM
P(optimal FTM): fitted τ 0.099–0.134 (2.67–3.62× uniform); τ=1 0.752 (20.31×)

411_222_222__FFT
P(optimal FFT): fitted τ 0.051–0.057 (1.39–1.54× uniform); τ=1 0.101 (2.73×)

411_222_222__FMM
P(optimal FMM): fitted τ 0.051–0.057 (1.39–1.54× uniform); τ=1 0.101 (2.73×)

411_222_222__FTM
P(optimal FTM): fitted τ 0.051–0.057 (1.39–1.54× uniform); τ=1 0.101 (2.73×)

141_222_222__MFF
P(optimal MFF): fitted τ 0.027–0.030 (0.73–0.81× uniform); τ=1 0.005 (0.14×)

141_222_222__TFF
P(optimal TFF): fitted τ 0.051–0.057 (1.39–1.54× uniform); τ=1 0.101 (2.73×)

141_222_222__TFM
P(optimal TFM): fitted τ 0.051–0.057 (1.39–1.54× uniform); τ=1 0.101 (2.73×)

114_222_222__FFF
P(optimal FFF): fitted τ 0.027–0.030 (0.73–0.81× uniform); τ=1 0.005 (0.14×)

114_222_222__MFT
P(optimal MFT): fitted τ 0.051–0.057 (1.39–1.54× uniform); τ=1 0.101 (2.73×)

114_222_222__MMM
P(optimal MMM): fitted τ 0.051–0.057 (1.39–1.54× uniform); τ=1 0.101 (2.73×)

222_222_222__FFF
P(optimal FFF): fitted τ 0.037–0.037 (1.00–1.00× uniform); τ=1 0.037 (1.00×)

222_222_222__FFT
P(optimal FFT): fitted τ 0.037–0.037 (1.00–1.00× uniform); τ=1 0.037 (1.00×)

222_222_222__FTM
P(optimal FTM): fitted τ 0.037–0.037 (1.00–1.00× uniform); τ=1 0.037 (1.00×)

joint prior

τ=1: 0.75 ↑

uniform 1/27

FFF FFT FFM FTF FTT FTM FMF FMT FMM TFF TFT TFM TTF TTT TTM TMF TMT TMM MFF MFT MFM MTF MTT MTM MMF MMT MMM