Bryologická exkurze do přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou (Nízký Jeseník)

Bryological field trip to the Suchá Dora Nature Reserve near Jakubčovice nad Odrou village in the Nízký Jeseník highland

Zbyněk Hradílek

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 27, CZ-783 71 Olomouc; e-mail: zbynek.hradilek@upol.cz

Abstract: A bryological field trip to the Suchá Dora Nature Reserve near the village of Jakubčovice nad Odrou in the Nízký Jeseník highland (Silesia, Czech Republic) took place on September 16, 2023. In total, 52 taxa of bryophytes (4 liverworts and 48 mosses) were recorded. The protected area, situated on a steep northern slope, includes sections of old herb-rich beech forests and ravine forests. This field trip represented the first systematic bryological survey of this locality. Common forest species predominated in our findings, with the most noteworthy discoveries being *Orthotrichum patens* and *Jochenia pallescens*.

Keywords: bryophytes, Czech Republic, liverworts, mosses, Silesia

Taxonomické pojetí a nomenklatura: Kučera et al. (2012)

V sobotu 16. září 2023 se za přítomnosti čtyř zájemců uskutečnila bryologická exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS do přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou pod vedením Zbyňka Hradílka.

Přírodní rezervace Suchá Dora leží na strmém severním svahu vrchu Suchá (578 m n. m.) 1,56 až 2,33 km ZJZ od železniční stanice v Jakubčovicích nad Odrou, při ústí hluboce zaříznutého údolí říčky Suché. Prakticky celá rezervace je porostlá lesem a při jejím západním okraji je nevelký lom. Na svahu se střídají pruhy starších lesních porostů s mladšími, přičemž převažuje květnatá bučina s menšími suťovými lesy. Nejstarší porosty jsou asi 170 let staré a leží v nich relativně hodně tlejícího dřeva. Nejhojněji je zastoupený buk lesní, dále jsou přítomné javory, lípy, jilm horský a habr. Geologické podloží tvoří břidlice a droby kulmu, které hojně vycházejí na povrch a místy tvoří svahové sutě (Peichlová 2008).

V rezervaci bylo již brzy po vyhlášení v roce 2009 omezeno lesní hospodaření a některé plochy jsou vedeny jako bezzásahové. To se příznivě projevilo v mykoflóře chráněného území (J. Kocián, osobní sdělení).

Z rezervace je jen velmi málo údajů o mechorostech. Pocházejí z lesnického typologického průzkumu z 60., 70. a 90. let minulého století (J. Togner, J. Král, J. Holuša in AOPK ČR 2023). Jde jen o čtyři druhy: bezvlásku vlnkatou (*Atrichum undulatum*; obr. 2), trněnku Zetterstedtovu (*Eurhynchium angustirete*; v lesnické typologické databázi jako *E. striatum*), měřík příbuzný (*Plagiomnium affine*) a ploník ztenčený (*Polytrichum for-*







Obr. 1. Zářez lesní cesty s porostem běžných druhů mechorostů při vstupu do rezervace. – Obr. 2. Bezvláska vlnkatá (*Atrichum undulatum*), zástupce snadno poznatelných mechů. – Obr. 3. Zpeřenka tamaryšková (*Thuidium tamariscinum*). – Foto P. Kocián (1–2), M. Pražák (3)

mosum). Také J. Duda, který se velmi zevrubně věnoval játrovkám Nízkého Jeseníku, zřejmě jen prošel údolím pod rezervací a ve stávajícím chráněném území játrovky nesbíral. Svědčí o tom jeho mapky rozšíření játrovek Nízkého Jeseníku (Duda 1983, 1984a,b, 1985, 1986). Velmi pravděpodobně tedy účastníci exkurze provedli první soustavnější průzkum mechorostů PR Suchá Dora. Pochopitelně se nejedná o podrobný inventarizační průzkum ve smyslu metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ale vzhledem k jednotvárnosti geologického podloží a charakteru vegetace (mecho-

rosty až tak citlivě nereagují na změny lesních společenstev na pár desítkách metrů, spíše odrážejí substrátové možnosti a přítomnost různých mikrostanovišť) nalezené mechorosty jistě představují dostatečně reprezentativní vzorek tamní bryoflóry.

Vlastní průzkum jsme začali ve starém lomu při severozápadním okraji rezervace. Tam rostly vesměs běžné druhy jako rokyt cypřišovitý pravý (*Hypnum cupressiforme* var. *cupressiforme*), r. vřesovitý (*H. jutlandicum*), lesklec dutolistý (*Plagiothecium cavifolium*), baňatka obecná (*Brachythecium rutabulum*), b. topolová (*Sciuro-hypnum populeum*), ale na javoru klenu na začátku lomu rostl také ne zcela běžný epifyt – šurpek otevřený (*Orthotrichum patens*). Ten jsme pak našli ještě jednou ve starém bukovém porostu dále na trase. Od lomu jsme pokračovali napříč svahem stále vzhůru směrem ke starému porostu ve východní části rezervace. Při cestě rostl na kořeni buku další zajímavý mech – pilolistec bledý [*Jochenia pallescens* (Hedw.) Hedenäs, Schlesak & D. Quandt]. Ve starém porostu na východě chráněného území jsme se otočili a o něco výše ve svahu směřovali zpět k západnímu okraji až ke strži potůčku, který tvoří západní hranici rezervace.

Bryoflóra byla i vzhledem ke geologickému podloží (kulmové horniny) poměrně jednotvárná, ale mechy byly v lese dobře viditelné a sympaticky dotvářely vcelku příjemný dojem ze starého lesního porostu. Bohaté polštáře na stinných sutích vytvářela krásná zpeřenka tamaryšková (*Thuidium tamariscinum*; obr. 3), přičemž na jednom místě hned vedle ní rostl na pohled podobně vypadající rokytník skvělý (*Hylocomium splendens*). Překvapivě jsme našli čtyři zástupce našich krondlovek (rod *Fissidens*), což je pro tak malé území docela neobvyklé. Celkem jsme na území PR Suchá Dora zaznamenali 52 taxony mechorostů (4 játrovky a 48 mechů). Z nich pouze *Orthotrichum patens* je považovaný za taxon s nižším stupněm ohrožení (kategorie LR-nt). V červeném seznamu mechorostů České republiky (Kučera et al. 2012) je uveden také druh *Jochenia pallescens* (pod jménem *Hypnum pallescens*) v kategorii taxonů vyžadujících pozornost (LC-att). Exkurze proběhla v souladu s výjimkou ze základních ochranných podmínek PR Suchá Dora udělenou Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Orgánu ochrany přírody tímto děkujeme.

Použité zdroje

AOPK ČR (2023): Nálezová databáze ochrany přírody [online]. – URL: https://portal.nature.cz/nd/ (navštíveno 5. 11. 2023).

Duda J. (1983): Játrovky Nízkého Jeseníku a přilehlých území. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 257–269.

Duda J. (1984a): Játrovky Nízkého Jeseníku a přilehlých území – 2. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 33: 43–60.

Duda J. (1984b): Játrovky Nízkého Jeseníku a přilehlých území – 3. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 33: 233–240.

Duda J. (1985): Játrovky Nízkého Jeseníku a přilehlých území – 4. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 34: 245–249.

Duda J. (1986): Játrovky Nízkého Jeseníku a přilehlých území – 5. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 35: 43–55.

Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. – Preslia 84: 813–850.
Peichlová L. (2008): Plán péče o PR Suchá Dora na období 2010–2022. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].

Příloha č. 1 – Seznam nalezených taxonů

(sestavil Z. Hradílek)

Nálezy označené (ZH) jsou dokladovány v soukromém herbáři Z. Hradílka.

Seznam lokalit

75. Jesenické podhůří, 6372b, Jakubčovice nad Odrou (distr. Nový Jičín): PR Suchá Dora 1,56 km až 2,33 km ZJZ od železniční stanice v Jakubčovicích nad Odrou, 49°41'24,6"N, 17°45'51,3"E (střed lokality), 358–524 m n. m.

játrovky

Chiloscyphus profundus;
Metzgeria furcata;
Plagiochila porelloides;
Radula complanata.

mechy

Amblystegium serpens (ZH); *Anomodon attenuatus*; *Atrichum undulatum*;
Brachytheciastrum velutinum; *Brachythecium rutabulum*; *B. salebrosum*; *Bryum moravicum*;
Dicranella heteromalla; *D. rufescens* (ZH); *Dicranum montanum*; *D. scoparium*;
Eurhynchium angustirete;
Fissidens bryoides (ZH); *F. crispus* Mont. (ZH); *F. dubius* var. *dubius* (ZH); *F. taxifolius* (ZH);
Homalia trichomanoides; *Hylocomium splendens*; *Hypnum andoi*; *H. cupressiforme* var. *cupressiforme* (ZH); *H. cupressiforme* var. *filiforme* (ZH); *H. jutlandicum* (ZH);
Isothecium alopecuroides;
Jochenia pallescens (Hedw.) Hedenäs, Schlesak & D. Quandt (LC-att);
Mnium stellare (ZH);
Orthotrichum affine var. *affine* (ZH); *O. diaphanum*; *O. pallens* (ZH); *O. patens* (LR-nt) (ZH); *O. pumilum* (ZH); *O. speciosum* (ZH); *O. stramineum* (ZH);
Plagiomnium affine (ZH); *P. cuspidatum*; *P. undulatum*; *Plagiothecium cavifolium* (ZH); *P. denticulatum* var. *denticulatum* (ZH); *Platygyrium repens*; *Pohlia* sp.; *Pogonatum aloides*; *Polytrichum formosum*; *Pterigynandrum filiforme*;
Rhizomnium punctatum;
Schistidium apocarpum s. str. (ZH); *Sciuro-hypnum populeum* (ZH);
Taxiphyllum wissgrillii (ZH); *Thuidium tamariscinum*;
Ulota bruchii.