

# 04\_functions

August 29, 2019

Notas de aula: Mecânica Quântica, Autor: Jonas Maziero, Departamento de Física, UFSM

In [1]: %run init.ipynb

## 1 Funções matriciais de matrizes

Já vimos algumas funções escalares de operadores/matrizes, como por exemplo o determinante, o traço, o produto interno, a norma, etc. Aqui veremos como devemos proceder para calcular funções de operadores que nos retornam operadores, como por exemplo  $\log(\cdot)$ ,  $\exp(\cdot)$ ,  $\sqrt{\cdot}$ , etc.

*OBS.* A primeira observação que deve-se fazer nesse tópico é que nossa intuição de como aplicar funções matriciais em matrizes está, em geral, errada, i.e., se  $A = (A_{j,k})$ , em geral

$$f(A) \neq (f(A_{j,k})). \quad (1)$$

### 1.0.1 Definição de $f(A)$

Seja  $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  um operador linear e seja

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \left( \frac{1}{j!} \frac{d^j f(x)}{dx^j} \right) x^j \quad (2)$$

a expansão em série de Taylor para a função escalar  $f(x)$ . A função  $f$  tendo operadores lineares como argumento é calculada substituindo-se, na série de Taylor, o escalar  $x$  pelo operador linear correspondente. ##### Exemplo Como  $e^x = \sum_{j=0}^{\infty} x^j / j! = 1 + x + x^2/2 + x^3/3! + \dots$ , teremos

$$e^A = \mathbb{I}_{\mathcal{H}} + A + \frac{A^2}{2} + \frac{A^3}{3!} + \dots, \quad (3)$$

onde  $A^j$  é a composição de  $A$  por  $j$  vezes.

**Exemplo** Para  $\{\sigma_j\}_{j=1}^3$  sendo as matrizes de Pauli e  $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$ , definimos

$$\vec{n} \cdot \vec{\sigma} := \sum_{j=1}^3 n_j \sigma_j. \quad (4)$$

Para o resultado que provaremos na sequência, utilizaremos a seguinte identidade:

$$(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = \sum_{j=1}^3 n_j \sigma_j \sum_{k=1}^3 n_k \sigma_k = \sum_{j,k=1}^3 n_j n_k \sigma_j \sigma_k \quad (5)$$

$$= \sum_{j,k=1}^3 n_j n_k (\delta_{j,k} \sigma_0 + \text{sgn}(j,k,l) i \sigma_l) \quad (6)$$

$$= \sum_{j=1}^3 n_j^2 \sigma_0 + \sum_{j \neq k} n_j n_k \text{sgn}(j,k,l) i \sigma_l \quad (7)$$

$$= \|\vec{n}\|^2 \sigma_0 + n_1 n_2 \text{sgn}(1,2,3) i \sigma_3 + n_2 n_1 \text{sgn}(2,1,3) i \sigma_3 \quad (8)$$

$$+ n_1 n_3 \text{sgn}(1,3,2) i \sigma_2 + n_3 n_1 \text{sgn}(3,1,2) i \sigma_2 + n_2 n_3 \text{sgn}(2,3,1) i \sigma_1 + n_3 n_2 \text{sgn}(3,2,1) i \sigma_1 \quad (9)$$

$$= \|\vec{n}\|^2 \sigma_0 + (n_1 n_2 - n_2 n_1) i \sigma_3 + (-n_1 n_3 + n_3 n_1) i \sigma_2 + (n_2 n_3 - n_3 n_2) i \sigma_1 \quad (10)$$

$$= \|\vec{n}\|^2 \sigma_0. \quad (11)$$

Agora, para  $\|\vec{n}\| = 1$ ,  $\theta \in \mathbb{R}$  e  $\sigma_0 = \mathbb{I}_{\mathbb{C}_2}$ , usamos a série de Taylor para a exponencial e  $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = \|\vec{n}\|^2 \sigma_0$  para obter:

$$e^{i\theta \vec{n} \cdot \vec{\sigma}} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\theta \vec{n} \cdot \vec{\sigma})^j}{j!} \quad (12)$$

$$= \sigma_0 + i\theta \vec{n} \cdot \vec{\sigma} + \frac{(i\theta \vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2}{2!} + \frac{(i\theta \vec{n} \cdot \vec{\sigma})^3}{3!} + \frac{(i\theta \vec{n} \cdot \vec{\sigma})^4}{4!} + \frac{(i\theta \vec{n} \cdot \vec{\sigma})^5}{5!} + \dots \quad (13)$$

$$= \sigma_0 + i\theta \vec{n} \cdot \vec{\sigma} - \frac{\theta^2 \sigma_0}{2!} - \frac{i\theta^3 \vec{n} \cdot \vec{\sigma}}{3!} + \frac{\theta^4 \sigma_0}{4!} + \frac{i\theta^5 \vec{n} \cdot \vec{\sigma}}{5!} + \dots \quad (14)$$

$$= \sigma_0 \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) + i\vec{n} \cdot \vec{\sigma} \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \quad (15)$$

$$= \sigma_0 \cos \theta + i\vec{n} \cdot \vec{\sigma} \sin \theta. \quad (16)$$

### 1.0.2 Fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff

Para  $c \in \mathbb{C}$  e  $A, B \in L(\mathcal{H})$  segue que

$$e^{cB} A e^{-cB} = A + c[B, A] + \frac{c^2}{2!} [B, [B, A]] + \frac{c^3}{3!} [B, [B, [B, A]]] + \dots \quad (17)$$

Vamos verificar essa igualdade expandindo a exponencial em série de Taylor:

$$e^{cB} A e^{-cB} = \left( \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(cB)^j}{j!} \right) A \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-cB)^k}{k!} \right) \quad (18)$$

$$= \left( \mathbb{I} + cB + \frac{c^2 B^2}{2} + \frac{c^3 B^3}{3!} + \dots \right) A \left( \mathbb{I} - cB + \frac{c^2 B^2}{2} - \frac{c^3 B^3}{3!} + \dots \right) \quad (19)$$

$$= A + cBA - cAB + \frac{c^2 B^2}{2} A + A \frac{c^2 B^2}{2} - \frac{2}{2} cBAcB - \frac{c^2 B^2}{2} AcB + cBA \frac{c^2 B^2}{2} + \frac{c^3 B^3}{3!} A - A \frac{c^3 B^3}{3!} + \dots \quad (20)$$

$$= A + c[B, A] + \frac{c^2}{2} (BBA + ABB - 2BAB) + \frac{c^3}{3!} (BBBA - ABBA + 3BABB - 3BBAB) + \dots \quad (21)$$

$$= A + c[B, A] + \frac{c^2}{2} (B(BA - AB) + (AB - BA)B) + \frac{c^3}{3!} (BB(BA - AB) - (AB - BA)BB + 2B(ABB - BAB)) + \dots \quad (22)$$

$$= A + c[B, A] + \frac{c^2}{2} (B[B, A] - [B, A]B) + \frac{c^3}{3!} (BB[B, A] + [B, A]BB - 2B[B, A]B) + \dots \quad (23)$$

$$= A + c[B, A] + \frac{c^2}{2} [B, [B, A]] + \frac{c^3}{3!} (B(B[B, A] - [B, A]B) + ([B, A]B - B[B, A])B) + \dots \quad (24)$$

$$= A + c[B, A] + \frac{c^2}{2} [B, [B, A]] + \frac{c^3}{3!} (B[B, [B, A]] - [B, [B, A]B] + \dots) \quad (25)$$

$$= A + c[B, A] + \frac{c^2}{2!} [B, [B, A]] + \frac{c^3}{3!} [B, [B, [B, A]]] + \dots \quad (26)$$

### 1.0.3 Exemplo

Para

$$A = \sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B = \sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad (27)$$

temos

$$[\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y \text{ e } [\sigma_z, \sigma_y] = -2i\sigma_x. \quad (28)$$

Assim

$$e^{c\sigma_z}\sigma_x e^{-c\sigma_z} = \sigma_x + c[\sigma_z, \sigma_x] + \frac{c^2}{2}[\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_x]] + \frac{c^3}{3!}[\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_x]]] \quad (29)$$

$$+ \frac{c^4}{4!}[\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_x]]]] + \frac{c^5}{5!}[\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_x]]]]] + \dots \quad (30)$$

$$= \sigma_x + c2i\sigma_y + \frac{c^2}{2}2i[\sigma_z, \sigma_y] + \frac{c^3}{3!}2i[\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_y]] + \frac{c^4}{4!}2i[\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_y]]] + \frac{c^5}{5!}2i[\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_y]]]] + \dots \quad (31)$$

$$= \sigma_x + c2i\sigma_y - \frac{c^2}{2}4i^2\sigma_x - \frac{c^3}{3!}4i^2[\sigma_z, \sigma_x] - \frac{c^4}{4!}4i^2[\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_x]] - \frac{c^5}{5!}4i^2[\sigma_z, [\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_x]]] + \dots \quad (32)$$

$$= \sigma_x + c2i\sigma_y - \frac{(2ic)^2}{2}\sigma_x - \frac{c^3}{3!}8i^3\sigma_y - \frac{c^4}{4!}8i^3[\sigma_z, \sigma_y] - \frac{c^5}{5!}8i^3[\sigma_z, [\sigma_z, \sigma_y]] + \dots \quad (33)$$

$$= \sigma_x + c2i\sigma_y - \frac{(2ic)^2}{2}\sigma_x - \frac{c^3}{3!}8i^3\sigma_y + \frac{c^4}{4!}16i^4\sigma_x + \frac{c^5}{5!}16i^4[\sigma_z, \sigma_x] + \dots \quad (34)$$

$$= \sigma_x + c2i\sigma_y - \frac{(2ic)^2}{2}\sigma_x - \frac{(2ic)^3}{3!}\sigma_y + \frac{(2ic)^4}{4!}\sigma_x + \frac{(2ic)^5}{5!}\sigma_y + \dots \quad (35)$$

$$= \sigma_x \left( 1 - \frac{(2ic)^2}{2!} + \frac{(2ic)^4}{4!} + \dots \right) + \sigma_y \left( 2ci - \frac{(2ic)^3}{3!} + \frac{(2ic)^5}{5!} + \dots \right) \quad (36)$$

$$= \sigma_x \cos(2ic) + \sigma_y \sin(2ic). \quad (37)$$

**Exercício:** Utilize a fórmula de BCH para calcular  $e^{c\sigma_x}\sigma_y e^{-c\sigma_x}$ .

#### 1.0.4 Definição de $f(A)$ para operadores normais

Se  $A = \sum_a aP_a$  é a decomposição espectral do operador linear, então suas funções podem ser calculadas usando

$$f(A) := \sum_a f(a)P_a, \quad (38)$$

ou seja, atuamos a função nos autovalores.

Vamos verificar que **essa definição é equivalente à anterior**. Como mostrado por Taylor, se decomposmos uma função escalar qualquer em termos de potências de  $x$ :

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j, \quad (39)$$

os coeficientes são dados como na série de Maclaurin, i.e.,  $c_j = \frac{1}{j!} \frac{d^j f(x)}{dx^j}$ . Assim, como

$$A^j = AAA \dots = \sum_a aP_a \sum_{a'} a'P_{a'} \sum_{a''} a''P_{a''} \dots \quad (40)$$

$$= \sum_{a, a', a'', \dots} aa'a'' \dots P_a P_{a'} P_{a''} \dots \quad (41)$$

$$= \sum_{a, a', a'', \dots} aa'a'' \dots \delta_{aa'} \delta_{a'a''} \dots P_a \quad (42)$$

$$= \sum_a a^j P_a, \quad (43)$$

teremos que

$$f(A) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j A^j \quad (44)$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} c_j \sum_a a^j P_a \quad (45)$$

$$= \sum_a \left( \sum_{j=0}^{\infty} c_j a^j \right) P_a \quad (46)$$

$$= \sum_a f(a) P_a. \quad (47)$$

### Exemplo

$$e^A = \mathbb{I}_{\mathcal{H}} + A + \frac{A^2}{2} + \frac{A^3}{3!} + \dots \quad (48)$$

$$= \sum_a P_a + \sum_a a P_a + \frac{\sum_a a P_a \sum_{a'} a' P_{a'}}{2} + \frac{\sum_a a P_a \sum_{a'} a' P_{a'} \sum_{a''} a'' P_{a''}}{3!} + \dots \quad (49)$$

$$= \sum_a P_a + \sum_a a P_a + \frac{\sum_{a,a'} a a' P_a P_{a'}}{2} + \frac{\sum_{a,a',a''} a a' a'' P_a P_{a'} P_{a''}}{3!} + \dots \quad (50)$$

$$= \sum_a P_a + \sum_a a P_a + \frac{\sum_a a^2 P_a}{2} + \frac{\sum_a a^3 P_a}{3!} + \dots \quad (51)$$

$$= \sum_a \left( 1 + a + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3!} + \dots \right) P_a \quad (52)$$

$$= \sum_a e^a P_a. \quad (53)$$

**Exercício:** Verifique a equivalência entre as definições acima usando a série de Taylor para  $\sqrt{A}$ .

**Exemplo de aplicação** Considere a matrix densidade  $\rho = \sum_r r P_r$ , com  $P_r$  sendo projetores 1D. A entropia de von Neumann dessa matriz é definida e dada por:

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log(\rho)) \quad (54)$$

$$= -\text{Tr}(\rho \log(\sum_r r P_r)) \quad (55)$$

$$= -\text{Tr}((\sum_{r'} r' P_{r'}) (\sum_r \log(r) P_r)) \quad (56)$$

$$= -\text{Tr}(\sum_{r',r} r' \log(r) P_{r'} P_r) \quad (57)$$

$$= -\text{Tr}(\sum_{r',r} r' \log(r) \delta_{rr'} P_r) \quad (58)$$

$$= -\sum_r r \log(r) \text{Tr}(P_r) \quad (59)$$

$$= -\sum_r r \log(r) \sum_{r'} (\langle r' |, P_r(|r' \rangle)) \quad (60)$$

$$= -\sum_r r \log(r) \sum_{r'} (\langle r' |, \langle r | r' \rangle | r \rangle) \quad (61)$$

$$= -\sum_r r \log(r). \quad (62)$$

**Exercício:** Para  $H = \sum_h h P_h$ , com  $P_h$  um projetor 1D e  $\beta \in \mathbb{R}$ , calcule a expressão para o estado térmico de Gibbs:

$$\rho_g = \frac{e^{-\beta H}}{Z}. \quad (63)$$

Use  $\text{Tr}(\rho_g) := 1$  para obter a expressão da função de partição, que é o escalar  $Z$  nessa equação.

## 1.1 Teorema (forma exponencial para operadores unitários)

Seja  $H : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  um operador Hermitiano e  $\theta \in \mathbb{R}$ , então

$$U := e^{i\theta H} \quad (64)$$

é um operador unitário. ### Prova Se  $H = \sum_h h P_h$ . Então  $i\theta H = \sum_h i\theta h P_h$ . Assim

$$U = e^{i\theta H} = \sum_h e^{i\theta h} P_h \quad (65)$$

e

$$U^\dagger = \sum_h (e^{i\theta h})^* P_h^\dagger = \sum_h e^{-i\theta h} P_h. \quad (66)$$

Por conseguinte,

$$UU^\dagger = \sum_h e^{i\theta h} P_h \sum_{h'} e^{-i\theta h'} P_{h'} \quad (67)$$

$$= \sum_{h,h'} e^{i\theta(h-h')} P_h P_{h'} \quad (68)$$

$$= \sum_h P_h \quad (69)$$

$$= \mathbb{I}_{\mathcal{H}}, \quad (70)$$