

Componente Curricular: Biologia
Professor(a): Croti
Assunto(s): Ciclos Reprodutivos das Plantas Terrestres

Data: 17/06/2026
Série: 2ª




1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
R!
R!

1. (UNITINS) A alternância de gerações, ou metagênese, é um tipo de ciclo de vida encontrado nas plantas e em alguns grupos de animais. A expressão “alternância” se aplica somente quando o estágio haploide multicelular se alterna com

A) estágio diploide unicelular.
B) estágio haploide unicelular.
C) estágio haploide multicelular.
D) estágio diploide multicelular.
E) estágio diploide multicelular ou unicelular.

2. (UDESC) Assinale a alternativa que apresenta características de plantas gimnospermas.

A) são espermatófitas e possuem sementes protegidas pelo fruto.
B) Apresentam rizoide, cauloide e sementes.
C) Não apresentam vasos condutores.
D) Possuem flor, filoide e órgão reprodutor escondido.
E) São vasculares traqueófitas e suas sementes são “nuas”. Não produzem frutos.

3. Texto para a próxima questão:

A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses, alemães, italianos e de outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que outros povos, anteriores aos citados, protagonizaram a nossa história.
Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar o nosso povo nativo, o “índio”, foi selecionada a área temática CULTURA e as questões foram construídas com base na obra ‘Os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul’ (Custódio, L.A.B., organizador. Santa Cruz do Sul: EDUNISC; IPHAN, 2004).

“Os habitantes das florestas subtropicais sobreviviam da coleta de plantas, da caça e da pesca realizada através de lanças.”

“Faziam parte da alimentação desses habitantes, frutas (designação geral para fruto comestível, geralmente adocicado) e pinhões.”

No texto destacado, o pinhão não foi considerado um fruto, porque

A) se desenvolve do ovário de Araucária, sem que haja, no entanto, fecundação.
B) esse é um texto para leigos – na verdade, se o pinhão contém o embrião, é considerado um fruto.
C) o verdadeiro fruto é a pinha, não o pinhão.
D) o pinhão, na verdade, é apenas uma semente.
E) o fruto da Araucária se desenvolve após a germinação das sementes.

4. (UFRGS - adaptada) A *Araucaria angustifolia*, gimnosperma nativa da região sul do Brasil, produz anualmente cerca de 80 cones femininos, cada um originando, em média, 90 pinhões.
Com base nessas informações, preencha as lacunas a seguir.

As plantas femininas das araucárias produzem _____, cada um deles originando muitos pinhões. O pinhão corresponde _____, que é constituído(a) por casca, _____ e _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente essas lacunas, na ordem em que aparecem.

A) megásporos; ao fruto; ovário; gametófito feminino.
B) estróbilos; à semente; embrião; gametófito feminino.
C) estróbilos; ao fruto; semente; embrião.
D) megasporângios; à inflorescência; embrião; tegumento.
E) megásporos; à semente; zigoto; cone.

5. (UPF) Na reprodução dos vegetais com sementes, ocorre a denominada dupla fecundação. Isso significa que

A) as células envolvidas na reprodução dividem-se duas vezes consecutivamente, para formarem o embrião diploide.
B) um dos núcleos espermáticos junta-se ao núcleo da oosfera e forma o embrião (2n); o outro núcleo espermático funde-se aos dois núcleos polares, resultando no endosperma (3n).
C) cada núcleo espermático sofre duas divisões e cada uma das quatro células resultantes fecundará uma célula da oosfera.
D) o núcleo da oosfera é fecundado por dois núcleos espermáticos do pólen.
E) um dos núcleos espermáticos, ao juntar-se ao núcleo da oosfera, forma um embrião (3n), enquanto o outro junta-se a um dos núcleos polares e dá origem ao endosperma (2n).

6. (UFPR) Atualmente, as angiospermas dominam o ambiente terrestre. Para isso, essas plantas desenvolveram, ao longo do processo evolutivo, características que lhes permitiram colonizar os diferentes biomas terrestres.
Identifique, nas características listadas a seguir, aquelas que foram importantes para o desenvolvimento do atual processo reprodutivo das angiospermas.

1. Fase gametofítica masculina reduzida.
2. Presença de elementos traqueais, como os elementos de vasos e respectivas placas de perfuração.
3. Presença de cutícula – uma estrutura de revestimento – que é uma substância graxa, de composição química de natureza complexa.
4. O produto da reprodução sexuada é protegido pelo fruto.
5. Desenvolvimento da estrutura floral, concomitante com o processo de polinização biótica.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
B) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.
D) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
E) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.

7. (Fuvest) Ao longo da evolução das plantas, os gametas

A) tornaram-se cada vez mais isolados do meio externo e, assim, protegidos.
B) tornaram-se cada vez mais expostos ao meio externo, o que favorece o sucesso da reprodução.
C) mantiveram-se morfologicamente iguais em todos os grupos.
D) permaneceram independentes de água, para transporte e fecundação, em todos os grupos.
E) apareceram no mesmo grupo no qual também surgiram os tecidos vasculares como novidade evolutiva.

1. **BRIÓFITAS**
2. Fecundação
3. Gametófito masculino
4. Gametófito feminino
5. Oosfera
6. Anterozoide
7. Fecundação
8. Zigoto
9. Embrião
10. Esporófito / Esporos

11. **PTERIDÓFITAS**
12. Esporófito
13. Soros com esprângios
14. Esporos
15. Gametófito hermafrodita (Prótalo)
16. Anterozoides
17. Oosfera
18. Fecundação
19. Esporófito jovem

20. **GIMNOSPERMAS**
21. Esporófito
22. Megaestróbilo
23. Megásporo funcional
24. Gametófito feminino
25. Oosfera
26. Microestróbilo
27. Micrósporos
28. Gametófito masculinoo (grão de pólen)
29. Polinização / Fecundação
30. Zigoto
31. Embrião
32. Gametófito feminino
33. Megasporângio + tegumento
34. Semente

1. **ANGIOSPERMAS**
2. Esporófito
3. Carpelo
4. Estigma
5. Estilete
6. Ovário
7. Megasporângio
8. Megasporócito
9. Megásporo funcional
10. Gametófito feminino
11. Oosfera
12. Sinérgides
13. Antípodas
14. Célula polar

15. Gametófito feminino
16. Estame
17. Filete
18. Antera
19. Microsporócitos
20. Micrósporos
21. Gametófitos masculinos (grãos de pólen)
22. Células
23. Exina
24. Polinização
25. Tubo polínico
26. Núcleos espermáticos
27. Dupla fecundação
28. Dupla fecundação
29. Zigoto
30. Endosperma
31. Megasporângio + Tegumento
32. Endosperma
33. Embrião
34. Semente
35. Fruto