

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de **recuperação paralela**, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art.18, inciso V).

Componente Curricular: Biologia

Data: 23/10/2025

Professor(a): Croti

Série: 1^a

Assunto(s): Verminoses

Verminoses causadas por Platelmintos

Doença	Agente Etiológico	Transmissão	O que tem?	Sintomas	Tratamento	Profilaxia
Teníase						
Cisticercose						
Esquistossomose						

Verminoses causadas por Nematelmintos

Doença	Agente Etiológico	Transmissão	O que tem?	Sintomas	Tratamento	Profilaxia
Ascaridíase						
Ancilostomíase						
Oxiuríase						
Filariose						

1. (UFV-MG) A comercialização de carne clandestina tem contribuído para o aumento de parasitoses que acometem o ser humano. Destacam-se dentre essas doenças as que são causadas por cestódeos, que poderiam ser evitadas caso medidas preventivas fossem observadas. Entre as diversas medidas que devem ser tomadas, assinale a alternativa CORRETA que apresenta uma medida preventiva, específica para parasitas dessa classe do filo Platyhelminthes:

- A) Examinar visualmente se a carne a ser consumida contém cisticercos.
- B) Evitar que o boi ou o porco bebam água contaminada por miracídeos.
- C) Não comprar carne clandestina, que pode conter larvas de ancilóstomo.
- D) Verificar se a carne suína ou bovina contém cistos de cercaria grávidos.
- E) Inspeccionar a carne em busca de ovos de *Fasciola hepatica*.


2. (PUC-Campinas) O amarelão é uma verminose que pode ser causada por *Ancylostoma duodenale* ou por *Necator americanus*. A pessoa infectada torna-se fraca e desanimada, com uma palidez típica. O hemograma revela quantidades de hemácias abaixo do normal, devido

- A) à destruição de hemácias circulantes pelas enzimas dos vermes.
- B) às lesões na parede intestinal que provocam hemorragias.
- C) ao excesso de produção de glóbulos brancos.
- D) às lesões que os vermes causam no fígado e no baço.
- E) ao bloqueio da produção de hemácias pelo sistema imunológico.

3. (Famerp) A *Taenia solium*, o *Ascaris lumbricoides* e o *Ancylostoma duodenale* são algumas espécies de helmintos parasitas que provocam doenças nos seres humanos. Esses animais helmintos apresentam adaptações ao parasitismo, dentre elas,

- A) ausência de substâncias antigênicas.
- B) cobertura dérmica impermeável.
- C) alta produção de ovos.
- D) ausência de tubo digestório.
- E) autofecundação.

4.



No ciclo de vida do animal ilustrado acima, os humanos podem assumir o papel de hospedeiro intermediário. Essa situação pode ocorrer, se o homem

- A) ingerir carne malcozida.
- B) nadar em águas contaminadas pelo verme adulto.
- C) ingerir os ovos embrionados do verme.
- D) andar descalço e a larva penetrar ativamente pela sua pele.
- E) beber água contaminada pela larva do animal.

5. (UFG) A incidência de verminoses em geral pode ser reduzida por meio de medidas de saneamento e de orientação às populações carentes, no sentido de evitar o lançamento de seus dejetos diretamente no solo ou nos cursos d'água. No entanto, a eficiência dos métodos de prevenção depende do conhecimento de particularidades no ciclo de cada parasita para que o bloqueio ocorra antes do desenvolvimento de formas infectantes para o homem. No caso da esquistossomose, constitui medida profilática importante

- A) a drenagem de reservatórios de água e a aplicação de substâncias químicas para evitar o desenvolvimento de cercárias no hospedeiro.
- B) a ingestão de alimentos higienizados e bem cozidos, para evitar a contaminação por proglotes, que se alojam no intestino delgado do hospedeiro.
- C) os bons hábitos de higiene pessoal, reduzindo a possibilidade de contaminação por embrião hexacanto, que pode alojar-se no músculo do hospedeiro.
- D) a ingestão de água tratada, para evitar o desenvolvimento de larvas capazes de migrarem para diversos órgãos, como pulmões, traqueia e faringe.
- E) a utilização de calçados, para evitar o desenvolvimento de larvas no intestino delgado do hospedeiro, que podem provocar hemorragias.

6. (UFSCar) Uma pessoa vegetariana estrita e que nunca teve contato com água onde vivem caramujos foi diagnosticada como portadora de larvas de tênia encistadas em seu cérebro. Isso é

- A) possível, pois se pode adquirir esse parasita pela ingestão de seus ovos e, nesse caso, as larvas originam cisticercos no cérebro.
- B) possível, pois as larvas infectantes desse parasita desenvolvem-se no solo e penetram ativamente através da pele.
- C) possível, pois esse parasita é transmitido por insetos portadores de larvas infectantes.
- D) pouco provável, pois só se adquire esse parasita pela ingestão de carne contendo larvas encistadas (cisticercos).
- E) pouco provável, pois as larvas infectantes desse parasita desenvolvem-se em caramujos aquáticos.

7. (Vunesp) A imagem mostra uma pessoa contaminada com uma parasitose, que ocorre principalmente na região Nordeste do Brasil.



(www3.nd.edu)

É correto afirmar que essa parasitose é causada por uma espécie de

- A) microfilária, que bloqueia os vasos sanguíneos causando o vazamento do plasma.
- B) bactéria que pode ser transmitida pela picada de mosquitos do gênero *Anopheles*.
- C) protozoário, que bloqueia os vasos linfáticos causando o vazamento de linfa.
- D) nematelminto e pode ser transmitida pela picada de mosquitos do gênero *Culex*.
- E) platelminto e pode ser transmitida pela picada de mosquitos do gênero *Culex*.

8. (Unifesp) Agentes de saúde pretendem fornecer um curso para moradores em áreas com alta ocorrência de tênias (*Taenia solium*) e esquistossomos (*Schistosoma mansoni*). A ideia é prevenir a população das doenças causadas por esses organismos.

- a) Em qual das situações é necessário alertar a população para o perigo do contágio direto, pessoa a pessoa? Justifique.
- b) Cite duas medidas – uma para cada doença – que dependem de infraestrutura criada pelo poder público para preveni-las.

9. (Objetivo) A filariose é uma doença mais frequente em regiões tropicais, inclusive no Brasil, e é causada por vermes.

- a) Qual é o agente causador?
- b) Qual é o agente transmissor?
- c) Que sistema do organismo é afetado?
- d) Qual é a consequência?

GABARITO

1.A 2.B 3.C 4.C 5.A 6.A 7.D

8a. Na área com maior incidência de tênia, pois a ingestão de ovos de *Taenia solium* pode causar cisticercose humana.

8b. A prevenção da transmissão da doença causada pelas tênia pode ser realizada através da inspeção nos frigoríficos com a finalidade de evitar a comercialização de carne com cisticercos (larvas de tênia); A prevenção da doença causada por esquistossomos pode ser realizada através do investimento em rede de coleta e tratamento de esgotos, evitando a proliferação dos ovos de esquistossomos no ambiente.

9a. O verme conhecido como filária (*Wuchereria bancrofti*).

9b. O mosquito 'corcundinha' (*Culex*).

9c. A filariose afeta o sistema linfático.

9d. Ocorre inchaço progressivo na região afetada.