



QUESTIONNAIRE 2L

#01/12
v3
2026-04-29

PREMIÈRE CONSULTATION POUR RACHIS LOMBAIRE

DURÉE CHIR ≈ 30 secondes

Patient · Tablette · 80%

Chirurgien · Ordi · 20%

Quels sont les examens d'imagerie disponible(s) pour faire le diagnostic ? QCM

RADIO

SCANNER

IRM

EOS

Voir la sous question

NIVEAU DIAGNOSTIC LOMBAIRE PRINCIPALE QCM

L5S1

L4L5

L3L4

L2L3

L1L2

Ajouter une sous question

DIAGNOSTIC LOMBAIRE NEUROLOGIQUE PRINCIPALE QCM

Non NEURO

Avec déficit NEURO :

Voir les 3 sous questions

DIAGNOSTIC LOMBAIRE QUI EXPLIQUE LA SYMPTOMATOLOGIE PRINCIPALE QCM

Liste des réponses

Voir les 15 sous questions

PROJET THERAPEUTIQUE LOMBAIRE QCM

Liste des réponses

Ajouter une sous question

Lésion associée sur l'imagerie QCM

Hernie discale lombaire

Sténose lombaire centrale

Sténose lombaire foraminale

Discopathie

SPL dégen

SPL par lyse

Scoliose

Voir la sous question

LE PATIENT A DÉJÀ TOUT FAIT SUR LA TABLETTE

- Motif, trajet, symptômes, côté, ancienneté
- Traitements déjà entrepris, antécédents, médicaments
- EVA dos / EVA jambe (0 à 10)

TOI, TU AS 4 DÉCISIONS À PRENDRE

1. Imagerie disponible (ex : IRM, EOS)
2. Niveau diagnostic (ex : L4L5)
3. Diagnostic neurologique (avec ou sans déficit)
4. Diagnostic qui explique la symptomatologie (HD, sténose, SPL, SPD...)

4

4 DÉCISIONS. 30 SECONDES.

Le patient a fait le reste.

DÉCISIONS

POURQUOI CE QUESTIONNAIRE 2L CHANGE TOUT

C'EST LE TO DE CHAQUE PATIENT. SANS LUI, AUCUNE COMPARAISON POST-OP N'EST POSSIBLE.

- Le PROJET THÉRAPEUTIQUE est la variable cible de toutes nos études (médicale vs chirurgicale).
- Toutes les études en cours en dépendent.
- Sans le 2L de référence, le patient n'entre dans aucune étude SRC.

POSITION DANS TON PARCOURS PATIENT – LOMBAIRE

1D

▶ 2L

ODI

NON OPÉRÉ

8L · Suivi médical

OPÉRÉ

4L

5L

6a

6b

1M

3M

6M

1A

2A