



QUESTIONNAIRE 2L

#01/12
v4
2026-04-29

PREMIÈRE CONSULTATION POUR RACHIS LOMBAIRE

DURÉE CHIR ≈ 30 secondes

Patient · Tablette · 80%

Chirurgien · Ordi · 20%

Quels sont les examens d'imagerie disponible(s) pour faire le diagnostic ? QCM	NIVEAU DIAGNOSTIC LOMBAIRE PRINCIPALE QCM
RADIO SCANNER IRM EOS	L5S1 L4L5 L3L4 L2L3 L1L2
Voir la sous question	Ajouter une sous question
DIAGNOSTIC LOMBAIRE NEUROLOGIQUE PRINCIPALE QCM	DIAGNOSTIC LOMBAIRE QUI EXPLIQUE LA SYMPTOMATOLOGIE PRINCIPALE QCM
Non NEURO Avec déficit NEURO :	Liste des réponses
Voir les 3 sous questions	Voir les 15 sous questions
PROJET THERAPEUTIQUE LOMBAIRE QCM	Lésion associée sur l'imagerie QCM
Liste des réponses	Hernie discale lombaire Sténose lombaire centrale Sténose lombaire foraminale
Ajouter une sous question	Discopathie SPL dégen SPL par lyse Scoliose
	Voir la sous question

LE PATIENT A DÉJÀ TOUT FAIT SUR LA TABLETTE

- Motif, trajet, symptômes, côté, ancienneté
- Traitements déjà entrepris, antécédents, médicaments
- EVA dos / EVA jambe (0 à 10)

TOI, TU AS 4 DÉCISIONS À PRENDRE

- 1. Imagerie disponible (ex : IRM, EOS)
- 2. Niveau diagnostic (ex : L4L5)
- 3. Diagnostic neurologique (avec ou sans déficit)
- 4. Diagnostic qui explique la symptomatologie (HD, sténose, SPL, SPD...)

4

4 DÉCISIONS. 30 SECONDES.

Le patient a fait le reste.

DÉCISIONS

POURQUOI CE QUESTIONNAIRE 2L CHANGE TOUT

C'EST LE TO DE CHAQUE PATIENT. SANS LUI, AUCUNE COMPARAISON POST-OP N'EST POSSIBLE.

- Le PROJET THÉRAPEUTIQUE est la variable cible de toutes nos études (médicale vs chirurgicale).
- Toutes les études en cours en dépendent.
- Sans le 2L de référence, le patient n'entre dans aucune étude SRC.

1D

▶ 2L

ODI

NON OPÉRÉ ↗

8L · Suivi médical

OPÉRÉ ↘

4L

5L

6a

6b

1M

3M

6M

1A

2A