

QUESTIONNAIRE 2L

PREMIÈRE CONSULTATION POUR RACHIS LOMBAIRE

#01/12
v6
2026-04-29

DURÉE CHIR ≈ 30 secondes

Patient · Tablette · 80%

Chirurgien · Ordi · 20%

Quels sont les examens d'imagerie disponible(s) pour faire le diagnostic ? QCM ☐ RADIO ☐ SCANNER ☐ IRM ☐ EOS Voir la sous question	NIVEAU DIAGNOSTIC LOMBAIRE PRINCIPALE QCM ☐ L5S1 ☐ L4L5 ☐ L3L4 ☐ L2L3 ☐ L1L2 Ajouter une sous question
DIAGNOSTIC LOMBAIRE NEUROLOGIQUE PRINCIPALE QCU ☐ Non NEURO ☐ Avec déficit NEURO : Voir les 3 sous questions	DIAGNOSTIC LOMBAIRE QUI EXPLIQUE LA SYMPTOMATOLOGIE PRINCIPALE QCM Liste des réponses Voir les 15 sous questions
PROJET THERAPEUTIQUE LOMBAIRE QCM Liste des réponses Ajouter une sous question	Lésion associée sur l'imagerie QCM ☐ Hernie discale lombaire ☐ Sténose lombaire centrale ☐ Sténose lombaire foraminale ☐ Discopathie ☐ SPL dégen ☐ SPL par lyse ☐ Scoliose Voir la sous question

LE PATIENT A DÉJÀ TOUT FAIT SUR LA TABLETTE

- Motif, trajet, symptômes, côté, ancienneté
- Traitements déjà entrepris, médicaments
- EVA dos / EVA jambe (0 à 10)
- ODI

TOI, TU AS 4 DÉCISIONS À PRENDRE

- 1. Imagerie disponible (ex : IRM, EOS)
- 2. Niveau diagnostic (ex : L4L5)
- 3. Diagnostic neurologique (avec ou sans déficit)
- 4. Diagnostic qui explique la symptomatologie (HD, sténose, SPL, SPD...)

4

DÉCISIONS

4 DÉCISIONS → 30 SECONDES

Le patient a fait le reste.

POURQUOI CE QUESTIONNAIRE 2L CHANGE TOUT

C'EST LE TO DE CHAQUE PATIENT. SANS LUI, AUCUNE COMPARAISON POST-OP N'EST POSSIBLE.

- Le PROJET THÉRAPEUTIQUE est la variable cible de toutes nos études (médicale vs chirurgicale).
- Toutes les études en cours en dépendent.
- Sans le 2L de référence, le patient n'entre dans aucune étude SRC.

POSITION DANS TON PARCOURS PATIENT – LOMBAIRE

1D **2L** ODI

NON OPÉRÉ ↗ 8L · Suivi médical

OPÉRÉ ↘ 4L 5L 6a 6b 1M 3M 6M 1A 2A

