

MAT 108 HW 5

Hardy Jones

999397426

Professor Bandyopadhyay

Spring 2015

§2.2 13 (c) $A \times B$

$\{(\emptyset, (\emptyset, \{\emptyset\})), (\emptyset, \{\emptyset\}), (\emptyset, (\{\emptyset\}, \emptyset)), (\{\emptyset\}, (\emptyset, \{\emptyset\})), (\{\emptyset\}, \{\emptyset\}), (\{\emptyset\}, (\{\emptyset\}, \emptyset)), (\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, (\emptyset, \{\emptyset\})), (\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset\}), (\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, (\{\emptyset\}, \emptyset))\}$
 $B \times A$

$\{((\emptyset, \{\emptyset\}), \emptyset), ((\emptyset, \{\emptyset\}), \{\emptyset\}), ((\emptyset, \{\emptyset\}), \{\emptyset, \{\emptyset\}\}), (\{\emptyset\}, \emptyset), (\{\emptyset\}, \{\emptyset\}), (\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}), ((\{\emptyset\}, \emptyset), \emptyset), ((\{\emptyset\}, \emptyset), \{\emptyset\}), ((\{\emptyset\}, \emptyset), \{\emptyset, \{\emptyset\}\})\}$

(d) $A \times B$

$\{((2, 4), (4, 1)), ((2, 4), (2, 3)), ((3, 1), (4, 1)), ((3, 1), (2, 3))\}$

$B \times A$

$\{((4, 1), (2, 4)), ((4, 1), (3, 1)), ((2, 3), (2, 4)), ((2, 3), (3, 1))\}$

17 We're asked to show that $(a, b) = (x, y)$ iff $a = x$ and $b = y$.

Proof.

$$\begin{aligned}
 (a, b) = (x, y) &\iff \{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{x\}, \{x, y\}\} \\
 &\iff (\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \{\{x\}, \{x, y\}\}) \\
 &\quad \wedge (\{\{x\}, \{x, y\}\} \subseteq \{\{a\}, \{a, b\}\}) \\
 &\iff (\{a\} \in \{\{x\}, \{x, y\}\}) \\
 &\quad \wedge (\{a, b\} \in \{\{x\}, \{x, y\}\}) \\
 &\quad \wedge (\{x\} \in \{\{a\}, \{a, b\}\}) \\
 &\quad \wedge (\{x, y\} \in \{\{a\}, \{a, b\}\}) \\
 &\iff (\{a\} = \{x\}) \wedge (\{a, b\} = \{x, y\}) \\
 &\iff (a = x) \wedge (b = y)
 \end{aligned}$$

Since we have connected both sides with a series of bi-conditional statements, we have proven that:

$(a, b) = (x, y)$ iff $a = x$ and $b = y$. □

18 (a) *Proof.*

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = (B - A) \cup (A - B) = B \Delta A$$

□

(b) This proof is a bit longer than the others.

Proof.

$$\begin{aligned}
A \Delta B &= (A - B) \cup (B - A) \\
&= \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\} \\
&= \{x \mid [(x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in B] \wedge [(x \in A \wedge x \notin B) \vee x \notin A]\} \\
&= \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin B \vee x \in B) \\
&\quad \wedge (x \in A \vee x \notin A) \wedge (x \notin B \vee x \notin A)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin B \vee x \notin A)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin B)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge \sim (x \in A \wedge x \in B)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \cup B) \wedge \sim (x \in A \cap B)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \cup B) \wedge (x \notin A \cap B)\} \\
&= (A \cup B) - (A \cap B)
\end{aligned}$$

□

(c) *Proof.*

$$A \Delta A = (A - A) \cup (A - A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

□

(d) *Proof.*

$$A \Delta \emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$$

□

§2.3 1 (f)
 (h)
 (j)

12

15 (e)
 (f)

16

17 (c)
 (d)

§2.4 6 (i)
 (k)

7 (l)
 (m)

8 (h)

12 (b)