


뇌졸중 데이터 eda


1. 결측치 / 이상치

① 흡연칼럼




- 결측치인 'unknown'이 대부분을 차지함을 알 수 있음. 결측치 부분 제거.

② 성별칼럼




- 'other'이라는 이상치가 존재. 개수가 하나이기때문에 제거.

③ bmi 칼럼의 결측치




- bmi중에서 201개의 결측치가 있다는 것을 알 수 있음. 결측치 제거.

④ bmi 칼럼의 이상치




2. 불균형 데이터



- 뇌졸중에 걸린 사람들이 소수이고 뇌졸중에 걸리지 않은 사람들이 다수인 불균형 데이터이
기때문에 언더샘플링 혹은 오버샘플링을 통해서 해결해야한다.


3. 전체적인 분포

① 나이 칼럼




- 50~80에 보통 뇌졸중 걸린 사람이 몰려있음을 알 수 있음.

② 성별칼럼




- 여성이 남성보다 상대적으로 뇌졸중이 걸린 사람이 많다는것을 알 수 있다.

③ 고혈압 칼럼




- 고혈압이 아닌 사람들이 뇌졸중에 상대적으로 많이 걸린것을 알 수 있다.

④ 심장병 칼럼




- 심장병에 걸리지 않은 사람들이 뇌졸중에 상대적으로 많이 걸린것을 알 수 있다.

⑤ 결혼칼럼




- 결혼을 하지 않은 사람들이 뇌졸중에 상대적으로 많이 걸려있음을 알 수 있다.

⑥ 직업칼럼




- 직업을 가지고 있는 사람들 중 뇌졸중에 걸린 사람의 명수가 사기업>사업>공무원 순서임을 알 수 있다.

⑦ 거주지역 칼럼




- 도시에 사는 사람들이 상대적으로 시골에 사는 사람들보다 뇌졸중에 많이 걸린것을 알 수 있다.

⑧ 흡연여부 칼럼




- 흡연여부에서 뇌졸중에 걸린 사람의 명수가 한 번도 담배를 핀 적 없는 사람>전에 담배를 찢던 사람>흡연자 순서임을 알 수 있다.

⑨ 혈당수치 칼럼



- 뇌졸중에 걸리지 않은 사람들이 혈당수치가 전체적으로 낮다는 것을 알 수 있다.

⑩ BMI 칼럼



- 뇌졸중에 걸린 사람이 BMI에서 비만의 기준인 30이상 부문에 몰려있음을 알 수 있다.