


뇌졸중 위험군 분류 후 예방의 필요성



[출처: 2021년 사망원인통계, 통계청]

-> 뇌졸중이 포함된 뇌혈관 질환이 사망 원인 4위에 올랐다는 것을 알 수 있음.

지 유형으로 구분하여 분석한 결과, 전체적으로 출혈성 뇌졸중 환자의 사망률이 당일사망 0.7%, 30일 이내 사망 18.9%, 90일 이내 사망 23.0%, 365일 이내 사망 28.8%, 그리고 5년 이내 사망 38.5%로 경색성 뇌졸중 환자의 당일사망 0.2%, 30일 이내 사망 7.4%, 90일 이내 사망 11.6%, 365일 이내 사망 19.4%, 5년 이내 사망 35.2%보다 높게 나타났다.

[출처: 뇌졸중 환자의 사망 추적연구, 대한의사협회지, 2011년]

-> 다른 질병들의 사망률과 비교하면서 뇌졸중의 높은 사망률을 부각

인지기능 장애는 뇌졸중 환자의 12~56%에서 광범위하게 발생하고 있으며, 적절한 치료에도 불구하고 3명 중 한 명은 지속적인 인지기능장애를 보인다(Duncan et al., 2002). 인지기능의 변화가 뇌졸중으로 치료받는 대상자에게 미치는 부정적 영향 중 특별히 유의해서 보아야 할 것은 감소된 인지 기능이 환자의 재활치료를 방해한다는 사실이다(Delisa, 1988). 그 이유는 뇌졸중 발병 후 인지기능 장애가 재활 치료에 있어 필수적인 명령수행과 학습능력을 저하시켜 재활을 어렵게 만 들고, 재활치료과정에서의 중도포기를 야기하는데 중요한 요 인으로 작용하기 때문이다(Kim, Oh, & Lee, 1997).

[출처: 뇌졸중 환자의 인지기능, 질병의 심각도 및 장애 정도가 일상생활수행능력에 미치는 영향, 재활간호학회지, 2013년]

-> 뇌졸중 발병 후 3명 중 한명은 지속적인 인지 기능장애를 보인다.



Stroke Symptoms

Volunteer

SHOP

DONATE NOW



I WILL Prevent Another Stroke

1 in 4 stroke survivors will have another. Yet up to 80% of strokes may be prevented with a combination of medication and healthy habits, such as healthy diet and physical activity, that can have a big impact.

-> 뇌졸중에 큰 영향을 주는 건강한 습관과 약물의 결합을 통해서 뇌졸중의 80%를 예방할 수 있다고함.

[출처: national stroke association(미국 뇌졸중 협회)]

⇒ 뇌졸중은 높은 사망률, 인지장애 발생, 주요 사망원인이기 때문에 발병 후 치료에 초점을 두는것보다는 위험군을 분류하여 예방을 하는것이 중요하다.