

ממ"ן 14

יונתן אוהיון

3 בדצמבר 2017

שאלה 1

סעיף א

לא נכון. דוגמה נגדית תהיה $f = h, g = k$ (כאשר הפונקציות h, k הן הפונקציות המוגדרות בממון).
נוכל לחשב ולראות ש $h(0) = h(1) = 0$ ולכן היא לא חח"ע, אך גם $(h \circ k)(x) = x$:

$$(h \circ k)(x) = \begin{cases} k(x) & k(x) \leq 0 \\ k(x) - 1 & k(x) > 0 \end{cases} = \begin{cases} x & x \leq 0 \\ x + 1 - 1 & x > 0 \end{cases} = \begin{cases} x & x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases} = x$$

ולכן אם $(f \circ g) = id$, f אינה בהכרח חח"ע כנדרש.

■

סעיף ב

נכון. נניח בשלילה ש g לא חח"ע, כלומר מתקיים

$$\exists a, b \in \mathbb{R}, g(a) = g(b) \wedge a \neq b$$

נפעיל את f על שני הצדדים ונקבל:

$$f(g(a)) = f(g(b)) \equiv (f \circ g)(a) = (f \circ g)(b) \xrightarrow{(f \circ g) = id} a = b$$

בסתירה להנחה. לפיכך, g חח"ע כנדרש.

■

סעיף ג + ד

לא נכון. יהיו $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרות באופן הבא: $f(x) = g(x) = \frac{1}{x}$. שתי הפונקציות לא מוגדרות
בנקודה $x = 0$, ולכן $\text{Im } f \neq \mathbb{R} \wedge \text{Im } g \neq \mathbb{R}$ ולכן לא על. נשים לב ש $(f \circ g) = id$:

$$(f \circ g)(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x$$

נוכל לשים לב שהדוגמה הזאת עובדת גם עבור המקרה הנדרש בסעיף ד, שכן גם $g(x)$ לא על במקרה
זה. לפיכך, אם $(f \circ g) = id$, לא f ולא g בהכרח על כנדרש.

■

שאלה 1 – המשך

סעיף ה

לא נכון. ניתן בתור דוגמה נגדית את אותה הדוגמה מסעיף א. ראשית, נגדיר את פונקציית ההרכבה $k \circ h$:

$$(k \circ h)(x) = \begin{cases} h(x) & h(x) \leq 0 \\ h(x) - 1 & h(x) > 0 \end{cases}$$

אזי $(f \circ g)(x) = (h \circ k)(x) = x$ כפי שהראינו בסעיף א, אך מחישוב נובע $h(0) = h(1) = 0$, ולכן לפי ההגדרה, $(k \circ h)(0) = (k \circ h)(1) = 0$ ולא מתקיים $(k \circ h) = id$ כנדרש.

■

סעיף ו

נכון. נניח ש g על. אזי לפי הנתון מתקיים $f(g(x)) = x \Rightarrow g(f(g(x))) = g(x)$. מכיוון ש g על, לכל $y \in \mathbb{R}$ קיים $x \in \mathbb{R}$ ש $y = g(x)$. לפיכך, לכל y , כלומר $\forall y \in \mathbb{R}, (g \circ f)(y) = y$ כנדרש.

■

שאלה 2

סעיף א

יהי $\varepsilon > 0$. נבחר $\delta = \frac{1}{\pi}$. לפיכך, מתקיים

$$0 < \left| x - \frac{2}{\pi} \right| < \delta \Rightarrow x \in N_\delta^* \left(\frac{2}{\pi} \right) = \left(\frac{1}{\pi}, \frac{3}{\pi} \right)$$

לכן:

$$\frac{1}{x} \in \left(\frac{\pi}{3}, \pi \right) \wedge \frac{1}{x} \neq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin \frac{1}{x} \in \left(0, \sin \frac{\pi}{3} \right) \wedge \sin \frac{1}{x} \neq 1 \quad (= \sin \frac{\pi}{2})$$

ולכן $\sin \frac{1}{x} < 1$ ובפרט $0 < \sin \frac{1}{x} < 1$ (בטווח זה, $\sin x > 0$) ולכן

$$\forall x \in N_\delta^* \left(\frac{2}{\pi} \right), \quad \lfloor \sin \frac{1}{x} \rfloor = 0 \Rightarrow \left| \lfloor \sin \frac{1}{x} \rfloor \right| = 0 \Rightarrow \left| \lfloor \sin \frac{1}{x} \rfloor \right| < \varepsilon$$

לכל $\varepsilon > 0$ ולכן $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \frac{2}{\pi}} 0$ כנדרש.

■

סעיף ב

נסמן: $f(x) = \sqrt{2x - \sin 3x}$. יהי $M_1 \in \mathbb{R}$. נבחר $M_2 = \frac{M_1^2 + 1}{2}$. אזי:

$$\begin{aligned} x > M_2 &\Rightarrow x > \frac{M_1^2 + 1}{2} \\ \sin x \leq 1 \text{ נימוק: } &\Rightarrow x > \frac{M_1^2 + \sin 3x}{2} \\ &\Rightarrow 2x > M_1^2 + \sin 3x \\ &\Rightarrow 2x - \sin 3x > M_1^2 \\ &\Rightarrow \sqrt{2x - \sin 3x} > M_1 \Rightarrow f(x) > M_1 \end{aligned}$$

לכן, לפי הגדרה 4.55, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$ כנדרש.

■

שאלה 3

סעיף א1

נכתוב את ההגדרה בכתוב כמתים:

$$p = \exists L \in \mathbb{R} \forall 0 < \varepsilon \exists M \in \mathbb{R} \forall M < x, |f(x) - L| < \varepsilon$$

נשלול:

$$\neg p = \forall L \in \mathbb{R} \exists 0 < \varepsilon \forall M \in \mathbb{R} \exists M < x, |f(x) - L| \geq \varepsilon$$

ובעברית: לכל $L \in \mathbb{R}$, קיים $0 < \varepsilon$ כך שלכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $M < x$ כך ש $|f(x) - L| \geq \varepsilon$.

שאלה 4

סעיף א

נחשב את הגבול:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x} \\ &= \frac{1}{1 + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x}\end{aligned}$$

$$\text{משפט 4.45} = \frac{1}{1 + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x}$$

$$\text{טענה 4.44} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

וחישבו את הגבול כנדרש.

■

טענות עזר

נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, כי $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$ וכי $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

ראשית, נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$: יהי $M_1 \in \mathbb{R}$ ונבחר $M_2 = M_1$. לפיכך, לכל $x > M_1$ מתקיים $x = f(x) > M_2 = M_1$ וסיימנו. לפיכך, לפי משפט 4.53 מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ כנדרש.

שנית, נוכיח את הגבול השני בעזרת הגדרת הגבול לפי היינה: תהי $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה אפסה החסומה מלמעלה, כלומר $x_n > 0$ לכל n . לפיכך לפי משפט 2.43, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \infty$. לכן, לפי הגדרה 4.51 מתקיים $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$ כנדרש.

לבסוף, נוכיח גם את הגבול האחרון בעזרת הגדרת הגבול לפי היינה: תהי $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה אפסה החסומה מלעיל ע"י 0, כלומר $x_n < 0$ לכל n . לפיכך, הסדרה $y_n = -x_n$ חסומה מלמעלה ע"י 0, כלומר $y_n > 0$ לכל n . לפי הטענה שהראינו לעיל,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \infty \xRightarrow{\text{טענה 2.39}} \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{y_n} = -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{-y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = -\infty$$

ולכן הסדרה $\frac{1}{x_n}$ שואפת ל $-\infty$ ולכן לפי הגדרה 4.52, מתקיים $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ כנדרש.

■

בעמוד הבא נראה את החישובים לסעיפים ב וג.

שאלה 4 – המשך

סעיף ב

נראה שהגבול אינו קיים. נפשט מעט את ביטוי הגבול:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin^4 x}{x^7} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin^4 x}{x^4} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x^3} \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x}{x} \right)^4 \cdot \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x} \right)^3\end{aligned}$$

לכן, לפי משפטים 4.35, 4.48, 4.45 וטענת העזר מתקיים

$$\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \right)^4 \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \right)^3 = 1^4 \cdot \infty^7 = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^4 x}{x^7} = \infty$$

סעיף ג

נחשב את הגבול:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x^5 + 5x^3 + 1}{5x^5 + 3x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x^5}(-3 + \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^5})}{\cancel{x^5}(5 + \frac{3}{x^2} - \frac{1}{x^5})} \\ &= \frac{-3 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^5}}{5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^5}} \\ \text{לפי טענת העזר} &= \frac{-3 + 5 \cdot 0 + 0}{5 + 3 \cdot 0 - 0} = \boxed{\frac{-3}{5}}\end{aligned}$$

וחישבנו את הגבול כנדרש.

