

FYS4150 - COMPUTATIONAL PHYSICS

PROSJEKT 2

Å LØSE SCHRÖDINGERS LIKNING FOR ÉTT OG TO
ELEKTRONER

Jon Vegard Sparre
jonvsp@uio.no

Dato: October 2, 2015

Abstract

I dette prosjektet har vi løst Schrödingerlikninga for harmonisk oscillator med ett og to elektroner. Vi har brukt Jacobis metode og egenverdi-løseren til Armadillo-biblioteket for å løse den numerisk. De numeriske resultatene har blitt sammenliknet med de analytiske resultatene til M. Taut (sett inn ref. her) Vi har kun sett på løsningene for relativ avstand med og uten Coulomb-frastøtning.

Lenke til mitt GitHub domene: <https://github.com/jonvegards/FYS4150>

Introduksjon

Problemet som vi kommer til å løse i dette prosjektet er Schrödingerlikninga (SL) for en 3D harmonisk oscillator med ett og to elektroner. Vi har et sfærisk symmetrisk potensiale, som gjør at vi trenger kun å løse den radielle SL, *i.e.* vi har redusert det tredimensjonale problemet til et éndimensjonalt ett. Den radielle delen av SL er da, for en harmonisk oscillator

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R(r) + \frac{m\omega^2 r^2}{2} R(r) = ER(r).$$

Det er essensielt denne likninga vi skal løse gjennom hele prosjektet i forskjellige former. Metoden vi skal bruke her, ble vi kjent med i prosjekt 1. Vi tar utgangspunkt i trepunktsformelen for en annenderivert, diskretiserer funksjonen i n steg med en steglengde h , setter det opp som en tridiagonal matrise og løser matriselikninga med en egnet algoritme.

Teori

SL er gitt i sfæriske koordinater, s.a. $r \in [0, \infty)$. Denne likninga inneholder noen stygge annenderiverte som vi vil endre på, så vi substituerer $R(r) = (1/r)u(r)$ og får,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} u(r) + \left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{m\omega^2 r^2}{2} \right) u(r) = Eu(r).$$

Randbetingelsene her er greie å finne ut av, vi vet at $u(0) = 0$ og at $u(\infty) = 0$ siden

Prøver vi å putte likninga inn i et program slik den er nå, så vil vi få noen ubehagelige overraskelser hva gjelder avrundingsfeil, overflow og andre ting vi ikke vil ha i en numerisk løsning. Vi innfører

derfor dimensjonsløse variable, da blir resultatet automagisk på den lengdeskalaen problemet krever at det er. Først setter vi $\rho = (1/\alpha)r$, α er en konstant med dimensjon lengde. Ved å sette inn dette får vi

$$-\frac{\hbar^2}{2m\alpha^2} \frac{d^2}{d\rho^2} u(\rho) + \left(\frac{\hbar^2}{2m\alpha^2} \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{m\omega^2\alpha^2\rho^2}{2} \right) u(\rho) = Eu(\rho),$$

vi vil ha den annenderiverte for seg selv, så vi ganger med $2m\alpha^2/\hbar^2$ på begge sider og får

$$-\frac{d^2}{d\rho^2} u(\rho) + \left(\frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{m^2\omega^2\alpha^4\rho^2}{\hbar^2} \right) u(\rho) = \frac{2m\alpha^2}{\hbar^2} Eu(\rho),$$

en siste endring vi gjør er å sette $m^2\omega^2\alpha^4/\hbar^2 = 1$ og vi introduserer $\lambda = 2m\alpha^2 E/\hbar^2$. Vi skal i dette prosjektet kun se på løsninger med $l = 0$, alt dette gir oss da likninga vi skal implementere i programmet,

$$-\frac{d^2}{d\rho^2} u(\rho) + \rho^2 u(\rho) = \lambda u(\rho).$$

Den analytiske løsninga for dette problemet gir oss egenverdiene $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 7$ og $\lambda_3 = 11$.

Det er ingen grunn til å vente med å se på likninga for problemet med to elektroner, så vi gyver løs på den med en gang. Vi vil så gå gjennom hvordan vi diskretiserer likninga og får den på matriseform, slik vi gjorde i prosjekt 1. For et system med to elektroner vil SL (uten Coulombinteraksjoner) være

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr_2^2} + \frac{1}{2} k_1 r_1^2 + \frac{1}{2} k_2 r_2^2 \right) u(r_1, r_2) = E^{(2)} u(r_1, r_2),$$

hvor r_1 og r_2 er posisjonene til elektron 1 og elektron 2, energien $E^{(2)}$ er den samla energien til systemet og $k_i = m\omega_i^2$. Vi introduserer så den relativet koordinaten $r = r_1 - r_2$ og massesenterkoordinaten $R = (1/2)(r_1 + r_2)$, SL tar da formen

$$\left(-\frac{\hbar^2}{m} \frac{d^2}{dr^2} - \frac{\hbar^2}{4m} \frac{d^2}{dR^2} + \frac{1}{4} m\omega_r^2 r^2 + m\omega_R^2 R^2 \right) u(r, R) = E^{(2)} u(r, R).$$

Dette er heldigvis en separabel differensiallikning, så vi kan sette $u(r, R) = \psi(r)\phi(R)$ og bruke at energien er gitt som $E^{(2)} = E_r + E_R$. Vi legger også til Coulombinteraksjonen, som avhenger av avstanden mellom elektronene,

$$V(r) = \frac{\beta e^2}{r}.$$

Vi får da

$$\left(-\frac{\hbar^2}{m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{4} m \omega_r^2 r^2 + \frac{\beta e^2}{r}\right) \psi(r) = E_r \psi(r).$$

Vi gjentar substitusjonsprosessen som vi gjorde over, $r = (1/\alpha)$. Vi setter $\alpha = \hbar/m\beta e^2$, $\omega_r^2 = (1/4)(mk\alpha^4/\hbar^2)$ og definerer $\lambda = m\alpha^2 E/\hbar$, dette gir oss

$$-\frac{d^2}{d\rho^2} \psi(\rho) + \omega_r^2 \rho^2 + \frac{1}{\rho} \psi(\rho) = \lambda \psi(\rho).$$

Vi ser at eneste forskjellen fra i stad er at vi har fått et ekstra potensialledd, hvilket betyr at vi kan lage én algoritme som løser for begge tilfellene.

Metode

Nå som vi har stablet på beina likningen vi skal løse, så kan vi ta en titt på den numeriske delen. Vi skal bruke trepunktsformelen for en annenderivert, som vi her kan skrive som

$$u'' = \frac{u(\rho + h) - 2u(\rho) + u(\rho - h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$$

Resultater

Konklusjon