Correction des travaux dirigés de MACHINE LEARNING

Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures Université Paris sciences et lettres

Joon Kwon


vendredi 27 mars 2020

HS.

1) Le cours donne :

$$(\hat{w},\hat{b}) = \mathop{\arg\min}_{(w,b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(1 + e^{-y_i(\langle w, x_i \rangle + b)}) \right\}.$$

2) Tracé de la fonction :



3) Soit $z \in \mathbb{R}$ et $y \in]0,1[$.

$$y = \frac{1}{1 + e^{-z}} \iff e^{-z} = \frac{1}{y} - 1$$

$$\iff e^{z} = \frac{y}{1 - y}$$

$$\iff z = \log \frac{y}{1 - y}.$$

 ϕ_{sig} est donc bijective de $\mathbb{R} \to]0,1[$, et

$$\forall y \in]0,1[, \quad \varphi_{\operatorname{sig}}^{-1}(y) = \log \frac{y}{1-y}.$$

4) De la définition de (\hat{w}, \hat{b}) il découle que

$$g_{\hat{w},\hat{b}} = \operatorname*{arg\,min}_{g \in \mathcal{L}_d} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(1 + e^{-y_i g_{w,b}(x_i)}) \right\}.$$

Dans l'expression ci-dessus, on peut tout à fait remplacer $g_{w,b}$ par $\varphi_{\text{sig}}^{-1} \circ \varphi_{\text{sig}} \circ g_{w,b}$. Cela donne :

$$g_{\hat{w},\hat{b}} = \operatorname*{arg\,min}_{g \in \mathcal{L}_d} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(1 + e^{-y_i \varphi_{\mathrm{sig}}^{-1}(\varphi_{\mathrm{sig}} \circ g_{w,b})(x_i)}) \right\}.$$

En utilisant la définition de \mathcal{F}_0 , on peut écrire :

$$\hat{f}_0 = \phi_{\text{sig}} \circ g_{\hat{w},\hat{b}} = \operatorname*{arg\,min}_{f \in \mathscr{F}_0} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(1 + e^{-y_i(\phi_{\text{sig}}^{-1} \circ f)(x_i)}) \right\}.$$

On note $y_{0,i}=\frac{y_i+1}{2}$ l'étiquette de l'exemple $i\in[n]$ dans le problème auxiliaire. En utilisant l'expression de $\varphi_{\text{sig}}^{-1}$, on peut écrire :

$$\hat{f}_0 = \operatorname*{arg\,min}_{f \in \mathscr{F}_0} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \left(1 + \exp \left(-(2y_{0,i} - 1) \log \left(\frac{f(x_i)}{1 - f(x_i)} \right) \right) \right) \right\}$$

Ce qu'on peut réécrire comme une ERM :

$$\hat{f}_0 = \operatorname*{arg\,min}_{f \in \mathcal{F}_0} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell_0(y_{0,i}, f(x_i)) \right\}$$

où on a posé pour fonction de perte:

$$\ell_0(y,y') = \log\left(1 + \exp\left(-(2y-1)\log\left(\frac{y'}{1-y'}\right)\right)\right)$$

qu'on peut simplifier en :

$$\ell_0(y,y') = \log\left(1 + \left(\frac{1-y'}{y'}\right)^{2y-1}\right).$$

5) On vérifie facilemement que sign $\circ \varphi_{sig} = sign.$ On peut donc écrire :

$$\operatorname{sign} \circ \hat{f}_0 = \operatorname{sign} \circ \varphi_{\operatorname{sig}} \circ g_{\hat{w},\hat{b}} = \operatorname{sign} \circ g_{\hat{w},\hat{b}} = \hat{f}.$$

