

CORRECTION DES TRAVAUX DIRIGÉS DE
MACHINE LEARNING
CYCLE PLURIDISCIPLINAIRE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES
UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES ET LETTRES

Joon Kwon

vendredi 24 avril 2020



1) Pour $i \in [n]$, on a

$$x_i x_i^\top = \begin{pmatrix} x_{i1} \\ \vdots \\ x_{id} \end{pmatrix} (x_{i1}, \dots, x_{id}) = (x_{ij} x_{ik})_{1 \leq j, k \leq d}.$$

Donc

$$A = \sum_{i=1}^n x_i x_i^\top = \left(\sum_{i=1}^n x_{ij} x_{ik} \right)_{1 \leq j, k \leq d}.$$

2) Pour $w \in \mathbb{R}^d$, F peut s'écrire :

$$F(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \left(y_i - \sum_{j=1}^d w_j x_{ij} \right)^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^d w_j^2.$$

F est donc différentiable par théorèmes d'opérations. Pour $w \in \mathbb{R}^d$ et $1 \leq j \leq d$

d , on a

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial w_j}(w) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (-2x_{ij}) \left(y_i - \sum_{j'=1}^d w_{j'} x_{ij'} \right) + \frac{\lambda}{2} 2w_j \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j'=1}^d w_{j'} \sum_{i=1}^n x_{ij} x_{ij'} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i x_{ij} + \lambda w_j \\ &= \frac{1}{n} (Aw)_j - \frac{1}{n} b_j + \lambda w_j.\end{aligned}$$

Donc

$$\nabla F(w) = \left(\frac{\partial F}{\partial w_j}(w) \right)_{1 \leq j \leq d} = \frac{1}{n} (Aw - b) + \lambda w.$$

- 3) \hat{w} étant un minimiseur de la fonction F qui est différentiable sur \mathbb{R}^d tout entier, on a $\nabla F(\hat{w}) = 0$, autrement dit :

$$A\hat{w} - b + \lambda n\hat{w} = 0.$$

- 4) Soit μ une valeur propre de A et $u \neq 0$ un vecteur propre associé, autrement dit :

$$Au = \mu u.$$

En multipliant à gauche par u^\top :

$$u^\top Au = \mu u^\top u.$$

D'une part on a que

$$u^\top u = \sum_{j=1}^d u_j^2 > 0$$

et d'autre part :

$$u^\top Au = u^\top \left(\sum_{i=1}^n x_i x_i^\top \right) u = \sum_{i=1}^n u^\top x_i x_i^\top u = \sum_{i=1}^n (x_i^\top u)^\top (x_i^\top u) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d (x_i^\top u)_j^2 \geq 0.$$

Nécessairement, on a $\mu \geq 0$.

- 5) Montrons qu'aucune valeur propre de $A + \lambda n I_d$ n'est nulle, ce qui équivaut à dire que la matrice est inversible. Soit μ une valeur propre de $A + \lambda n I_d$ et $u \neq 0$ un vecteur propre associé. On a alors

$$(A + \lambda n I_d)u = \mu u$$

ce qui se réécrit :

$$Au = (\mu - \lambda n)u.$$

$\mu - \lambda n$ est donc une valeur propre de A et est donc positive d'après la question précédente. Donc

$$\mu \geq \lambda n > 0,$$

car $\lambda > 0$ par hypothèse. En particulier $\mu \neq 0$.

- 6) L'équation obtenue à la question 3 peut s'écrire

$$(A + \lambda n I_d)\hat{w} = b.$$

Donc

$$\hat{w} = (A + \lambda n I_d)^{-1}b.$$

