

# 1. Kompleksie skaitļi

## 1.1. Algebriskais pieraksts

### 1.1.1. Reizināšana

Skaitļus  $3 + 2i$ ,  $3 - 2i$  sauc par kompleksi saistītiem.

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2 \quad (1)$$

### 1.1.2. Dalīšana

Izmantojot šo īpašību, kompleksos skaitļus varam iemācīties dalīt.

$$\frac{a + bi}{x + yi} = \frac{(ax + by)(-ay + bx)i}{x^2 + y^2} \quad (2)$$


### 1.1.3. Saknes vilkšana

Kvadrāsakni no algebriskā pierakstā rakstītiem kompleksiem skaitļiem var vilkt ar formulu:

$$\sqrt{a + bi} = \pm \left( \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} + \beta i \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}} \right) \quad (3)$$

### 1.1.4. Kompleksā plakne

Kompleksos skaitļus algebriskā pierakstā varam attēlot kompleksajā planknē.



## 1.2. Trigonometriskais pieraksts


### 1.2.1. Definīcija

Kompleksu skaitli  $z = a + bi$  kā plaknes punktu var uzdot arī ar: polāro rādiusu  $r$  (skaitļa moduli, jeb absolūto vērtību,  $r = |z|$ ) un polāro leņķi  $\varphi$  (skaitļa argumentu,  $\varphi = \arg(z)$ ).

Moduļa aprēķināšana:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (4)$$

## 2. zīm. Polārās koordinātas



### 1.2.2. Reizināšana

Reizinot divus kompleksus skaitļus, trigonometriskajā pierakstā viss sanāk ļoti vienkārši un simetriski:

$$zz' = rr'(\cos(\varphi + \varphi') + i \sin(\varphi + \varphi')) \quad (5)$$

**Teorēma.** Komplekso skaitļu reizinājuma modulis ir reizinātāju moduļu reizinājums, bet reizinājuma arguments - reizinātāju argumentu summa.

### 1.2.3. Dalīšana

Pieņemsim, ka skaitlis  $z'$  nav 0. Tad:

$$\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}(\cos(\varphi - \varphi') + i \sin(\varphi - \varphi')) \quad (6)$$

### 1.2.4. Kāpināšana

Ja  $n > 1$ , tad  $z^n$  apzīmē  $z \cdot \dots \cdot z$  ( $n$  reizes).

**Teorēma:** Ja  $m, n > 1$ , tad:

$$z^m z^n = z^{m+n}, \quad (7)$$

$$(z^m)^n = z^{mn} \quad (8)$$

### 1.2.5. Muavrā formula (kāpināšana trigonometriskajam pierakstam)

$$r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))^n = r^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)) \quad (9)$$

### 1.2.6. Saknes vilkšana

**Teorēma.** Ja kompleksais skaitlis

$$z = R(\cos \Phi + i \sin \Phi) \quad (10)$$

nav 0, tad saknei  $\sqrt[n]{z}$  ir tieši  $n$  dažādas vērtības, un tās var iegūt no formulas:

## 2. Polinomi

### 2.1. Definīcijas

Iespējami divi polinomu vienādības jēdzieni:

- Teiksim, ka polinomi  $P_1(x)$  un  $P_2(x)$  ir vienādi kā izteiksmes, ja to kanoniskie pieraksti satur vienādas  $x$  pakāpes un vienādus koeficientus pie attiecīgajām  $x$  pakāpēm.
- Teiksim, ka polinomi  $P_1(x)$  un  $P_2(x)$  ir vienādi kā funkcijas, ja visiem kompleksiem skaitļiem  $x$ ,  $P_1(x) = P_2(x)$ .

**Teorēma.** Ja polinomi ir vienādi kā izteiksmes, tad tie ir vienādi arī kā funkcijas.

**Teorēma.** Ja polinomi ir vienādi kā funkcijas, tad tie ir vienādi arī kā izteiksmes (t.i. tiem ir vienādi kanoniskie pieraksti).

### 2.2. Saskaitīšana

**Teorēma.** Polinomu summas pakāpe:

- ja  $\deg(P) < \deg(Q)$ , tad  $\deg(P + Q) = \deg(Q)$ ;
- ja  $\deg(P) = \deg(Q)$ , tad  $\deg(P + Q) \leq \deg(Q)$ .

### 2.3. Reizināšana

**Teorēma.** Nenulles polinomu reizinājuma pakāpe ir vienāda ar reizināmo pakāpju summu:

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q) \quad (11)$$

### 2.4. Dalīšana

**Teorēma.** Dalīšanu  $\frac{1}{P}$  var izpildīt tad un tikai tad, ja  $P$  ir nulltās pakāpes polinoms.

**Teorēma.** Jebkuriem diviem polinomiem  $P(x)$  un  $Q(x)$ , ja  $Q$  nav nulles polinoms, tad var atrast vienīgos polinomus - dalījumu  $D(x)$  un atlikumu  $R(x)$  tādus, ka  $P(x) = Q(x)D(x) + R(x)$ , un  $R(x)$  pakāpe ir mazāka par dalītāja  $Q(x)$  pakāpi vai arī  $R(x)$  ir nulles polinoms.

**Teorēma.** Ja  $P(x)$  dalās ar  $Q(x)$ , un  $Q(x)$  dalās ar  $R(x)$ , tad arī  $P(x)$  dalās ar  $R(x)$ . **Teorēma.** Ja  $P(x)$  un  $Q(x)$  abi dalās ar  $R(x)$ , tad arī  $P(x) + Q(x)$  un  $P(x) - Q(x)$  dalās ar  $R(x)$ . **Teorēma.** Ja  $P(x)$  dalās ar  $R(x)$ , tad jebkuram  $Q(x)$  reizinājums  $P(x)Q(x)$  arī dalās ar  $R(x)$ .

**Teorēma.** Jebkurš polinoms dalās ar jebkuru nulltās pakāpes polinomu.

**Teorēma.** Ja  $P(x)$  dalās ar  $Q(x)$ , tad tas dalās arī ar  $cQ(x)$ , kur  $c$  - jebkurš skaitlis, kas nav 0.

**Teorēma.** Ja  $P$  un  $Q$  pakāpes ir vienādas, tad  $P(x)$  dalās ar  $Q(x)$  tad un tikai tad, ja  $Q(x) = cP(x)$ , kur  $c$  - skaitlis, kas nav 0.

**Teorēma.** Ja  $c$  - skaitlis, kas nav 0, tad polinomiem  $P(x)$  un  $cP(x)$  ir vieni un tie paši dalītāji.

### 2.4.1. Piemērs

$$\begin{array}{r} (x^6 - x^4 + x^3 - 2x^2 + 5x - 9) \div (x^3 - 3x + 4) = x^3 + 2x - 3 + \frac{4x^2 - 12x + 3}{x^3 - 3x + 4} \\ \hline -x^6 + 3x^4 - 4x^3 \\ \hline 2x^4 - 3x^3 - 2x^2 + 5x \\ -2x^4 \phantom{-3x^3} + 6x^2 - 8x \\ \hline -3x^3 + 4x^2 - 3x - 9 \\ 3x^3 \phantom{-3x^2} - 9x + 12 \\ \hline 4x^2 - 12x + 3 \end{array}$$

## 2.5. Lielākais kopīgais dalītājs

### 2.5.1. Definīcija

**Def.** Polinomus mēs nevaram sakārtot pēc lieluma". Kaut kādu sakārtojumu dod tikai polinomu pakāpes. Tāpēc mēģināsim definēt divu polinomu lielāko kopīgo dalītāju (LKD, jeb angļiski - GCD, greatest common divisor) kā kopīgo dalītāju ar visaugstāko pakāpi.

**Bet:** ja  $D(x)$  ir divu polinomu kopīgs dalītājs, tad tāds ir arī  $cD(x)$ . Tāpēc būs lietderīgi vienoties, ka "oficiālā" lielākā kopīgā dalītāja koeficients pie lielākās  $x$  pakāpes ir 1.

### 2.5.2. "Gausa" metodes piemērs

**Piemērs.**

$$P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6; Q(x) = x^2 - 7x + 10. \quad (12)$$

Pakāpju summa ir 5.

**Pirmais solis** - likvidējam  $x^3$ :

$$P1 = P - xQ = x^2 + x - 6. \quad (13)$$

Šeit koeficients pie  $x^2$  ir 1, tāpēc papildus apsvērums nav jāpiemēro. Saskaņā ar Lemmu, pārīm  $x^2 + x - 6$ ,  $x^2 - 7x + 10$  ir tie paši kopīgie dalītāji, kas pārīm  $P$ ,  $Q$ , bet tā pakāpju summa ir 4.

**Otrais solis** - likvidējam vienu no  $x^2$ :

$$P2 = P1 - Q = (x^2 + x - 6) - (x^2 - 7x + 10) = 8x - 16. \quad (14)$$

Piemērojam minēto papildus apsvērumu, un izdalām ar 8, iegūstot:  $P2 = x - 2$ . Saskaņā ar lemmu, pārīm  $x - 2$ ,  $x^2 - 7x + 10$  ir tie paši kopīgie dalītāji, kas pārīm  $P$ ,  $Q$ , bet tā pakāpju summa ir 3.

**Trešais solis** - likvidējam atlikušo  $x^2$ :

$$P3 = Q - xP2 = (x^2 - 7x + 10) - x(x - 2) = -5x + 10. \quad (15)$$

Piemērojam papildus apsvērumu, un izdalām ar -5, iegūstot:  $P3 = x - 2$ . Pārīm  $x - 2$ ,  $x - 2$  ir tie paši kopīgie dalītāji, kas pārīm  $P$ ,  $Q$ , bet tā pakāpju summa ir 2. Bet pāra  $x - 2$ ,  $x - 2$  LKD ir  $x - 2$ , tāpēc arī  $LKD(P, Q) = x - 2$ :

$$LKD(x^3 - 6x^2 + 11x - 6, x^2 - 7x + 10) = x - 2. \quad (16)$$

Pārīm  $x - 2$ ,  $x - 2$  ir tikai divu veidu kopīgie dalītāji: skaitļa 1 daudzkārtņi un polinoma  $x - 2$  daudzkārtņi. Tātad visi šie kopīgie dalītāji ir arī LKD dalītāji. Šis process varēja beigties arī ātrāk, ja tiktu iegūts pāris 0,  $R$ . Šāda pāra LKD ir  $R$ , tas tad būs arī pāra  $P$ ,  $Q$  LKD. Bet process varēja beigties arī ar pāri  $a$ ,  $b$ , kur  $a$ ,  $b$  abi ir skaitļi. Tas tad nozīmētu, ka polinomu  $P$ ,  $Q$  LKD ir null-tās pakāpes polinoms 1:

$$LKD(P, Q) = 1. \quad (17)$$

## 2.6. Polinomu būvēšana

### 2.6.1. Dabiskā metode

Tikko pierādījām, ka ja pakāpei ir jābūt ne lielākai par  $n$ , tad tāds polinoms var būt tikai viens. Piemērs. Uzbūvēt polinomu  $P(x)$  tādu, ka  $P(1)=3$ ;  $P(2)=-2$ ;  $P(3)=2$ .

Doti 3 punkti,  $3 = 2 + 1$ , tātad tas būs kvadrātisks polinoms  $y = ax^2 + bx + c$ . Dabiska metode - sastādām 3 lineāru vienādojumu sistēmu:

$$P(1) = a + b + c = 3 \quad (18)$$

$$P(2) = 4a + 2b + c = -2 \quad (19)$$

$$P(3) = 9a + 3b + c = 2. \quad (20)$$

To atrisinot, iegūstam:  $a = \frac{9}{2}$ ;  $b = \frac{-37}{2}$ ;  $c = 17$ , tātad meklētais polinoms ir:  $P(x) = \frac{9}{2}x^2 + \frac{-37}{2}x + 17$

### 2.6.2. Vandermonda matrica (vispārīgi)

Vispārīgais gadījums: mēs gribam uzbūvēt  $n$ -ās (vai zemākas) pakāpes polinomu;

$$P(x) = a_n + x_n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \quad (21)$$

kas  $n + 1$  punktos  $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$  pieņem dotās vērtības  $y_1, y_2, \dots, y_n, y_{n+1}$ . No prasītajām  $n + 1$  vienādībām ( $i = 1..n + 1$ ):

$$P(x_i) = a_n x_i^n + a_{n-1} x_i^{n-1} + \dots + a_1 x_i + a_0 = y_i \quad (22)$$

iegūstam  $(n + 1) \times (n + 1)$  lineāru vienādojumu sistēmu, kuras atrisināšana dos polinoma koeficientu  $a_j$  vērtības:

$$\begin{pmatrix} x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ x_2^n & x_2^{n-1} & \dots & x_2 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & \dots & x_n & 1 \\ x_{n+1}^n & x_{n+1}^{n-1} & \dots & x_{n+1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ \dots \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$$

## 3. $\mathbb{Z}$ Lauki (un gredzeni)

### 3.1. Nulles dalītāji

**Def.** Gredzenā  $G$  divus nenulles elementus  $a, b$ , kam  $a*b=0$ , sauksim par nulles dalītājiem.

### 3.2. Inversie elementi

**Def.** Gredzena elementam  $a$  mēs varam nodefinēt apgriezto elementu (jeb inverso elementu) kā vienādojumu  $xa = ax = 1$  atrisinājumu. Laukā katram elementam eksistē tā inversais elements.

3.3. Saskaitīšanas tabula  $\mathbb{Z}_7$

+	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

3.4. Reizināšanas tabula  $\mathbb{Z}_7$

×	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

3.5. Dalīšanas tabula  $\mathbb{Z}_7$

÷	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0
1	1	4	5	2	3	6
2	2	1	6	4	5	1
3	3	6	1	5	2	4
4	4	2	4	1	6	5
5	5	3	2	6	1	4
6	6	5	3	4	2	1