

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC)

Agaricus:

Impulso de blasfemar y expresar frases escatológicas y grotescas, alternando con estados de exaltación religiosa. Estos pacientes presentan una energía inagotable (como Veratrum).

Anacardium:

Caracterizados por polaridad o alternancia extrema de carácter, muy especialmente de orden moral o ético. En algunos casos la escisión mental puede desembocar en la dualidad a nivel de su personalidad o en la fragmentación mental (amnesia, trastornos graves de identidad). La naturaleza obsesiva se acompaña de trastornos bipolares.

Anhalonium:

Cuando el síntoma clave es la despersonalización y hay notable tendencia hacia los aspectos místicos de la vida, incluso al grado de la obsesión.

Argentum Nitricum:

Ritualista en extremo. Afán desmedido de revisar todo una y otra vez. Impulsos desbocados e ideas fijas cambiantes o cíclicas. Junto con Thuja y Syphillinum constituye el clásico trío de los obsesivos. Es el remedio más obsesivo de la Materia Medica.

Arsenicum Album:

Son muy rutinarios pero caen el ritualismo, a diferencia de los Kalis que no tienden a ser ritualistas. Sus comportamientos obsesivos tienen una raíz de miedo y sentimiento de vulnerabilidad. Arsenicum es uno de los medicamentos más compulsivos y obsesivos de la Materia Medica. Se caracteriza por una inclinación patológica y desmedida por el orden, como una forma compensatoria de encarar el sentimiento de descomposición y entropía interiores.

Aurum Metallicum:

Indicado cuando los desórdenes compulsivos tienen un sustrato de grave autodestrucción y minusvalía extrema. Puede haber pensamientos suicidas o de gran violencia, los cuales suelen ser compulsivos y morbosos.

Carcinosin:

Sujetos muy brillantes e inteligentes pero demasiado distraídos, pueden tener comportamientos ritualistas o repetitivos sin percatarse. Rasgos de genialidad. Tourettismo.

Causticum:

A raíz de decepciones, sobre todo de índole ética o moral. Con gran perturbación del propio paciente, cólera consigo mismo y muy especialmente en casos donde las tendencias compulsivas tienen un contexto social, moral o justiciero. Estas personas tienen una intolerancia compulsiva a toda forma de injusticia, personal o ajena, o imposición.

Hyosciamus:

Con manifestaciones compulsivas en la forma de gestos, carfología y falta de empatía. Graves daños en las zonas de Wernicke y Broca, sobre todo del hemisferio derecho, lo que le ocasiona limitaciones en sus relaciones sociales y afectivas. Impulsos incontrolables de mencionar circunstancias de orden sexual, tendencia a ser obsceno y expresar palabras soeces.

Ignatia:

Reacciones obsesivo compulsivas de orden afectivo o por pérdidas emocionales.

Iodum Metallicum:

Reacciones obsesivo compulsivas asociadas a crisis incontrolables de cólera y violencia desmedida. Obsesión por su alimentación y por la comida. Muy obsesivo con horarios y actividades, sobre todo en lo relacionado con sus hábitos alimenticios.

Kali Carbonicum:

Es quizá el más rígido y dogmático de la Materia Medica. Son personas, como todos los kalis, muy estructuradas y contenidas.

Kali Sulphuricum:

Como Kali Bich. se caracteriza por una gran dificultad para eliminar y exonerar fisiológica y mentalmente. Personas muy apegadas a los bienes materiales; codiciosos y rutinarios (parecido a Puls., pero más estructurado, contenido y sin espontaneidad alguna).

Lachesis:

Asociado a estados de gran suspicacia que rayan en la paranoia, reacciones obsesivo compulsivas asociadas a vulnerabilidad física y emocional supuesta.

Lyssinum:

Cuando se asocia con fobias de toda clase y paranoia. Es de los pocos medicamentos que están indicados en claustrofobia y agorafobia de manera simultánea. Intolerancia a cualquier cambio en sus hábitos y rutinas, con ataques de pánico y sensación de ahogarse.

Mancinella:

Con temores obsesivos al mal y especialmente al diablo y a todo lo relacionado. Supersticioso. Fobias y ataques de pánico con temores hacia elementos sobrenaturales.

Medorrhinum:

Trastornos compulsivos asociados, como en el caso de Carcinosisin, a graves desequilibrios entre las esferas mentales, muy especialmente entre la esfera intelectual y la afectiva. Personas obsesivas en la búsqueda de placer y experiencias novedosas.

Natrum Muriaticum:

Con miedo a los ladrones y gran ira contenida. Teme fallar a su deber, lo que lleva a repasar y repetir una y otra vez aquello que tiene que hacer. Estados obsesivos y compulsivos sobre todo relacionados con situaciones afectivas. Personas que se sienten atraídas de forma compulsiva hacia individuos inalcanzables o situaciones imposibles.

Natrum Sulphuricum:

A consecuencia de traumatismos cefálicos o tumores cerebrales.

Nux Vomica:

En estados de grave desgaste físico, emocional o afectivo. Obsesión compulsiva con la consecución de sus metas o con la obtención de dinero, placer o bienes materiales. Estados compulsivos que se relacionen o desembocan en adicciones.

Opium:

Estados alterados de conciencia en las cuales el paciente, de manera murmurante, expresa palabras soeces, blasfema o dice cosas bizarras.

Platina:

TOC con desdén y descalificación sistemática hacia los demás y obsesión sexual.

Silicea:

Indicado en personas demasiado pensantes, lógicas, que con el tiempo tienen dificultad para exonerar, desestructurarse o ser espontáneas.

Staphysagria:

Con gran culpa, minusvalía y antecedentes de humillaciones o abuso severo. Es el principal remedio en los estados obsesivos compulsivos por violaciones o abuso sexual (Carc.)

Strychninum:

Pacientes que ante la competencia o el reto se tornan insolentes, muy agresivos o incluso violentos. Tendencia incontrolable a hacer juegos de palabras.

Syphillinum:

Cuando la compulsión se centra, como en Ars., en situaciones relacionadas con el orden, la limpieza y sobre todo el temor al contagio y el aseo personal. Miedo al contagio.

Thuja:

Sentimiento de vulnerabilidad y fealdad interior. Ideas obsesivas y pensamientos persistentes, donde el paciente proyecta hacia el exterior sus propias pulsiones contenidas y reprimidas. Thuja siente estar bajo un poder sobre humano, cree que lo persiguen o, sobre todo, se siente desagradable, culpable o inadecuado.

Tuberculinum:

El estado compulsivo de este remedio se asocia o se presenta con insatisfacción extrema y la obsesiva búsqueda de satisfactores indefinidos. En estados patológicos y finales, presenta tendencia a realizar los mismos actos de manera inconsciente una y otra vez.

ALZHEIMER

Agaricus Muscarius

Delirio con exaltación de las fuerzas, con extraordinaria fuerza muscular, rabioso. Se escapa de la cama, no reconoce a los suyos, arroja cosas, habla en forma incoherente, canta, está muy locuaz y salta rápidamente de un tema a otro; o bien está taciturno y rehúsa contestar a las preguntas, o casi inconsciente, como borracho. Hilaridad, excitación seguida de depresión, confusión e imbecilidad. Aversión al trabajo físico y mental; encuentra gran dificultad en concentrarse. Indiferente, con tendencia a estar sentado. Indeciso. Excesiva actividad muscular involuntaria en las más diversas formas; sacudidas, estremecimientos, sobresaltos, mioclonias, temblores, movimientos coreicos. Toda esta hiperactividad cesa durante el sueño. Hormigueos o sensaciones de reptación. Cabeza en constante movimiento. Sacudidas espasmódicas de párpados y globos oculares. Nistagmus, de lado a lado, pendular, rápido, involuntario, convulsivo. Cara con expresión idiotizada; con sacudidas. Siente rígidos los músculos de la cara. Rechina los dientes durmiendo. Deseos sexuales aumentados, sin erección. Torpeza e incoordinación en manos y miembros inferiores; tropieza al caminar; ataxia; se le caen las cosas de las manos; como si sus miembros no fueran de él. Temblor en las manos, peor al asir un objeto. Movimientos convulsivos y sacudidas espasmódicas en las extremidades. Paroxismos de bostezos. Bosteza y termina riéndose.

Ailanthus Glandulosa

Estupor con suspiros; insensibilidad. Está semiinconsciente; no reconoce a nadie, no comprende lo que le dicen, ni puede responder correctamente a las preguntas que le hacen. Delirio murmurante, con insomnio e inquietud. Cree ver ratas corriendo alrededor suyo. Ha olvidado todo su pasado o solo lo recuerda como algo leído, o perteneciente a otra persona. Todo parece irreal. Tiene mareos que se agravan al sentarse. Ojos congestionados, rojos, con expresión asustada al despertarlo. Alimento muy fétido. Secreción fétida escasa, con intensos dolores que le impiden tragar (o le duelen los oídos al tragar)

Alumina

Confusión sobre su identidad personal: “cuando dice algo, siente como si otra persona lo hubiera dicho, y cuando ve algo es como si otra persona lo hubiera visto” hay como un desdoblamiento de la personalidad. Las cosas parecen irreales. El tiempo pasa muy lentamente, una hora le parece medio día. Los síntomas mentales aparecen mayormente a la mañana al despertar (ansiedad, angustia, tristeza) Miedo a perder la razón. Se equivoca al hablar o escribir; usa palabras equivocadas o las coloca mal. Tendencia a las parálisis o paresias de músculos, afecciones del sistema nervioso central exteriorizadas en dificultades en la deambulacion y temblores o movimientos convulsivos. En viejos, en gente con falta de calor vital; sujetos delgados, secos, de disposición suave. Vértigo en viejos agotados. Anemia cerebral. Sensación de que el cerebro cae hacia delante. Movimientos convulsivos de la mandíbula. Apetito disminuido. Debe hacer fuerza un largo rato o como si fuera a mover el vientre hasta que empieza a orinar. Incoordinación en extremidades, sobre todo en los miembros inferiores, con debilidad y marcha vacilante.

Alumina silicata

Tiene dificultad para concentrarse. Confusión mental a la mañana al despertar; embotamiento. Debilidad mental; olvidadizo. Se equivoca al hablar y escribir y usa palabra equivocadas. Memoria débil. Imbecilidad. Voluntad muy debilitada. Los sentidos están embotados, pero es sensible a los ruidos. Indiferencia. Indecisión. Ansiedad: de noche; con inquietud. Tiene alucinaciones: le parece que se va a volver loco; que se está achicando y que se va a caer si levanta los pies; ve visiones. Contracciones tónicas, rigidez. Sacudidas y mioclonias en todo el cuerpo. Adormecimiento en partes del cuerpo y en sitios doloridos. Vértigo: al agacharse; sentado; caminando; al cerrar los ojos; al dar vuelta la cabeza bruscamente, con tendencia a caer de lado o hacia delante; como intoxicado. Parálisis vesical. Debe esperar mucho para comenzar a orinar, y no queda satisfecho después. Micción involuntaria. Insomnio antes de medianoche. Se despierta frecuentemente o muy temprano. Bostezos.

Ambra Grisea

Está peor por la presencia (o en presencia) de otras personas. No le gusta estar en sociedad, en las reuniones sociales; desea estar sola. La presencia de extraños le agrava y le da miedo, aun de que se acerquen. Estados depresivos, con tendencia casi compulsiva a recordar y hablar de hechos desagradables ya pasados, que la atrapan. Compresión lenta, embotado, confuso, no puede reflexionar, peor de mañana; las ideas se le desvanecen; en viejos especialmente. Mala

memoria; viejos olvidadizos. Está como en un sueño. Imbecilidad. Pregunta, y sin esperar la respuesta, pregunta sobre otro tema; salta de un tema a otro: en mujeres de sociedad, muy locuaces y excitadas. Ansiedad: al anochecer en cama; cuando está en compañía; por conversación; por deseo ineficaz de mover el vientre; Gran medicamento de los viejos, con disminución de todas las funciones, debilidad, frío y adormecimiento de partes del cuerpo; en pacientes debilitados por la edad o exceso de trabajo; en viejos adelgazados. Vejez prematura, senilidad precoz. En gente delgada. Temblor senil precoz. Vértigo en los viejos, peor al levantarse a la mañana; necesita estar acostado. Constipación con frecuentes deseos ineficaces; Siente en la uretra como si pasaran gotas. Se le duermen los miembros superiores, peor de noche o llevando algo o acostado sobre ellos, mejor moviéndolos. Insomnio antes de medianoche.

Ammonium Carbonicum

Se equivoca al hablar, al escribir (en ambos casos usa palabra erróneas), al calcular; en los nombres. Poca memoria. Ausente. Se concentra con dificultad. Imbecilidad. Miedo e inquietud al anochecer. Falta de reacción o reacción lenta. Sensación de tener el cerebro flojo, como si cayera de un lado a otro al menor movimiento. Retención de orina; polaquiuria. Apnea al dormirse, se despierta ahogado. Palpitaciones por el menor esfuerzo o movimiento. Temblor en las manos.

Anacardium

Brusca pérdida de la memoria, especialmente en viejos. El paciente está muy alterado y preocupado por su falta de memoria, por que está confuso y no puede atender sus ocupaciones; todo parece ser un sueño o algo irreal. Escasa memoria para los nombres propios, para las palabras y para lo que acaba de leer o pensar; no retiene nada. Siente como si tuviera una doble personalidad, como si en su mente actuaran dos voluntades contradictorias y opuestas entre sí: una que le ordena hacer lo que la otra le prohíbe, una que le aconseja el bien y la otra el mal, o en un oído o sobre un hombro un diablo y en el otro un ángel que le aconsejan. No tiene voluntad propia. Es desconfiado (no confía ni en él ni en los demás), tiene ideas fijas o ilusiones de que está rodeado de enemigos. Intellectualmente, hay confusión, embotamiento y le cuesta concentrarse. A veces no reconoce a los que lo rodean ni a sus parientes más allegados. Imbecilidad; idiocia. Otras ilusiones y alucinaciones: que ve diablos; que él es un diablo; siente que un diablo le está silbando blasfemias en un oído. Deprimido, melancólico. Lentitud en los movimientos. Mejor comiendo. Los síntomas, tanto psíquicos, como gástricos, cutáneos, etc., desaparecen o mejoran mientras come. Los objetos aparecen alejados. Perversiones del olfato. Imposibilidad de expulsar las heces, aún blandas, con sensación de gran peso en el ano. Mioclonias en las piernas. Rigidez de pernas y rodillas.

Argentum Nitricum

Hay una especie de inquietud ansiosa que lo obliga a caminar rápido y la ansiedad lo hace caminar más rápido aún. Lo asaltan raras ideas con respecto a las casas o lugares al caminar por la calle, teme pasar por ciertas esquinas. Tiene un sentimiento íntimo de desvalorización. Tiene

presentimientos de muerte. Intellectualmente, tiene dificultades en pensar y comprender. Su memoria es escasa, para las palabras, para lo que va a decir. Se olvida de las palabra cuando habla, y los esfuerzos mentales lo agravan. Imbecilidad. Comportamiento infantil; hace cosas raras, locas, irracionales, y llega a extrañas conclusiones. Tiene errores de percepción en tiempo y espacio. Inquieto de noche, da vueltas en la cama o salta de ella. Habla en forma incoherente o lentamente, casi siempre de un solo tema. Enfermos macilentos, mustios, secos, con aspecto de viejos; con adelgazamiento. Temblores periódicos. Epilepsia precedida de una sensación de expansión del cuerpo o de gran nerviosidad e inquietud. Vértigo en la oscuridad o al cerrar los ojos o al agacharse; al ver casas altas o en lugares altos. Sensación de agrandamiento de la cabeza. Cara avejentada o de viejo, hundida, de aspecto sucio; de color plumizo, cetrino o amarillento. Los trastornos gástricos siempre están acompañados de eructos muy difíciles, ruidosos y de grandes cantidades de aire. Micciones involuntarias e inconscientes, día y noche; no siente la orina al salir. Marcha vacilante, con inestabilidad y temblores, o está parado y vacila, sobre todo si piensa que no lo observan, peor con los ojos cerrados, no puede caminar. Sueño comatoso o insomnio.

Árnica

Afirma obstinadamente que se siente muy bien, aunque en realidad está muy enfermo o grave. Estado estuporoso que puede llegar a la inconsciencia. Si le hacen una pregunta, sale de su sopor y contesta bien, pero el estupor. Reaparece de inmediato. Se olvida de las palabras y de lo que va a decir, mientras habla. No recuerda ni lo que ha dicho ni lo que va a decir; o se equivoca al hablar, colocando mal las palabras o usando palabras equivocadas. De ahí el rechazo a la conversación y también a contestar; lo irrita que lo interroguen. Es el principal medicamento de traumatismos, contusiones y golpes, especialmente de partes blandas. Consecuencias inmediatas o alejadas (aún años), locales o generales de traumatismos aún leves. Consecuencias de golpes en la cabeza, conmoción cerebral. Heces involuntarias, sobre todo durmiendo, a menudo con incontinencia de orina. La orina gotea involuntariamente. Insomne e inquieto cuando está muy cansado.

Baryta Carbonica

Es uno de los principales medicamentos en las oligofrenias o en todo tipo de deficiencia intelectual o mental; imbecilidad, idiocia. El comportamiento es infantil en el adulto o en el viejo. Memoria escasa o muy deficiente: olvida lo que va a hacer o lo que acaba de hacer, o lo que acaba de decir o está por decir. Se olvida de las palabras más familiares. El adulto olvida la topografía de barrio en que vive, y se pierde aún en calles que le son muy conocidas. El viejo ha olvidado todo, aún los nombres propios y palabras muy usuales. Demencia senil. Aversión a los extraños (y le agravan sus síntomas), a la compañía, tiene miedo de la gente y de todo. Gran inquietud e hiperexcitabilidad de todos los sentidos, deficiencia en el crecimiento intelectual. Es el principal remedio de los trastornos de la vejez. Gran debilidad mental y física en los viejos. Parálisis y paresias en viejos. Enfermedades en viejos cuando comienzan los cambios degenerativos, cardiovasculares y cerebrales. Tendencia apoplética en ancianos, con cefaleas y comportamiento infantil. Sensación de tener el cerebro suelto. Parálisis e induración de la

lengua en viejos. Urgencia irresistible para defecar. Micciones frecuentes y abundantes, urgentes, casi no puede retener la orina. Latidos violentos peor de noche. Sueños ansiosos, inquietantes. Habla durmiendo y se sacude.

Belladonna

No reconoce a sus familiares. Francos cuadros maníacos o demenciales. Alucinaciones, la mayoría visuales. Tiene miedo: constante de todo; tiene mucha actividad durante el sueño. Gran hipersensibilidad: a la luz; a los olores fuertes; a los ruidos. Hace gestos ridículos o violentos. Inquietud ansiosa que lo saca de la cama o lo hace ir de una a otra. Irritable, al despertar. Sensibilidad del cerebro a la menor sacudida. Movimientos convulsivos. Gran sensibilidad a los objetos brillantes. Expresión feroz; risa sardónica. Movimientos convulsivos en la cara, peor en la boca. Dificultad para hablar, tartamudeo; mudez. Rechina los dientes; peor durmiendo. Heces involuntarias y formadas, duras, de noche en la cama y al orinar. Constricción y sensibilidad laríngea, con sequedad y aversión a beber. Tiene sueño y no puede dormir. Sueño comatoso; profundo; semiconsciente; inquieto.

Bufo

Imbecilidad o idiocia oligofrenias. Comportamiento infantil: el adulto habla, ríe y llora como un niño, grita y tiene cólera súbitas. Deseo de soledad, pero teme estar solo. Se enoja si no lo entienden. Crisis de furor, salta de la cama y corre como un loco. Las convulsiones aparecen en especial durmiendo. Precediendo al ataque, el enfermo está más irritable, con midriasis, con un movimiento como si lamiera. Cefalea congestiva. Parálisis de la lengua. Tartamudeo, se enoja si no le entienden. Somnoliento después de comer.

Calcarea Carbónica.

Miedo a perder la razón; al mal; ansiedad. En el crepúsculo y de noche; en la cama, al ir a dormir. Alucinaciones: ve caras horribles e imágenes que lo asustan. Es lento en sus movimientos; pero también en hacer cálculos, debido a que los esfuerzos mentales lo agravan, lo cansan. Lentitud en viejos. Se equivoca al hablar ubica mal las palabras o las usa equivocadamente. Tiene confusión mental después de comer y por esfuerzos mentales; está como en un sueño; “intelecto escaso, no progresa en sus estudios”; imbecilidad. La lentitud es una característica que a cada paso se encuentra en este medicamento. “Todo en ellos es lento, tardío, pesado y flojo” Es un paciente cansado, flojo, débil, que se agota con facilidad. Sudores parciales en distintos sitios del organismo, no tolera la ropa ajustada. Suda en la cabeza, de mañana, al anochecer y de noche, durmiendo. Cara pálida, enfermiza, cetrina, terrosa, amarillenta; con ojeras; arrugada; de aspecto avejentado. Apetito exagerado, más después de comer; con adelgazamiento o marasmo; o apetito ausente. No tolera la ropa ceñida en el vientre. Palpitaciones tumultuosas, violentas, audibles. Sensación de cansancio o debilidad en la espalda. Insomnio antes de medianoche y después de las 3. Se despierta a menudo, o tarde.

Calcarea Phosphorica

Dificultad o lentitud en pensar y comprender. Idiocias, oligofrenias en general. Confusión por esfuerzos mentales. Usa palabras equivocadas al escribir, o repite dos veces la misma palabra. Mala memoria: no recuerda lo que acaba de hacer. Desconfiado, descontento, tiene aversión a la compañía. Vértigo peor al pararse de estar sentada (especialmente en viejos). Sensación de frío en la cabeza, como si tuviera agua fría o helada en la región occipital y vértex. Cara pálida, terrosa, amarillenta cobriza. Edemas por cardiopatías. Palpitaciones con ansiedad. Insomnio antes de medianoche. Se despierta tarde y con dificultad a la mañana, no puede quedarse despierto. Sueño muy interrumpido.

Cannabis Indica

Está perturbado, en más, por una hipersensibilidad general y sensorial, así como está perturbado en la percepción de lo que es adecuado y equilibrado en el comportamiento humano. Tiene la sensación de un desdoblamiento o duplicación de su personalidad, una de las cuales actúa independientemente de la otra; cree tener dos existencias y vivir en dos mundos diferentes. Es muy olvidadizo; comienza una frase, pero olvida lo que quería o iba a decir o escribir, sobre todo las últimas palabras o ideas; y no puede terminar la frase, pero da su aprobación cuando otro la termina bien.

No recuerda lo que acaba de oír, de leer, lo que ha dicho, lo que acaba de pensar o de escribir. Es incapaz de recordar un pensamiento o un acontecimiento, por los otros pensamientos que se acumulan en su cerebro. Fuga de ideas, se le entrecruzan, se le desvanecen, ni puede fijarlas, no puede concentrarse. Ausente, abstraído. Ideas fijas, obsesiones. Depresión ansiosa; angustia con opresión, mejor al aire libre. Inconsciente durante varios minutos, al mirar una luz. Sacudidas frecuentes e involuntarias de la cabeza. Hambre exagerada; intensa sede de agua fría. Urgencia para orinar, pero no sale una gota; Somnolencia excesiva. Sacudida en los miembros, que lo despiertan. Habla durmiendo.

Carboneum Sulphuratum

Dificultad para pensar y entender, (debilidad mental, imbecilidad, idiocia; oligofrenias en general). Su comportamiento es infantil. Confusión como si estuviera intoxicado, distraído; busca cosas que están delante suyo. Ve obstáculos frente a sí que no existen. Memoria deficiente, no encuentra la palabra apropiada o no recuerda palabras. Indiferencia a lo que sucede a su alrededor. Indolente. Irresoluto, tímido. Irritabilidad por la menor pequeñez, rompe los objetos que tiene en la mano. Visiones fantásticas que lo asustan. Brusca pérdida de conciencia que dura varios días. Ansiedad, peor de mañana. Colapso; falta de calor vital. Sensaciones de adormecimiento en ciertos lugares. Es el medicamento más útil en constituciones arruinadas por el abuso de bebidas alcohólicas, gran debilidad en viejos alcoholistas. Pacientes sensibles, friolentos, con músculos atrofiados y piel y mucosas anestesiados. Es un buen geriátrico. Cara pálida; expresión aturdido. Tartamudez, ceceo. Polaquiuria. Micción involuntaria. Sueño profundo y prolongado. Sueño perturbado, se despierta bruscamente por pesadillas o sacudidas nerviosas.

Corticotrofina

Depresión, deseo de soledad, timidez en sociedad. O está ansioso estando solo, se siente abandonado y desea morir. Falta de voluntad, silencioso, con actitudes catatónicas. Deprimido, ausente, con sensación de frustración. Debilidad de la memoria; se olvida fácilmente, sobre todo de los nombres; le falta concentración. Usa palabras erróneas y se equivoca al hablar. Anorexia. Intensa sed. Deseos urgentes y frecuentes de orinar. Insomnio hasta la 1. Se despierta a las 4, con gran actividad mental.

Cicuta Virosa

Confunde el presente con el pasado. Tiene aversión a la presencia de extraños. Todo le parece extraño y confuso: las caras de sus familiares, sus voces, los lugares conocidos, etc. Siente como si estuviera en un sitio extraño. No reconoce a nadie, pero contesta cuando le hablan. Inconsciencia periódica. Recupera la conciencia bruscamente, y no recuerda nada de lo ocurrido. Acceso de amnesia total por horas o días; después de un ataque epiléptico o de un traumatismo cefálico. Olvida su nombre. Convulsiones causadas por traumatismos craneanos o cerebro-espinales, conmociones, caídas; por errores de dieta. Catalepsia: los miembros cuelgan y el paciente parece sin vida, pero responde correctamente si es exigido. Shocks repentinos en el cerebro, peor por aire frío, como electricidad a través de la cabeza. Efectos de traumatismos cefálicos: conmoción cerebral. Cara de color ceniza, o pálida y fría, con manos frías, ojos hundidos, y ojeras. Tendencia a rechinar los dientes. Se muerde la lengua. Tiene hambre enseguida de comer. Incontinencia de orina en viejos. Sacudidas espasmódicas en los miembros; en los miembros superiores; en los antebrazos y dedos; en los miembros inferiores. Insomnio y sudores nocturnos; o se despierta a menudo.

Cocculus

Todas las respuestas a los estímulos son lentas: contesta con lentitud, piensa mucho antes de hacerlo o necesita que le repitan la pregunta (pero contesta mucho antes de hacerlo o necesita que le repitan la pregunta (pero contesta correctamente); necesita mucho tiempo para dar vuelta la cabeza para ver las cosas o para moverse o para pensar o para hacer cualquier cosa. Parece que hubiera un agotamiento o postración nerviosa, que puede llegar a la imbecilidad. Hay una lentitud para comprender, lo que lo hace olvidadizo; no encuentra la palabra apropiada al hablar, lo que le impide hablar correctamente, y se equivoca; o se olvida de lo que acaba de pensar o leer. Necesita leer un pasaje varias veces para llegar a entenderlo. Aturdimiento peor por leer o pensar. Mala memoria. Esa misma lentitud lo conduce a la indolencia, y no llega a terminar nada de lo que comienza. Indecisión. Confusión mental peor después de comer o beber. Está sentado en un rincón, sin hablar, como sumido en recuerdos tristes, y no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Vuelve a hablar reiteradamente de cosas pasadas desagradables. Estados catatónicos (dementes precoces) o de éxtasis: parece inconsciente o ausente, con una sonrisa estereotipada, una expresión atontada. Trastornos por viajar en un vehículo, que aparecen o se agravan por viajar, ya en barco, bote, tren, automóvil, avión, etc., ocasionando especialmente mareos, náuseas y vómitos. Debilidad parálitica extrema o temblorosa, con náuseas y vértigo, en relación con una lesión orgánica o por cuidar enfermos o por falta de sueño o por surmenaje o por caminar al aire libre. Falta de energía

vital. Tendencia a temblores, peor después de emociones. Rigidez espasmódica, paralítica; espasticidad con falta de fuerzas; si extiende un miembro, debe ayudarse para volver a flexionarlo, con gran dolor. Mareos, se siente como intoxicado. Los objetos parecen moverse hacia arriba y abajo. Náuseas; viajando en un vehículo. Vómitos: por viajar; por tomar frío. Distensión timpánica enorme del vientre. Palpitaciones, con angustia precordial, seguidos de vértigo. Se le duermen los miembros superiores, antebrazos y manos, primero derecha y luego izquierda, o alternándolas; y las plantas de los pies estando sentado. Sensación de parálisis en los miembros superiores. Las manos tiemblan cuando come, más cuanto más alto las levanta. Parálisis indoloras de las extremidades. Movimientos involuntarios del brazo y pierna derechos. Sueño perturbado por excesiva ansiedad e inquietud. Durante el sueño grita, se sobresalta y tiene movimientos convulsivos de las manos, ojos y cabeza.

Colchicum

Escasa memoria, olvidadizo, distraído. Es deficiente la comprensión y la asociación de ideas; le faltan palabras para expresarse, y cuando escribe, olvida cifras y palabras enteras; olvida lo que ha dicho o lo que va a decir o lo que ha oído. Confusión: confunde objetos; mente obnubilada, aunque contesta bien. Puede leer, pero no entiende ni siquiera una oración corta ni las palabras. Sus sufrimientos le parecen intolerables. Los estímulos externos (luz, ruido, contacto, olores fuertes, etc) lo perturban notablemente. Olfato muy agudo (huele hasta lo que otros no huelen) Odia los olores. Pero está aversión a la comida no es sólo con respecto al olor; el solo pensar o ver o que le hablan de comida o que se la mencionen, es suficiente para darle asco. Gran postración, debilidad y agotamiento físico y mental. no puede levantar la cabeza de la almohada sin ayuda. Debilidad paralítica. Brusco hundimiento de las fuerzas vitales. Pérdida de fuerzas musculares; parálisis. Enfermedad en ancianos. Rasgos faciales desfigurados. Expresión ansiosa; aspecto enfermizo, triste, sufriente. Gran apetito, pero cesa bruscamente al ver o, peor aún, oler los alimentos, con gran aversión. Se ensucia involuntariamente, no siente cuando salen las heces, peor si son acuosas. Micción involuntaria. Insomnio por excitabilidad nerviosa o por no poder acostarse sobre su lado habitual, el izquierdo. Sacudidas durmiendo.

Conium

Hay en Conium un deterioro mental progresivo, que se evidencia en su incapacidad para la actividad mental, para sostener un esfuerzo o trabajo intelectual (que lo fatiga) o también físico; es indolente, le falta voluntad; lento en su modo de ser; actuar (en sus movimientos) y pensar. Lentitud en la vejez. Está confuso, le cuesta fijar la atención o comprender lo que oye o lee. Sus sentidos están obtusos. Le cuesta aprender. Su memoria está disminuida, especialmente para las fechas; no puede expresarse correctamente. Sensación de cansancio cerebral. El debilitamiento mental puede llegar a la imbecilidad. Aversión a la sociedad, a la gente, a los que pasan hablando cerca de él. Debilidad paralítica progresivamente creciente y ascendente, comenzando en los miembros inferiores. Parálisis muscular sin espasmos. Parálisis y paresias. Ataques apopléticos en ancianos. Debilidad en los viejos; no pueden estar parados sin vacilar, sobre todo en la oscuridad. Brusca debilidad o pérdida de fuerzas caminando. Especialmente útil en enfermedades de viejos. Adormecimiento y frío en un lado de la cabeza.

Sensación de cerebro dormido. Apoplejía para parálisis, en ancianos. Parálisis de los musculares oculares. Cara pálida; enfermiza. Habla con dificultad. Constante tendencia a tragar, con deglución involuntaria. Elimina heces durmiendo. Polaquiuria nocturna, a veces involuntaria. Micción gota a gota; en viejos. Enuresis. Sensación de debilidad falta de fuerzas y temblor en los miembros inferiores, peor por caminar con marcha vacilante; arrastra los pies. Parálisis indoloras o paresias en los miembros inferiores; no puede caminar. Pies y manos fríos; pies torpes e insensibles. A los 5 minutos de dormirse, se despierta bañado en sudor, más en la mitad superior del cuerpo. Sueño interrumpido. Insomnio. Se sobresalta durmiendo. Suda apenas se duerme, o incluso sólo por cerrar los ojos.

Ethylicum

Agresividad e irritabilidad, con violencia verbal, injurias y grosería. Tendencia a estar solo; se aparta de su familia y de sus relaciones habituales. Pérdida del pudor; exhibidores y agresiones sexuales. Disminución de las facultades intelectuales, que puede llegar a la confusión, al coma o a encefalopatías con déficit mental progresivo y apatía. Disminución de la memoria, amnesia anterógrada progresiva, lagunas de amnesia con tabulación, amnesia con euforia, falsos recuerdos y reconocimientos. Desorientación en el tiempo; parece más corto, alteraciones cronológicas. Disartria pastosa, lenguaje incoherente. Alucinaciones: especialmente zoopsias de pequeños animales agresivos. Anestesia e hipostesia superficial al dolor. Polineuritis sensitivo motrices, especialmente en la mujer con parestesias nocturnas. Incoordinación, marcha titubeante; Incoordinación motriz de tipo atáxico. Hipotonía muscular. Arterias temporales visibles y sinuosas. Polineuritis: con choque de la punta del pie en los obstáculos (no puede levantar la punta del pie) somnolencia: se duerme a toda hora. Insomnio con agitación. Se despierta con malhumor.

Glonoinum

Confusión: como si estuviera intoxicado; de noche al despertar; caminando al aire libre. Falta de memoria. No puede recordar en qué lado de la calle vive, no puede encontrar su casa; se pierde aun en calles muy conocidas, porque no las reconoce; está confundido: las calles (y las cosas más familiares), le resultan raras, extrañas, y el camino hasta su casa le parece muy largo; no puede decir dónde está ni donde estuvo. No sabe quien es él mismo, ni reconoce a nadie, ni a sus parientes más cercanos; rechaza a su esposa y a sus hijos. Miedo como si algo desagradable le fuera a suceder. No quiere hablar; apenas contesta. Accesos maníacos con intensa agitación mental; lucha con gran violencia, salta de la cama, corre e intenta saltar por la ventana. Gran tendencia a repentinos y violentas irregularidades de la circulación, que se manifiestan por bruscas congestiones u oleadas de sangre que suben, especialmente hacia el tórax (corazón) y la cabeza o alternativamente a uno u otro sitio. Objetivamente, se aprecian venas y arterias dilatadas y con violentos latidos en la cabeza, cuello y corazón. Intensa congestión cefálicas o del cerebro. Cara pálida durante el calor y la insolación. Le cuesta hablar, por paresia lingual o de los órganos de la palabra o por pesadez de la lengua. Cuello congestionado, hinchado; latidos visibles en las arterias del cuello. Siente el latido del pulso en los dedos de las manos, hasta las puntas. Temblores en los dedos.

Helleborus Níger

Un embotamiento sensorial, un estado en el que, con la visión intacta, nada se ve muy netamente, y el paciente no presta ninguna atención a nada; con la audición perfectamente sana, nada es oído claramente, a menudo, sin ideas, donde el pasado es olvidado o apenas recordando; en el que nada le produce ningún placer; en el que el sueño es muy liviano y nunca hay un verdadero sueño reparador. Hay una lentitud de las percepciones sensitivo-sensoriales, de la comprensión y de las respuestas; hay una dificultad o, incluso, una verdadera ruptura de origen central, de las asociaciones sensitivo-motrices y de la ideación; la mente parece haber perdido el comando de su cuerpo, y los músculos rehúsan obedecer apenas la mente se distrae de ese objeto o no es fijada fuertemente en lograr una respuesta muscular (si habla, se le cae lo que tiene en la mano); no puede trabajar. Está como ausente, distraído, piensa mucho tiempo antes de contestar o contesta muy lentamente, o confusamente (como si pensara en otra cosa), o rehúsa contestar, por el esfuerzo mental que le exige. Habla lentamente. Hay una verdadera deficiencia de ideas, llegando en un grado mayor, a la imbecilidad (el imbécil que grita cuando se ocupan de él) o a la idiocia. Habitualmente, tiene la mirada fija en un punto y no puede pensar. Afectivamente, este estado mental se traduce en una marcada indiferencia o apatía a todo: a sus seres queridos, a sus parientes o amigos, a toda diversión o placer, a toda impresión externa, a las cosas. No pide nada ni pregunta nada ni exige nada, ni dice nada. El intelecto lento o disminuido se manifiesta también en el menoscabo de la memoria, que es deficiente: olvida lo que ha oído o leído o dicho, o lo que está por decir, y también las palabras. En el sueño hay gritos involuntarios y gemidos o lamentos. Suspiros involuntarios. Deseos de esconderse. Irritable, se encoleriza fácilmente, sobre todo si lo interrumpen o cuando le hablan. Peor por el consuelo. Aversión a la compañía. Reservado, concentrado en sí mismo. Sacudidas en los músculos mientras duerme. Parálisis indoloras. Debilidad paralítica: se desliza hacia abajo en la cama. Consecuencias o efectos de una anestesia general. Mueve la cabeza de un lado al otro constantemente, con quejidos, cuando la tiene apoyada en la almohada, o la hunde mucho en la almohada. Mirada fija en un punto, ausente; durante el estupor ojos muy abiertos, con insensibilidad a la luz. Pupilas dilatadas (más una que la otra) o alternativamente contraídas y dilatadas, o contraídas; arreflexia pupilar a la luz. Cara pálida; hundida; edematosa. Mandíbula colgante. Movimientos de masticación o como si marcara algo, involuntarios. Siente como si los intestinos no tuvieran fuerzas para evacuar, aún con heces blandas. Heces involuntarias. Movimientos automáticos o involuntarios de los miembros de un lado, mientras que los del otro están completamente paralizados. Falta de fuerzas en las manos. Falta de estabilidad en las piernas. Debilidad en miembros inferiores; en pies. Sueño soporoso con quejidos, gritos y sacudidas. Somnolencia, con ojos semi cerrados y vueltos hacia arriba. Insomnio.

Hyosciamus

Del tipo murmurante o refunfuñante o gruñón de tono grave. Delirio alucinatorio pasivo. Estuporoso y refunfuñante. El paciente hace payasadas; o salta bruscamente de la cama y se escapa, o intenta escapar, sobre todo a la calle. Sufre alucinaciones de todo tipo, visuales o tiene visiones o tiene visiones, ve animales, gatos; o personas muertas (con las que habla) o

figuras o fantasmas, o quiere agarrar apariciones imaginarias. que está lejos de su casa o está en ella. Quiere estar desnudo, en el delirio. Exhibe sus genitales; obsceno: dice, hace y canta cosas obscenas. Es totalmente impúdico, no le importa exponer su desnudez. Quiere escapar, porque cree que lo persiguen y lo quieren envenenar o matar. Hay una marcada agresividad en su comportamiento. Está lleno de miedos: de estar solo, a los perros, y de ser mordido. Casi constantemente gesticula, hace gestos o cosas raras, extrañas o ridículas. Tiene movimientos carfológicos y pellizca o manosea la ropa de cama. Se habla a sí mismo, o cree que habla con personas ya muertas o imaginarias, o contesta preguntas que no le han hecho. Habla dormido, confesándose en voz alta. Al hablar, no encuentra las palabras apropiadas para expresarse. No reconoce a nadie, ni a sus parientes. Se ríe constantemente o excesivamente o ruidosamente o tontamente. Memoria escasa: para lo que acaba de hacer o pensar; para lo que ha oído o dicho o leído. Está sentado rígido, solemne; o quieto en un rincón y refunfuña. Gran debilidad; postración, se desliza en la cama hacia abajo. Cara distorsionada. Parálisis de la lengua, peor al querer sacarla, choca contra los dientes. Evacuaciones involuntarias por parálisis del esfínter anal; peor durmiendo. Emisión involuntaria de orina. Temblor en brazos y manos. Contracción de los dedos de los pies al caminar o ascender. Intenso insomnio en personas irritables o excitables. Insomnio por excesiva excitación nerviosa.

Kali Carbonicum

Irritable al más alto grado, con su familia y habla consigo mismo. Evita el contacto de la gente. Nunca está tranquilo ni contento. Ansiedad con miedo. Inquietud ansiosa. Debilidad intelectual, distracción. Demasiado agotado para hilvanar una respuesta.. Dificultad para concentrarse, peor de 6 a 10 p.m. incapaz de mantener un esfuerzo mental. Utiliza mal las palabras y las sílabas. Embotado. Confuso. Aburrido. Ataque súbito de inconsciencia. Falta de memoria. Enfermo debilitados, agotados, anémicos, siempre cansados. Para enfermedades de viejos con edemas y parálisis. Confusión y pesadez de cabeza; se siente estúpido, confuso, como ebrio. Temblor de cabeza, y sensación de algo movable. Color de la cara: amarilla o pálida o enfermiza, con ojos hundidos. Garganta lastimada, con dolores lancinantes al tragar. Dificultad para tragar. Dificil deglución provocado por inercia de los músculos del esófago. Ansiedad en estómago. Obstrucción por inactividad intestinal y rectal, falta de movimientos peristálticos; deseos infructuosos de evacuar. Emisión involuntaria de orina al toser, estornudar, etc. Ahogo fácil. Sensación de obstrucción en laringe. Debilidad de los músculos del cuello. Sensación de parálisis y rigidez en espalda. Parálisis de muslos. Somnolencia y bostezos. Gran somnolencia durante el día y temprano al anochecer. Insomnio después de las 2 a.m. o después de 10 a 2 a.m. Sensación ardorosa y picazón lancinante, en piel.

Lachesis

Excesiva locuacidad, ansiedad, confusión mental, delirio, dificultad para comprender, sensación de abandono, asustadiza, irritabilidad, cansancio de vivir, tristeza, sobresaltos y agotamiento mental. Memoria escasa para lo que ha sucedido o leído u oído; para la ortografía y las letras o para el tiempo. Hay una aversión al trabajo mental, que le llega a resultar imposible; o bien desea hacer un trabajo mental al anochecer. Aversión a leer. Puede haber tanto una fácil

comprensión, como una dificultad para concentrarse o una confusión mental, especialmente marcada con respecto a los horarios y la ubicación en el tiempo, acentuándose su confusión al despertar a la mañana o caminando. No reconoce a sus parientes o calles bien conocidas. Distráido. Es olvidadiza, sobre todo en la menopausia, sobre todo de palabras mientras habla (trata de recordarlas), o de todo lo que sucedió en 6 años. Se equivoca al ubicar las palabras cuando habla, al escribir y sobre todo el tiempo, en las horas y en los días de la semana; siente que el tiempo pasa muy lentamente. Puede tener una conducta o adoptar actitudes netamente agresivas: muerde. Aversión a las mujeres. Lo agravan los esfuerzos mentales o pensar. Se sobresalta: por ruidos; al dormirse, durmiendo, y al despertar. Siente como si tuviera dos voluntades dentro de él. Agravación por el sueño. Intolerancia a la contricción y al menor contacto. Trastornos que aparecen en la menopausia, o que comienzan a partir de ella. Gran agotamiento físico y mental, con temblores en todo el cuerpo. Ataques de apoplejía que aparecen durante el sueño, o en la menopausia. Visión turbia, como si mirara a través de un velo. Cara pálida, adelgazada, cadavérica; con ojeras azuladas. Saca la lengua con dificultad, y choca o se detiene detrás de los dientes. Temblores en la lengua, peor al sacarla. Sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no mejora tragando. No tolera las ropas ceñidas. Micciones involuntarias. La respiración se detiene apenas se duerme o durante el sueño. Parálisis de las manos. Temblores de las manos en bebedores. Insomnio antes de medianoche. Alternan somnolencia e insomnio cada dos días.

Lycopodium

Falta de confianza en sí mismo, en su capacidad y en sus aptitudes para conectarse o enfrentarse con el medio que lo rodea. Su memoria es escasa, sobre todo para expresarse, para los nombre de las letras, para los nombres propios, para las palabras, para la ortografía, para lo que ha leído. Se equivoca, tiene errores; al calcular; al hablar o al emitir palabras, las coloca mal; contesta con sílabas equivocadas o usa palabra inadecuadas; al escribir, agrega letras u omite letras, palabras o sílabas, o traspone letras o escribe palabras equivocadas. Olvidadizo de las palabras cuando habla; en niños; en ancianos. Se concentra con dificultad. Llanto: ruidoso, sollozante; que alterna con risas. Tristeza de mañana al despertar o al anochecer. Cree estar en varios sitios, o en dos sitios al mismo tiempo; que está enfermo; que ve moscas. Carfología, pelliza la ropa de cama. Afectado al hablar; afasia; habla y pasa rápido de un tema a otro. Adelgazamiento de arriba abajo, comenzando en el cuello, y aún comiendo mucho; sobre todo en ancianos. Senectud precoz; parece más viejo de lo que es, con arrugas profundas y prematuras. Enfermedad profundas, progresivas, crónicas. La cabeza gira involuntariamente hacia la izquierda; movimientos involuntarios, como un cabeceo, a la derecha y a la izquierda alternativamente. Cara pálida, amarillenta; o gris amarillenta. Pesadez o rigidez de la lengua, no se entiende lo que habla. La última parte de la frase la dice tartamudeando. Movimientos involuntarios de la lengua; oscilantes hacia delante y atrás. Verdadera aversión a la comida. Su saciedad es rápida, a veces con un solo bocado. Su apetito se incrementa durante la noche, y llega a impedirle dormir, o lo despierta, y debe comer algo. Micción retardada, debe esperar un rato antes de poder comenzar a orinar. Incontinencia de orina. Temblor involuntario de las manos. Sueño interrumpido frecuentemente; no lo descansa. Duerme con los ojos medio abiertos.

Medorrhinum

Sensación de que el tiempo pasa muy lentamente para su forma de ser o su gusto, hasta el extremo de que lo que hizo hace una hora le parece que ocurrió hace una semana. Es olvidadizo, su memoria es muy deficiente; olvida su propio nombre y, aunque trata de recordar, no puede recordar nombres, palabras comunes y, sobre todo, la letra inicial de las palabras; tiene que preguntar el nombre de su mejor amigo. Pierde el hilo de la conversación, por que se olvida de lo que acaba de decir o de lo que va a decir, no puede terminar la frase al hablar. No recuerda lo que acaba de oír, de leer o de pensar, o lo que va a escribir. Tiene dificultad en exponer sus síntomas, se asombra de cómo se pronuncia una palabra muy conocida; hay que repetirle las preguntas cuando se pierde en el relato. Se equivoca al hablar y al escribir; tiene errores de tiempo, confunde presente con pasado. Intelectualmente, se concentra con dificultad, especialmente sobre temas abstractos; está tan confuso, que llega a impedirle darse cuenta de su propia identidad. Está como embotado, obtuso, ausente. Aturdido al despertar. Tiene alucinaciones; cree que las personas son ratas o insectos; piensa que hay alguien detrás de él, o lo ve o lo oye susurrar o cuchichear; ve caras que lo espían detrás de las cortinas, cree que alguien camina detrás suyo o lo persigue y le da miedo, así como de algo que sale arrastrándose de cada rincón; siente una mano delicada que acaricia su cabeza desde la frente hacia atrás. Todo le parece irreal, como en un sueño; aún las cosas familiares. Agotamiento profundo, peor a la mañana al despertar. Vértigo después de haber dormido, como si estuviese intoxicado. Cara pálida, cetrina, amarillenta, terrosa o verdosa; de aspecto enfermizo. Casi no puede tragar. Sólo puede mover el vientre inclinándose mucho hacia atrás. Enuresis nocturna: elimina cada noche enormes cantidades de orina. Es uno de los más importantes remedios de la enuresis. Tenesmo doloroso véxico-rectal cuando orina. Pérdida de fuerza en los miembros; se agota por el menor esfuerzo. Se le duerme el miembro superior izquierdo, y muslo y pierna izquierdos. Temblor en brazos y manos. Cuando camina, tiene dolores en las caderas, rodillas y piernas; gran pesadez, debilidad y temblores en los miembros inferiores. Intensa inquietud en las piernas y pies, que lo obligan a moverlos constantemente, no puede estar quieto. Bostezos espasmódicos, no puede evitarlos. Insomnio antes de medianoche. Prurito incesante e intenso, el prurito es tan intenso, que debe rascarse hasta sangrar.

Mercurius

Memoria escasa, débil; para nombres propios, personas o lugares se olvida de lo que acaba de leer, de lo que ha dicho o lo que estaba por decir, o adonde va. Tiene un déficit de ideación, se concentra con dificultad, sobre todo para escribir o calcular (es incapaz de hacer cálculos), es olvidadizo, está ausente, aturdido y hasta confuso, especialmente después de comer, no sabe donde está y llega a perderse en calles bien conocidas o a no reconocer a sus parientes o a su propia casa. Tiene errores cuando habla (coloca mal las palabras), al leer, al calcular o cuando habla de lugares o localidades. Inquietud: a las 20 horas; ansiosa; de noche; da vueltas en la cama o lo saca de ella o lo hace ir de una cama a la otra. Aversión a miembros de la familia, a todas las personas, a las bromas; es descortés, o indiscreto, sin tacto. Su comportamiento puede ser cambiante o absurdo: escupe a la gente en la cara, o escupe en el piso y lo lame. Tiene alucinaciones, sobre todo de noche: cree que está rodeado de enemigos, que cada

persona es un enemigo, que es perseguido, que ve fantasmas de noche o perros o ve correr agua. Temblores. Enfermedad de Parkinson (“El mejor remedio general para esta enfermedad”) Debilidad, con temblores, que se acentúan por el menor esfuerzo, por los sudores o después de mover el vientre. Adelgazamiento. Cierre espasmódico de los ojos, al mirar. Rasgos distorsionados. Cara abotagada o hinchada, sobre todo alrededor de los ojos. Temblores en la lengua. Tartamudea y, sin embargo, habla rápido; habla con dificultad. Regurgitaciones después de comer o beber. Deseos de orinar constantes o muy frecuentes, a veces repentinos y urgentes, puede orinarse si no se apura. Enuresis nocturna. Calambres en manos y dedos. Temblores en las extremidades, sobre todo por excitación, por el movimiento o caminando. Temblor en las manos al asir objetos. Temblor paralítico o con debilidad. Excesiva somnolencia de día, sueño profundo y prolongado de noche. Insomnio antes de medianoche, y se despierta muy temprano a la mañana. Sueño inquieto y muy liviano.

Natrum Muriaticum

En otros casos, la respuesta a las noxas emocionales se orienta hacia un profundo resentimiento hacia aquellas personas que considera, con fundamento o no, como los causantes de sus problemas, llegando a veces a una aversión. Es uno de los pacientes en que es más intenso el deseo de soledad; tiene verdadera aversión a la compañía, está mejor solo. Se sobresalta fácilmente, sobre todo por un susto, por ruidos bruscos. Intelectualmente, tiene dificultad para pensar y comprender, se concentra con dificultad (peor cuando habla). Confusión mental peor por esfuerzos mentales, después de comer, hablando, leyendo, caminando, sentado o después de levantarse; a veces sobre su identidad o con una sensación de dualidad. Puede haber un déficit de ideas o hasta una imbecilidad o diversos grados de oligofrenia. Generalmente es irritable. Alucinaciones; ve fantasmas (al cerrar los ojos, conversa con ellos), cree que es perseguido. Adelgazamiento marcado. Torpe, se le caen las cosas. Prurito en la cabeza. Cara amarillenta, pálida, con aspecto avejentado. Hambre intensa, sin apetito. Anorexia. Heces que salen involuntariamente; no sabe si salen gases o heces. Se orina involuntariamente: de noche en cama (enuresis nocturna). Diseña al subir escalera o por esfuerzos. Debilidad paralítica en piernas y pies. Contracción dolorosa de los flexores de las piernas. Insomnio. No puede volver a dormirse después de despertarse.

Nux Vomica

Exagerada hipersensibilidad a factores de todo orden. Es hipersensible a la luz, a la música, a los ruidos. Sumamente irritable, iracundo, colérico, violento. Impaciente, dispuesto a la ira. Se ofende fácilmente. Cuando se pone fuera de sí y pierde todo control. Tiene dificultad para concentrarse especialmente cuando estudia lee o hace cálculos, está incapacidad para el trabajo mental le impide llevarlo a cabo o lo fatiga o trastorna tanto, que le tiene aversión. Hay confusión mental, especialmente después de comer, al hacer cálculos, después de una orgía o por bebidas alcohólicas. Tiene dificultad para pensar y entender cuando lee o hace esfuerzos mentales. Es olvidadizo (más si es un alcoholista⁹ de las palabras al hablar, por pérdida de fluidos vitales o por esfuerzos mentales. A menudo se equivoca, especialmente al hablar; coloca mal las palabras o usa las palabra inapropiadas u omite algunas o da respuestas equivocadas;

tiene poca memoria para expresarse, o habla como si estuviera intoxicado o drogado, o con dificultad, o tartamudea, o con monosílabos; afasia post-apopléjica. Imbecilidad. Deseos de escapar. No tolera que lo miren ni que lo toquen. Delirium tremens, con hipersensibilidad, inconsciencia o insomnio. Alucinaciones o ilusiones: cree estar fuera de casa; ve cuerpos mutilados; ve gente que le hace toda clase de bromas o lo atormentan con preguntas que debe contestar; ve caras o gusanos que se arrastran. Insania: producida por mucho trabajo mental. No puede leer por pensamientos incoherentes. Ideas fijas. Flujo de ideas a la noche en cama, con insomnio. Efectos agudos o crónicos de intoxicaciones o de drogas de todo tipo, incluso medicamentosas, o de cantidades excesivas de café, tabaco y bebidas alcohólicas, incluyendo el vino. Espasmos con rigidez tetánica generalizada, trismo y opistótonos, con intervalos de pocos minutos en que los músculos se relajan. Pesadez general con tendencia a estar sentado o acostado. Suda una sola mitad de la cabeza. Ojeras, con cara enfermiza y nariz afilada. Cara pálida, terrosa; amarillenta (más alrededor de boca y nariz) Tiene hambre, pero sin apetito. Es muy sensible a la ropa en el vientre. Deseos de mover el vientre cuando orina. Orina con frecuencia, con deseos dolorosos, urgentes, y, a veces, ineficaces. Tiene que apurarse, o se orina. Pies fríos por esfuerzos mentales. Temblores; en las manos, en el “delirium tremens” Rigidez en los miembros inferiores. Somnoliento después del almuerzo o de comer. Insomnio después de medianoche. Muchos bostezos y desperezamiento de día. Paciente muy friolento.

Opium

Todos los trastornos de Opium se acompañan de gran sopor o un sueño muy profundo. Anestesia en la piel y una verdadera analgesia en los órganos internos. Hay grados de obnubilación intelectual, que puede, en sus menores expresiones, manifestarse en un estado de beatitud o de tranquilidad, serenidad y calma. Hay una indiferencia a todo, pero en especial a todo lo que signifique alegría o placer. Al acentuarse la indiferencia, da paso a un estado de estupefacción como si estuviera intoxicado. Estupor apopléjico, con la mandíbula colgante. Cara roja oscura con sudores calientes y mandíbula colgante, con incontinencia de esfínteres. En su delirio, a veces hace cosas absurdas como rodar o dar vueltas por el piso o mostrarse impúdico o cantar monótonamente o ser muy desconfiado. Uno de los más importantes medicamentos del delirium tremens. Las alucinaciones e ilusiones son de tipo muy variado: ve animales, ve caras horribles, o cree que la gente quiere ejecutarlo que está fuera de casa y debe volver a ella, trastornos de origen emocional. Memoria escasa para lo que ha leído o para las palabras, o no reconoce a sus allegados. Imbecilidad. Durante el sueño: se queja, se sobresalta, habla, llora y, más que nada, camina dormido. Es hipersensible al más leve ruido, se sobresalta. Habla confusamente o pasando de un tema a otro rápidamente. Piensa continuamente que no está en su casa y tiene deseos de irse a ella. Ausencia de reacción o de reactividad, que se manifiesta, por un lado, en el sopor, la insensibilidad y la inconsciencia. Siente la cama tan caliente que no puede estar acostado en ella, o se mueve a menudo buscando un sitio fresco. Vejez prematura. Pupilas insensibles a la luz, inmóviles, dilatadas o muy contraídas. Cara congestionada, abotagada, de color rojo intenso. Expresión atontada; avejentada; somnolienta. Constipación por atonía intestinal, no siente ningún deseo de evacuar. Heces involuntarias, encoprexis. No siente que la vejiga está llena no le incomoda. Parálisis en los miembros superiores o inferiores; indoloras. Movimientos convulsivos en las extremidades; sacudidas.

Sueño letárgico o comatoso. Tiene sueño, pero no se puede dormir. Insomnio con gran hiperacusia.

Phosphoricum Acidum

Consecuencias, mentales y físicas, de noxas emocionales. Los efectos de estas noxas se manifiestan por un profundo debilitamiento o agotamiento nervioso. El debilitamiento mental se expresa, por medio de una indiferencia o apatía o desinterés por todo lo que pasa a su alrededor, por las cosas habituales de la vida. El paciente no quiere nada, ni hablar, está tranquilo, y todo le resulta indiferente porque no puede pensar. Asociada generalmente a la indiferencia, hay una marcada lentitud y torpeza intelectual. Hay un estado de confusión o aturdimiento, no puede pensar. Le cuesta mucho concentrarse. Es incapaz de reunir dos ideas juntas, no piensa en nada; sus pensamientos se le desvanecen, más de mañana o al leer. Contesta a las preguntas lentamente o en forma monosilábica, y piensa mucho antes de responder. Hay una pobreza de ideas y una incapacidad para el trabajo intelectual; hay aversión a pensar y al trabajo mental. Su memoria es escasa, para los hechos del día, para lo que ha leído, para las palabras; se olvida de las palabras cuando habla. Habla lentamente de un modo ininteligible, incoherente o monosilábico. Imbecilidad. En personas originalmente fuertes que se han debilitado físicamente y anímicamente, por una larga sucesión de problemas emocionales. El cabello encanece precozmente, se pone grasoso, o delgado y lacio o como estopa, o cae, especialmente después de penas o shocks morales. Las heces salen involuntariamente al pasar flatos o durmiendo o al moverse; incontinencia de fecales y orina simultáneamente: como si el ano quedara abierto. Urgencia irresistible para orinar. Enuresis nocturna. Debilidad en las piernas; un paso en falso lo puede hacer caer. Insomnio por agitación. Durante el sueño, hay movimiento de las manos, sacudidas, quejidos, habla, canta, ríe, llora; con ojos semiabiertos y convulsos. Sueña. Hormigueo en todo el cuerpo.

Phosphorus

Estado de apatía o indiferencia a todo, especialmente a sus seres queridos, a sus hijos y relaciones. Le cuesta pensar, entender, concentrarse, no puede pensar mucho y, por consiguiente, tiene una verdadera aversión a pensar. Hay un estado de confusión agravada de mañana al levantarse, o al despertar o después de comer por esfuerzos mentales. Aturdido; solo entiende las preguntas cuando se las repiten y, o rehúsa contestar, o piensa mucho antes de hacerlo, o contesta muy lentamente. Habla incoherente y lentamente, y hay un tono general de lentitud, tanto intelectual como físicamente, en sus movimientos. Existe en muchos casos un verdadero déficit de ideas, que puede llegar a estados de oligofrenia (idiocia, imbecilidad). Memoria escasa; olvidadizo, es hipersensible a la música, a la luz, a los ruidos, al menor ruido. Alucinaciones: da vueltas en la cama para juntar los pedazos en que está dividido; piensa que todo está cambiando; ve que sale algo arrastrándose de un rincón; oye voces; ve fantasmas o personas ya fallecidas o caras que miran desde los rincones. Siempre cansado; hay una fácil agotamiento por el menor esfuerzo. Desmayos repentinos, peor en una habitación llena de gente. Sensación de cansancio en la cabeza. Cara abotagada, sobre todo alrededor de los ojos. Sensación de vacío o languidez o desfallecimiento, en toda la cavidad abdominal. Fácil

excitabilidad sexual. Ansiedad precordial con náuseas. Debilidad paralítica en los miembros, que tiemblan por el menor esfuerzo. Debilidad en los miembros inferiores al subir escaleras. Marcha vacilante. Somnolencia acentuada después de comer o durante el día. Insomnio antes de medianoche.

Plumbum

Triste, taciturno, deprimido, cansado de la vida; descorazonamiento; gran angustia y malestar. Miedo de ser asesinado o envenenado, piensa que cada persona que lo rodea es un asesino; con gran ansiedad e inquietud. Demencia de la parálisis general progresiva. Percepción lenta, torpeza intelectual progresiva. Debilidad o pérdida de la memoria. Incapaz de encontrar las palabras apropiadas para expresarse, cuando habla. Imbecilidad. Adelgazamiento excesivo y rápido, general o parcial, especialmente de las partes doloridas o paralizadas, con atrofia muscular. Atrofia muscular progresiva. Lentitud en la conducción de la sensibilidad, en su percepción y respuesta. Anestesias; adormecimiento; analgesias. Embotamiento de la actividad nerviosa, llegando a las parálisis, especialmente de músculos extensores. Temblores por emociones o por el menor esfuerzo. Los síntomas se desarrollan lentamente, desaparecen por un tiempo y vuelven a aparecer. Cara pálida, amarillenta, hipocrática; cetrina, con rasgos que expresan sufrimiento y gran ansiedad o distorsionados. Regurgitaciones con gusto a comida. Abdomen, retraído y duro, hundido, cóncavo, con la sensación de que tocará la columna. Micción gota a gota, de orina oscura, escasa. Parálisis en las extremidades, indoloras, especialmente en los extensores, hemiplejía derecha. Parálisis del antebrazo derecho, de las muñecas. Parálisis en los miembros inferiores. Gran debilidad en miembros inferiores.

Secale Cornutum

Alineación mental. Se ríe; risa sardónica, espasmódica. Falta de vergüenza, impudicia, expone su persona; necesita estar desnudo, y le es indiferente que lo vean, porque a menudo lo hace por la necesidad de aire frío que siente y que lo mejora, en contacto con su piel. Toda la superficie de su cuerpo está fría, se la siente fría al tacto, como hielo. Útil en mujeres delgadas o flacas, débiles, caquéticas. Gente anciana, decrepita, débil. Adelgazamiento de las partes afectadas; en viejos. Adormecimiento de partes. Hormigueo o cosquilleo bajo la piel, especialmente en las extremidades (manos, puntas de los dedos, muslos, piernas, pies y dedos) Cara descolorida, afilada, hundida. Cara hinchada; rasgos distorsionados, risa sardónica. Retención de orina con deseos ineficaces; por parálisis vesical. Enuresis en ancianos. Rigidez de nuca. Frío en la espalda. Cosquilleo e insensibilidad en la espalda. Insensibilidad o anestesia de las partes afectadas. Miembros fríos o helados. Intensa somnolencia. Sueño letárgico, profundo, con agitación y calor seco o fiebre.

Selenium

Muy olvidadizo, especialmente en asuntos relacionados con su ocupación o trabajo, pero cuando duerme sueña con lo que había olvidado. El trabajo mental lo cansa, y hay una absoluta incapacidad para llevar a cabo cualquier tarea en su ocupación. Difícil comprensión. Se equivoca al hablar, en las sílabas de las palabras, o pronuncia incorrectamente algunas

palabras. Miedo a la sociedad. Aversión a la compañía, aún de amigos íntimos. Gran agotamiento físico y mental, fácil agotamiento; debilidad a menudo repentina. Vejez prematura. Gran adelgazamiento general o de las partes afectadas o de ciertas partes en ancianos. Cara grasosa, brillante; adelgazada. Sacudida en los músculos faciales. Tartamudea. Articula las palabras con dificultad. La orina gotea después de orinar o de defecar, o involuntariamente cuando camina. Espermatorrea cuando mueve el vientre, o gotea semen, sobre todo durmiendo. Salida de líquido prostático al defecar y después, estando sentado y caminando; gotea, aún sin erección. Manos adelgazadas. Adelgazamiento en las piernas. Deseo irresistible de estar acostado y dormir, porque pierde las fuerzas bruscamente, sobre todo por el calor del día. Tiene sueño temprano a la noche, pero hay insomnio antes de medianoche y se despierta con frecuencia durante la noche.

Stramonium

Delirio furioso, rabioso, violento, salvaje, feroz, con agitación extrema y violenta, y completa ausencia de dolor, con movimientos desordenados y constantes de los músculos de la cara y miembros. El delirio es locuaz, con una locuacidad extraordinaria (habla sin interrupción), a veces murmurante o farfullante, ininteligible, o balbuceante, incoherente, o tontamente, sin sentido. Delirio erótico, con lascivia, lenguaje y cantos obscenos, deseos de estar desnudo o exhibirse con total impudicia. Se asusta fácilmente; se despierta aterrorizado como si fuera por lo primero que ve y grita, no reconoce a nadie y se adhiere al que está más cerca. Concentración difícil; confusión mental, peor cuando suda. Carfología: agarra o quiere alcanzar algo, rápido; o pellizca las cobijas. Hace gestos ridículos o tontos. Comportamiento infantil. Como si estuviera en un sueño. Imbecilidad. Memoria escasa. Llama a las cosas con nombres equivocados; coloca mal las palabras, o dice una palabra por otra. Corea especialmente en la parte superior del cuerpo, con movimiento giratorio, rítmico y gráciles, más en los miembros superiores. Debilidad, con necesidad de estar acostado. Síntomas como de vejez. Parálisis general progresiva. Ojos muy abiertos (en el delirio), prominentes, brillantes; mirada fija, vidriosa. Pupilas muy dilatadas e insensibles a la luz; arreflexia pupilar. Se le confunden las letras cuando lee. Cara muy roja o muy pálida; congestionada; abotagada. Expresión de terror o ansiedad, o idiota; rasgos distorsionados. Risa sardónica, Trismo; o mandíbula colgante. Habla con dificultad o no puede hablar. Tartamudez, tiene que esforzarse un largo rato hasta que puede emitir una palabra; y distorsiona la cara. Habla en forma ininteligible, o entre dientes. Constricción espasmódica de los músculos de la garganta (al tragar) y del esófago, impidiendo toda deglución. Sale sangre coagulada del ano; o salen inconscientemente heces flojas. Frecuentes deseos de orinar, pero solo gotea orina. Incontinencia de orina. Temblor de las manos en el delirium tremens. Somnolencia diurna. Sueño profundo con ronquidos y gritos o llanto. Sueño inquieto. Duerme arrodillado. Se despierta por el menor contacto, con gritos y gestos salvajes. Tiene sueño y no puede dormir.

Syphilinum

Su memoria es escasa; no puede recordar los nombres propios de personas que frecuenta o a las personas mismas, o fechas, o títulos de libros que ha leído o posee, o nombres de lugares o

calles de una ciudad que conoce muy bien. Imposibilidad casi absoluta de concentrar sus pensamientos. Se equivoca en los cálculos. Imbecilidad. Confusión cuando hace cálculos. Afasia. No quiere ser apaciguado y se irrita mucho si lo contradicen. Aversión a la compañía. Apatía o indiferencia, aún por el futuro o por sus seres queridos o parientes. Habla con lentitud. Adelgazamiento extremo de todo el cuerpo. Parálisis del músculo oblicuo superior; ptosis de los párpados superiores, dándole un aspecto somnoliento. Parálisis facial preferentemente derecha, con dificultad para hablar. Micción difícil y lenta pero indolora; debe hacer fuerza. Insomnio absoluto, peor después de medianoche; se despierta a medianoche y no puede volver a dormirse hasta las 6. Inquietud de noche, no puede mantener las piernas quietas.

Tuberculinum

Ansiedad, dificultad en pensar y comprender. Intelectualmente, tiene dificultades en pensar y comprender, está como aturdido o embotado. Está peor por los esfuerzos mentales, pudiendo llegar a presentar trastornos por surmenage intelectual. La memoria es escasa, sobre todo para recordar personas, o lo que acaba de decir o está por decir. Confusión caminando al aire libre. Hipersensible a los ruidos. Todo en la habitación le parece extraño, como si estuviera en un lugar extraño. Presenta un adelgazamiento progresivo, rápido y acentuado, aún sintiéndose bien. Mete profundamente la cabeza en la almohada, o la mueve haciéndola girar de un lado a otro. Peor por el menor trabajo intelectual. Cara pálida enfermiza, con oleadas de calor. Incontinencia de materias fecales cuando duerme o al salir flatos. Temblor en las manos. Inquietud en las piernas. Somnolencia después de comer. Sueño perturbado después de las 3 horas.

Zincum

Hay una dificultad o una gran lentitud en comprender y en responder. Confusión mental, sobre todo al despertar. Marcada debilidad de ideas. Estupidez progresiva; imbecilidad. Olvidadizo; no recuerda ni lo que ha hecho en el día. Antes de contestar una pregunta, siempre la repite, como si intentara recordarla o fijarla mejor; y contesta lentamente. Hipersensibilidad al menor ruido, a las voces, lo agrava oír hablar a otros, y permanece callado. Atormenta a todo el mundo con sus quejas y sus molestias; gime y se queja constantemente, sobre todo el día. Tiene estallidos de ira, y aun gran inquietud cuando lo dejan solo. Movimientos automáticos e involuntarios en la boca, brazos y manos, pero donde se constituye en el síntoma-clave número uno de Zincum, y que es el que lleva casi siempre a su prescripción, es en los pies: incesante y violenta sensación de agitación o inquietud en los pies o extremidades inferiores, que hace deba moverlos constantemente, aún contra su voluntad y hasta durmiendo; no puede tenerlos quietos. Hay un marcado déficit de vitalidad. Corea con movimientos involuntarios de la boca, cabeza, manos y pies o extremidades inferiores. Frente fría, base del cerebro caliente. Muy sensible a los ruidos. Expresión apática, ausente. Deposiciones involuntarias. Se orina involuntariamente cuando camina, tose o estornuda, y de noche. No tolera que lo toquen ni la menor presión en la espalda. Debilidad en la espalda, peor sentado. Debilidad, temblores y sacudidas o contracciones fibrilares en los músculos de las extremidades. Debilidad y temblor en las manos al escribir; parálisis y palidez o cianosis de las manos. Parálisis por afecciones

neurológicas. Gran inquietud en las extremidades, sobre todo en las inferiores. Sueño alterado, interrumpido a menudo; habla o grita durmiendo, o tiene sacudidas bruscas.

ATAQUE DE PANICO

ACONITUM:

Sus pensamientos giran alrededor de la muerte, de “su muerte”; la presiente, predice el momento en que va a suceder; hay verdadero terror a morir, especialmente durante el embarazo y el parto. Su expresión es ansiosa, asustada, y la vida se le torna miserable por el miedo. Terrible ansiedad, especialmente de noche, y que acompaña al trastorno más trivial de Aconitum, durante los escalofríos, la fiebre o los dolores o cefaleas. Delirio ansioso, de noche. Ansiedad con miedo. Intensa inquietud, con gran ansiedad; constantemente da vueltas en la cama o salta de ella; todo lo sobresalta. Trastornos que sobrevienen a partir de un susto, ya sean agudos o crónicos; y aún en el bebé o niño cuya madre ha sufrido un susto durante el embarazo. Es sumamente sensible a los ruidos, a la luz, a la música (que lo entristece), y a los olores fuertes o desagradables. Niños hipersensibles. Tiene miedo a la oscuridad (quiere la luz), a las multitudes, a sofocarse, ahogarse; antes de la menstruación. Miedo de cruzar la calle; al futuro. Es irritable, violento, con gran excitación nerviosa. Trastornos provocados por ira, con ansiedad y con susto. Ansiedad, ataques de pánico, sensaciones de terror, palpitaciones, enfado con ansiedad; las crisis son habitualmente nocturnas, suele haber miedo a la oscuridad y experimentar gran angustia si están solas. Durante las crisis hay una sensación de muerte inminente y tendencia claustrofóbica, aparecen hormigueos. Sus pensamientos giran alrededor de la muerte, de “su muerte”; la presiente, predice el momento en que va a suceder; hay verdadero terror a morir, especialmente durante el embarazo y el parto. Su expresión es ansiosa, asustada, y la vida se le torna miserable por el miedo. Terrible ansiedad, especialmente de noche, y que acompaña al trastorno más trivial de Aconitum, durante los escalofríos, la fiebre o los dolores o cefaleas. Delirio ansioso, de noche. Ansiedad con miedo. Intensa inquietud, con gran ansiedad; constantemente da vueltas en la cama o salta de ella; todo lo sobresalta. Trastornos que sobrevienen a partir de un susto, ya sean agudos o crónicos; y aún en el bebé o niño cuya madre ha sufrido un susto durante el embarazo. Es sumamente sensible a los ruidos, a la luz, a la música (que lo entristece), y a los olores fuertes o desagradables. Niños hipersensibles. Tiene miedo a la oscuridad (quiere la luz), a las multitudes, a sofocarse, ahogarse; antes de la menstruación. Miedo de cruzar la calle; al futuro. Es irritable, violento, con gran excitación nerviosa. Trastornos provocados por ira, con ansiedad y con susto. Grita por los dolores, a los que es muy sensible. Tiene miedo de morir; de tener algo en el corazón; de que algo terrible le va a pasar. Piensa que no va a curar, que su enfermedad es incurable. Sus pensamientos giran alrededor de la muerte, de “su muerte”; la presiente, predice el momento en que va a suceder; hay verdadero terror a morir, especialmente durante el embarazo y el parto. Su expresión es ansiosa, asustada, y la vida se le torna miserable por el miedo (Allen). Terrible ansiedad, especialmente de noche, y que acompaña al trastorno más trivial de Aconitum; durante los escalofríos, la fiebre o los dolores o cefaleas. Delirio ansioso, de noche. Ansiedad con miedo. Intensa inquietud, con gran ansiedad; constantemente da vueltas en la

cama o salta de ella; todo lo sobresalta. Trastornos que sobrevienen a partir de un susto, ya sean agudos o crónicos; y aún en el bebé o niño cuya madre ha sufrido un susto durante el embarazo.

Es sumamente sensible a los ruidos, a la luz, a la música (que lo entristece), y a los olores fuertes o desagradables. Niños hipersensibles.

Tiene miedo a la oscuridad (quiere la luz), a las multitudes, a sofocarse, ahogarse; antes de la menstruación. Miedo de cruzar la calle; al futuro.

Es irritable, violento, con gran excitación nerviosa. Trastornos provocados por ira, con ansiedad y con susto. Delirio violento.

Los dolores se le hacen intolerables, le producen gran ansiedad y desesperación; la enloquecen (piensa que se va a volver loca) y la hacen gritar, peor de noche, con gran inquietud.

ARGENTUM NITRICUM:

Tiene temor a morir con gran ansiedad anticipatoria y lo asaltan pensamientos extraños; que si mira la ventana o la abre y se arrima a ella le ías impulsos de saltar por la ventana, temor de sus propios impulsos, de tirarse debajo de un tren si esta cerca de las vías, etc.

ARSENICUM:

Es similar a Phosphorus pero tiene una gran ansiedad con temor a morir si esta solo con gran inquietud y presentimientos de muerte. Tiene una gran sensación de culpa y siente que la muerte esta próxima y vendrá por él, porque se siente culpable. Su gran inseguridad, inquietud y desesperación lo llevan a actitudes obsesivo-compulsivas, como verificar si está cerrada la llave de gas repetidamente.

CACTUS:

El síntoma más característico de Cactus es la sensación de constricción, que tiene generalmente como base fisiopatológica una contracción de musculatura lisa circular. Esta constricción puede sentirse como por una banda o faja, como por un hilo o como por una mano o garra de hierro, y se manifiesta, entre otros órganos, en la garganta, tórax, corazón, abdomen, vejiga, vagina, y recto, provocadas a menudo o agravadas por el menor contacto. Hay, relacionada con la sensación de constricción, la de que todo el cuerpo está como aprisionado por alambres cada vez más y más enroscados, ajustados y apretados.

DIGITALIS:

Gran ansiedad, con sentimiento de culpa. Siente remordimientos. Extrema angustia, especialmente al anochecer o de noche, con tendencia a llorar y gran temor al futuro. Ansiedad de noche con tristeza e insomnio. Miedo: a morir; a perder la razón; al futuro; de sofocarse de noche. Desea estar solo; no tiene ganas de hablar, tendencia a dejarse estar. Trata de escaparse si le imponen compañía. Profunda tristeza, melancolía, peor por la música, con suspiros y llanto, sobre todo en cardíacos. Indiferencia, peor al anochecer. Irresolución. Obstinación.

GELSEMIUM:

Crisis de pánico en que la persona se queda inhibida y bloqueada, sin capacidad de respuesta. Puede haber antecedentes de shock y acompañarse de síntomas digestivos como diarrea.

IGNATIA AMARA:

Es uno de los principales medicamentos en efectos o trastornos de origen emocional, sobre todo si la causa es reciente, especialmente los producidos por penas (con pena silenciosa, no demostrativa); después de ira con ansiedad, ira con susto, con pena silenciosa; por ira suprimida o reprimida; por un amor no correspondido o rechazado o perdido, por la pérdida reciente de un ser amado, por mortificaciones; por contradicciones; por anticipar acontecimientos; por pasar por una situación embarazosa; por susto (se asusta fácilmente); por malas noticias. Efectos de castigos o reprimendas en el niño. “Personas mental y físicamente agotadas por una pena reconcentrada y prolongada”. Se lo ve reservado, pensativo, cavila mucho, como en introspección o ausente; a menudo rehúsa comer o está desesperado, triste, taciturno, tranquilo. Trac. El niño que recibe una reprimenda, enferma y tiene convulsiones durmiendo. Humor o modo de ser alternante y muy variable, cambiante. “Las condiciones mentales cambian, en un tiempo increíblemente corto, de la alegría a la tristeza, de la risa al llanto”. Este modo de ser condiciona asimismo, su característica indecisión y su inconstancia. Bromas y risas cambian a tristeza con gran derramamiento de lágrimas (histeria). Se pone extremadamente irritable cuando la contradicen, no puede tolerarlo. Lloro involuntariamente, no puede controlar su llanto, originado en sus propios problemas o en los problemas o penas que afligen a los demás, aunque no los conozca. Su llanto se acentúa durante la menstruación. El consuelo que quieren brindarle sus allegados la agrava mentalmente, la irrita o la hace llorar más. Es un medicamento especialmente adaptado a temperamentos nerviosos, sobretudo en mujeres de naturaleza muy sensible, fácilmente excitables, de disposición suave, dulce, afectuosa, rápidas para percibir y ejecutar, sentimentales. “Temperamento finamente sensible, de sentimientos delicados”. “Ignatia es aplicable y curativo solamente en ataques repentinos y en afecciones agudas”. Suspira involuntariamente; una sensación de gran vacío gástrico la obliga a suspirar; respiración suspirosa, con deseos de inspirar profundamente. Suspira sobre todo antes de la menstruación y durante la fiebre y los sudores. Desea la soledad, aunque a veces sucede lo contrario. No tolera la conversación, la agrava. Es escrupulosa, detallista, se fija en nimiedades para corregirlas. Estados histéricos, con desmayos, que sobrevienen por cualquier excitación; con convulsiones; con inconsciencia transitoria, después de una emoción; parálisis histéricas. Se destruye la ropa, rompe cosas. Se deleita provocándose ataques y alarmando a los demás. Se ríe involuntariamente, espasmódicamente, hasta de cosas serias o tristes o pasa fácilmente de la risa al llanto y viceversa. Risa delirante. Tiene ansiedad de conciencia con sentimiento de culpa, se reprocha, piensa que es un criminal, que ha hecho algo mal y llega a tener ideas de suicidio. Tiene miedo a los ladrones, sobre todo a medianoche al despertar. Temor a que nunca volverá a dormir; a que otras personas se le acerquen. Celos. Niños que gritan, sobre todo al despertar. Está mejor mentalmente cuando está ocupada; es muy activa, industriosa.

PHOSPHORUS:

Podría decirse que es el mejor remedio del pánico agudo, temor de sus propios pensamientos, temor de que esos pensamientos incontrolables se hagan realidad con temor a estar solo por miedo a que vuelvan a ocurrir.

ANSIEDAD Y HOMEOPATÍA

ANSIEDAD

Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Algunos medicamentos homeopáticos usados mas frecuentemente.

ACONITUM NAPELLUS

Se utiliza para tratar uno de los peores síntomas de la ansiedad: el miedo a morir. Es más eficaz para ese tipo de ansiedad que empeora por la noche, que no lo deja ir a la cama y provoca terrores nocturnos.

ARGENTUM NITRICUM

Medicamento para ese tipo de ansiedad que se denomina anticipación, para esos casos en los que conocemos perfectamente la causa de la ansiedad, como hablar en público, hacer un examen o subirnos a un edificio muy alto.

ARSENICUM ALBUM

Es el medicamento para la ansiedad en general. Para ese estado de ansiedad donde hay irritabilidad, búsqueda de la perfección y que todo esté organizado y en su sitio.

IGNATIA AMARA

Este es el medicamento que actúa contra esas reacciones contradictorias por la ansiedad. Si hay grandes cambios de humor, si se pasa de la ira al sosiego en cuestión de segundos o si el nerviosismo no te deja parar.

NUX VOMICA

Adicción al trabajo, si su ansiedad viene generada por un exceso de responsabilidades que no está dispuesto a abandonar, si todo tiene que estar perfecto y si no puede desconectar, este es el medicamento homeopático para su ansiedad.

RHUS TOXICODENDRON

El trastorno obsesivo compulsivo, las acciones repetitivas como lavarse las manos (Syphillinum))o no pisar la junta de la baldosas en la calle, pueden aliviarse con este medicamento.

SILICEA

Es un medicamento eficaz contra la fobia social, pero también contra esos estados menos graves de timidez, de inseguridad y miedo a los eventos sociales.

DEPRESION PSIQUICA

Aurum Metallicum

Aurum Metallicum es conocido como el principal remedio para la depresión, la depresión maníaca, pensamientos suicidas en combinación con trastornos cardiovasculares. Aurum Metallicum puede tener síndromes depresivos reaccionales y accesos hipomaníacos que alternan con fases de depresión invernal.

Las manifestaciones depresivas de la tercera edad, habitualmente se tratan con Aurum Metallicum cuando son evidentes o están enmascaradas tras una fachada de optimismo, actividad y jovialidad. Se acompañan de lentificación psíquica e intelectual y por la esclerosis vascular.

Cactus

Sirve como remedio contra la depresión durante la perimenopausia, sobre todo si la paciente sufre trastornos menstruales combinado con palpitaciones y ansiedad.

Cimicifuga

Tratamiento contra la depresión postparto, especialmente después de un parto complicado. A veces es útil para ayudar contra la depresión durante la menopausia, si la paciente tiene el afán de moverse mucho, tiene tendencia a la locuacidad combinado con ansiedad o irritabilidad.

Hyoscyamus

Se usa si la depresión está asociada a una angustia profunda con inquietud, desconfianza a todo y de todos, desesperación y alucinaciones.

Ignatia Amara

Este remedio homeopático se utiliza para tratar una depresión neurótica asociada a lloriqueos y lamentaciones permanente, con nerviosismo y ansiedad extrema causada por la pérdida de un ser querido. Ignatia sufre de síndromes depresivos reaccionales como consecuencia de shocks afectivos y de penas. Hay que pensar en prescribir Ignatia cuando hay miedo, no se soportan las contrariedades, en las vejaciones y cóleras reprimidas, en el dolor que provoca un accidente y/o la muerte de un ser querido, decepciones amorosas y en el miedo por anticipación.

Lilium Tigrinum

Es un remedio eficaz contra la depresión reaccional y trastornos del comportamiento, principalmente en la fase de la perimenopausia, en mujeres que tienen dismenorrea

característica. La depresión está combinada con irritabilidad, nerviosismo y problemas de corazón. *Lilium Tigrinum* se queja sobre todo de palpitaciones y dolores cardíacos puramente funcionales.

Lycopodium

Remedio contra depresiones en personas que se caracterizaran habitualmente por la racionalidad y que en situaciones normales tienen un estricto control de sus sentimientos y que además, tienen la tendencia a la soledad y temen al futuro. Las depresiones reaccionales de *Lycopodium* a veces se acompañan de somatización. Las tendencias depresivas son consecuencia del estrés.

Natrum Chloratum

Medicamento homeopático para el tratamiento de depresiones asociadas con ansiedad, irritabilidad, presión arterial baja y una tendencia al estreñimiento. Estas personas tienen un deseo notable de sal y de comidas saladas y una sensación de debilidad por la mañana sobre las 11 horas.

Nux Vomica

Tratamiento para personas con depresiones asociadas con temor profundo y gran irritabilidad, cólera, agresividad, conductas adictivas. A menudo, para individuos con una pasión por la perfección. *Nux Vomica* puede tener una depresión reaccional por sobrecarga y preocupaciones profesionales, con un desagrado por el trabajo e insomnio. A veces, incluso puede aparecer un impulso suicida a pesar del temor a la muerte.

Phosphoricum Acidum

Se usa para tratar depresiones crónicas en combinación con agotamiento o miedo a un futuro incierto. Progresivamente, el enfermo se vuelve indiferente a lo que le rodea e inepto para el trabajo intelectual, conserva la fuerza muscular.

Pulsatilla

Puede curar depresiones relacionadas con una sensibilidad profunda y con tendencia a lloriquear. A menudo en combinación con una menstruación irregular. Lo sufren especialmente chicas jóvenes en la pubertad.

Sepia Officinalis

Remedio homeopático capaz de curar estados depresivos por reacción a situaciones ansiógenas o secundarias a un post- parto, caracterizadas por introversión, indiferencia afectiva aparente a su entorno, nerviosismo e irritabilidad. También puede servir si existe un rechazo al niño. Principalmente se produce después de un parto difícil.

TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD CON DÉFICIT DE ATENCIÓN (THDA)

Anacardium

Muy baja autoestima en niños que intentan probarse a sí mismos, al grado de desarrollar una especie de doble personalidad. Sienten dos voluntades, una buena y otra mala. Estos niños se caracterizan por tener impulsos de gran crueldad. Disfrutan haciendo maldades que planean mucho. Duro de corazón, no se compadece por nada. Impulso de maldecir y decir malas palabras. Los niños y adolescentes que necesitan este medicamento suelen tener antecedentes de toda clase de abusos, incluyendo el abuso sexual y la violencia ejercida sobre ellos de manera temprana y reiterativa.

Argentum Nitricum

Niños muy impulsivos, anticipados y excitables. Todo los pone nerviosos y los afecta. Trastornos digestivos antes de ir a la escuela por preocupación, anticipan la mínima situación exagerándola en todos sentidos. Gran deseo de cosas dulces. Niños con ideas muy obsesivas, conductas ritualistas o compulsivas. Niños que se agobian en exceso por todo y son muy ansiosos no necesariamente hiperactivos pero que debido a su extrema anticipación y obsesividad, pueden actuar irreflexiva e impulsivamente. Estos niños suelen ser alegres y sociables, positivos y optimistas, pero altamente ansiosos.

Aurum Metallicum

En casos donde puede haber reacciones de violencia, sobre todo con gran ira y autodestructividad. Niños muy responsables y con una alta exigencia hacia sí mismos, con padres muy duros o distantes emocionalmente. Los niños Aurum pueden parecer muy maduros y sensatos, pero en el fondo guardan, más que resentimientos, una profunda minusvalía acompañada de grave depresión, misma que puede manifestarse, en algunos casos, con reacciones violentas y de gran intolerancia.

Chamomilla

Niños catalogados, más que como hiperactivos o distraídos, reactivos o violentos, como altamente caprichosos. Niños de todas las edades, pero sobre todo entre los 2 y los 6 años, que se caracterizan por hacer rabietas y berrinches con manifestaciones muy intensas. Pueden caer en espasmos del sollozo o tornarse cianóticos por su llanto desaforado. Nada les complace y no saben con precisión qué es lo que desean, o piden algo para rechazarlo de inmediato. Pueden llegar a vomitar debido a la intensidad y persistencia de su llanto.

Coffea Cruda

Hiperactividad con euforia, todo lo ve por el lado positivo. Impulsivo en grado extremo. Optimismo activo exagerado (optimismo exagerado pero pasivo: Sulphur). Niños que no pueden dormir porque tienen demasiada energía y quieren jugar. Muy buenas intenciones pero con arrebatos e imprudencia, al grado de destruir por torpeza.

Hyosciamus

Niños hiperactivos con comportamiento muy tonto y ridículo, que se ríen de todo y son reacios a asumir las reglas y convencionalismos sociales propios de su edad. Son sarcásticos, hacen bromas pesadas o desagradables constantemente, quieren llamar la atención a toda costa. Hay un tono de exhibicionismo, no solo de índole sexual, se quitan la ropa y quieren estar desnudos. Precocidad sexual.

Medorrhinum

En casos donde hay gran inteligencia pero con extrema hiperactividad, acompañada a veces de destructividad e impulsos trasgresores, son niños o adolescentes capaces de sacar de sus casillas a sus padres y a la gente de su alrededor. Tienen impulsos geniales, sobre todo de maldad, destruyendo en grado extremo con el mínimo esfuerzo. Muy precoces en todos los sentidos, incluyendo a nivel emocional, intelectual y sexual. Quieren probar todo, al grado de desarrollar una curiosidad malsana y exagerada.

Nux Vómica

Niños y adolescentes muy instintivos, competitivos y deseosos de placer. Niños muy inquietos y traviesos, primitivos y que reaccionan de manera exagerada. Gran seguridad y arrojo, nada parece generarles temor ni agobiarlos, estos niños suelen ser líderes y manifestarse siempre positivos y con gran confianza en sí mismos, pero a la vez suelen confrontar todo tipo de reglas y estructuras. Les fascina pelear y ser litigiosos; son apasionados y reaccionan instantáneamente ante cualquier circunstancia.

Stramonium

Impulsos destructivos extremos, arrebatado y muy reactivo. Destruye de manera sistemática y con gran violencia. Este medicamento es probablemente el más destructivo y violento de todos; el niño tiene crisis de rabia incontenible, en las cuales pareciera estar endemoniado, con pérdida de todo control consciente y de la voluntad. Son niños muy temerosos: Sobre todo a la oscuridad, a estar solos, a los animales. Terrores nocturnos, tiene pesadillas espantosas con espasmos y gritos, con temor exagerado después de despertar, pues sigue percibiendo lo que veía en su sueño. Niños con graves desórdenes de conducta, con antecedentes de abusos o que han tomado demasiada medicación.

Tarentula

Inquietud desbordante y destructiva, niños muy trasgresores, impacientes, presurosos, intolerantes y, sobre todo, incansables, mientras más actividades realizan, más energía parecen

tener. Estos niños parece que no necesitan dormir, pueden pasar noches enteras realizando intensas actividades físicas y mentales, sin mostrar el mínimo agotamiento. Son muy inteligentes y hacen bromas muy pesadas. Fácilmente se tornan fuera de control, cualquier cosa los lleva a actos violentos; son niños que comienzan jugando y terminan lastimando seriamente a otros. Gustan de los colores brillantes y la música rítmica.

Tuberculinum

Mente muy brillante y genial pero con gran insatisfacción es la clave de este remedio homeopático. El niño Tuberculinum es altamente destructivo, desequilibra cualquier entorno, todo lo altera; niños capaces de devastar todo su núcleo familiar. Siempre quiere cosas diferentes, cambiar, liberarse de lo que tiene y debe hacer; al no poder hacerlo continuamente, tiende a destruir todo lo que le rodea. Deseo de vagabundear. Temperamento muy violento con gran crueldad hacia los animales e, incluso hacia otros niños. La felicidad de otros lo altera profundamente ya que él no encuentra motivo para sentirse pleno y satisfecho, así, boicotea la alegría de los demás aún a costa de su propia integridad.

Veratrum Album

Niños hiperactivos, desbordantes, que nunca se agotan, que pueden realizar varias tareas a la vez. Muy soñadores, viven en sus fantasías a la vez que están en actividad constante, llegando a confundir lo real con lo imaginario. Pertinaces y perpetuamente activos, pero no necesariamente destructivos. Pueden sentirse especiales y mostrarse arrogantes y desdeñosos, niños que mienten de manera premeditada y fingen enfermedades. Los niños Veratrum Album duermen muy poco y parece que nunca están plenamente conectados a la realidad.

Es un problema causado por la presencia de 1 o más de estas condiciones: no ser capaz de concentrarse, ser hiperactivo o no ser capaz de controlar el comportamiento.

INSOMNIO

Actea Racemosa

Insomnio de la mujer embarazada, con miedo de ponerse de parto, miedo de tener un hijo anormal.

Agaricus Muscarius

Terror nocturno en el primer sueño, sabañones. Espíritu fuerte en un cuerpo que falla.

Ambra Grisea

El sujeto quiere dormir pero en cuanto se acuesta no puede porque le da vueltas a los asuntos traumáticos que le han ocurrido. No puede dormir si no es con oscuridad absoluta. Estrés.

Argentum Nitricum

Insomnio provocado por angustia ante acontecimientos venideros, como un examen o intervención en público. Los trastornos del sueño son causados por el estrés o el exceso de trabajo. El paciente Argentum Nítricum siempre va con prisas, es un sujeto ansioso. Suele empezar muchas cosas en su día a día y no acabarlas.

Arnica:

Insomnio por agotamiento físico tras un gran esfuerzo. Percibe la cama muy dura.

Arsenicum Album

Miedo de la muerte: despertar después de medianoche, agitación, sujeto metódico, coleccionista y friolero.

Asarum Europeanum

Niño nacido de donación de gametos. Sujeto sensible al mínimo ruido.

Aurum Metallicum

Dolores óseos de crecimiento, niño intrépido, generoso.

Belladonna

Terror nocturno en el primer sueño, pupilas dilatadas, angustia de ser devorado. Insomnio con ganas de dormir sin lograr conciliar el sueño.

Borax

Dentición, aftas, no soporta los movimientos de descenso: llora cuando se le pone en la cuna.

Calcarea Carbonica

Insomnio con sudoración excesiva en la cabeza.

Chamomilla

Insomnio especialmente en niños durante la dentición, se encuentran nerviosos y agitados, agresivos e irritables; desean que les lleven en brazos.

Coffea Cruda

Insomnio en el que resulta imposible dejar de pensar o desconectar. Por felicidad extrema. Nerviosismo por exceso de café. La causa del insomnio o la dificultad de dormirse surge del nerviosismo o del hecho de que el paciente está excitado. Insomnio por hiperideación, después de emociones intensas con temblores, irritabilidad, agitación y eventualmente taquicardia y/o palpitaciones. El paciente sufre de sueños cortos que no son reparadores y están entrecortados por despertares. Particularmente el paciente se despierta antes de la medianoche o hacia las tres de la madrugada.

Gelsemium Sempervirens

Los trastornos del sueño son causados por esfuerzo excesivo, mareos o dolores de cabeza. Considerado como el psicofármaco de la homeopatía para curar el insomnio causado por preocupación, tristeza e incluso por mal de amores. Indicado en insomnios cuando son concomitantes a una ansiedad por anticipación.

Ignatia

Insomnio por problemas recientes. Lloros y bostezos.

Kalium Carbonicum

Se usa cuando hay insomnio causado por dolor o por ejemplo si el paciente se despierta en plena noche sudando a chorros.

Kalium Phosphoricum

Insomnio por agotamiento mental. Insomnio al menor ruido.

Natrum Muriaticum

Insomnio por problemas antiguos, preocupaciones que vienen de lejos.

Nux Vomica

Se usa cuando el paciente se despierta por ansiedad, pensando en el trabajo y preocupaciones profesionales, pero también después del uso excesivo de alcohol, cafeína o nicotina. Nux Vómica tiene dificultad para quedarse dormido, después se despierta hacia las tres de la madrugada, con un contexto de exceso de trabajo; la hiperideación es tal que al enfermo le cuesta lograr el sueño y se levanta cansado. Insomnio en personas irritables, adictos al trabajo o después de excesos de todo tipo, comida, bebida, café, etc.

Passiflora: Passiflora es el remedio básico para el insomnio tipo nervioso.

Phosphoricum Acidum

Este medicamento homeopático se usa si las causas del insomnio son psíquicas y el paciente sufre además un cansancio profundo a lo largo del día.

Phosphorus

Phosphorus ayuda contra insomnio causado por ansiedad, debilidad nerviosa o miedo a la oscuridad (esto sufren especialmente niños).

Pulsatilla

Los trastornos del sueño están asociados con la fatiga durante el día. A veces son causados por problemas hormonales por ejemplo en la menopausia o la pubertad.

Sulphur

Las razones del insomnio son debidas a la arteriosclerosis en los vasos cerebrales (venas) especialmente en combinación con pies calientes.

Valeriana Officinalis

Valeriana es una de las soluciones principales contra el insomnio. Especialmente cuando el paciente sufre ansiedad nerviosa relacionada con agitación.

Zincum Valerianicum

Se usa contra el insomnio en combinación con ansiedad, sobre todo si el paciente tiene piernas inquietas. Estos son los principales remedios para el insomnio, pero existen muchos otros que, si son el *simillimum* y coinciden la tipología, síntomas y características, podrán curar este problema.