
NICOMED – Detalle del producto

Traducción al español

Cada página muestra la diapositiva original como referencia visual, seguida de su traducción completa.




NICOMED®

RIBESKIN MED – Exclusivo para profesionales médicos

patient centric MEDical aesthetic (estética médica centrada en el paciente)

Por	Equipo de Educación de RIBESKIN
Fecha	2023.07.18

JM BIOTECH – Innovation that matters · Confidencial



Índice

1. Descripción general del producto
2. Presentación (empaque)
3. Beneficios clave
4. Antecedentes
5. Cómo funciona
6. Indicaciones
7. Ingredientes clave

* Preguntas y respuestas



1. Descripción general del producto


El nombre NICOMED

NICOTINA**MIDE** (= Vitamina B3) → **NICOMED**: “El efecto antiinflamatorio de la vitamina B3”

NICOMED es una crema de alivio de la inflamación, sin antibióticos, diseñada para aliviar el acné y el eritema persistentes. También trata la resequedad causada por los tratamientos para el acné inflamatorio.

NICOMED contiene nicotinamida al 4 %, también conocida como vitamina B3, que no solo mejora la resequedad y el enrojecimiento causados por el uso prolongado de medicamentos tópicos, sino que también ayuda a regular el aspecto de la piel al aliviar la inflamación y el eritema que pueden haberse producido por diversos procedimientos y otros irritantes ambientales.


(Texto del tubo: “Post-procedure topical gel” – Gel tópico post-procedimiento)



2. Composición

NICOMED	
Ingrediente clave	Nicotinamida 4 %
Fabricante	CANADA Cosmeceutical Research Laboratory (Canadá)
Aspecto	Crema blanca y opaca
Presentación	15 g / Tubo de aluminio
Modo de uso	Aplicación principal para el enrojecimiento del acné y la piel seca e inflamada. Aplicar una pequeña cantidad en las zonas problemáticas dos veces al día, mañana y noche, después de la limpieza. Se recomienda usar durante 8 a 12 semanas o más.

Presentación: 15 g




3. Beneficios clave

Reducción del acné

1. Inhibición de la reacción inflamatoria - Inhibe cada etapa de la actividad inmunitaria desencadenada por las bacterias causantes del acné.

2. Alivio del enrojecimiento - Mejora el enrojecimiento del acné. - Mitiga la inflamación y la irritación causadas por los medicamentos tópicos.

3. Hidratación y prevención de la HPI - Aporta humedad para aliviar la resequedad causada por el uso prolongado de medicamentos tópicos. - Inhibe la pérdida de humedad de la epidermis.




3. Características y beneficios

1. Primera crema antiinflamatoria "sin antibióticos". Un nuevo enfoque no antibiótico para controlar el acné localizado y la inflamación. Contiene **NICOTINAMIDA (vitamina B3) al 4 %** de alta pureza, cuya eficacia ha demostrado ser equivalente, en cuanto a ingredientes, a la del medicamento de prescripción para el acné clindamicina al 1 %. PMID: 7657446 [PubMed – indexado en MEDLINE]

2. Se recomienda combinar con los tratamientos tópicos en curso. Como contiene vitaminas hidrosolubles que no se acumulan en el organismo ni generan resistencia, puede usarse en combinación con los tratamientos tópicos existentes sin causar estrés en la piel, incluso con una aplicación prolongada.

3. Previene la pérdida de humedad y la HPI. *HPI: hiperpigmentación postinflamatoria* La **NICOTINAMIDA (vitamina B3) al 4 %** de alta pureza aporta humedad a la piel seca causada por el tratamiento local del acné o por el uso de antibióticos y esteroides, ayudando a que la piel se normalice rápidamente.

4. Apta para piel sensible (no causa irritación cutánea).



4. Antecedentes

1. Definición de acné


Afección inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea, que está unida al folículo piloso.

Clasificación: - **Comedones:** no inflamatorios; sebo endurecido atrapado dentro de los folículos pilosos. - **Pápulas:** acné con inflamación roja, de tamaño < 1 cm. - **Pústulas:** acné con formación de pus, blanco o amarillo. - **Nódulos, quistes:** acné que abarca un área amplia, acompañado de ampollas y dolor.

Aparece con frecuencia en zonas con alta concentración de glándulas sebáceas, como la cara, el cuello y el pecho. Se le suele llamar “brote” (“trouble”) cuando se forma inflamación alrededor de las glándulas sebáceas.

2. Las TRES causas principales del acné

1. **Producción excesiva de sebo:** la testosterona, la progesterona y la ACTH (hormona adrenocorticotrópica) estimulan las glándulas sebáceas y provocan una producción excesiva de sebo.
2. **Poros obstruidos:** la acumulación de células cutáneas queratinizadas bloquea los folículos pilosos.
3. ***P. acnes*:** bacteria causante del acné. Aumenta el nivel de triglicéridos y ácidos grasos libres. Provoca inflamación en las paredes del folículo.




4. Antecedentes

3. Tipos de acné

Etiquetas del diagrama: poro sano · folículo · estrato córneo · epidermis · glándula sebácea · poro obstruido · bacterias dentro de la glándula sebácea · poro inflamado – acné *Etapa 1: Piel normal → Etapa 2 → Etapa 3*

Piel con tendencia acneica - **Etapa 1:** producción anormal de sebo – poros obstruidos. - **Etapa 2:** propagación de *P. acnes* – se infecta un área más amplia. - **Etapa 3:** inflamación y deterioro – signos de inflamación y formación de pus.

Imágenes: Pápulas · Pústulas · Nódulos



4. Antecedentes


4. Definición de rosácea

Afección inflamatoria crónica de la piel que suele aparecer en el centro del rostro.

Síntomas - Rubor recurrente y dilatación de los vasos sanguíneos. - Lesiones inflamatorias en zonas como la nariz, la frente, las mejillas y el mentón. - Acompañada de resequedad, picazón y dolor punzante. - Sensación de ardor por el rubor frecuente. - Puede evolucionar a rinofima (nariz roja) o extenderse a todo el rostro y el cuero cabelludo.

5. Causas de la rosácea

1. Error en la respuesta inmunológica y desregulación neurovascular.
2. Exposición a la radiación UV y a cambios de temperatura.
3. Factores genéticos, estrés, etc.



5. Cómo funciona

RESUMEN

Mecanismo antiinflamatorio de NICOMED basado en los cambios del sistema inmunitario. NICOMED es un nuevo agente antiinflamatorio que contribuye al tratamiento del acné inflamatorio al inhibir cada etapa de la actividad inmunitaria desencadenada por las bacterias causantes del acné.

1. Inhibición de la quimiotaxis de neutrófilos Impide que los glóbulos blancos se desplacen hacia los folículos.

2. Inhibición de la liberación de enzimas lisosomales Impide que los glóbulos blancos liberen enzimas lisosomales, que pueden romper la pared del folículo piloso, permitiendo que las sustancias inflamatorias lleguen a la dermis e induzcan la disolución de la membrana basal.

3. Inhibición de la transformación de linfocitos y de la producción de anticuerpos Inhibe la generación de anticuerpos que *P. acnes* (bacteria causante del acné) desencadena en la respuesta inflamatoria.

4. Inhibición del sobrecrecimiento de sebocitos Impide que las aminas vasoactivas aumenten la permeabilidad vascular y liberen mediadores químicos que intensifican la respuesta inflamatoria.




6. Indicaciones

1) ACNÉ - Acné vulgar - Acné rosácea

2) Enrojecimiento

3) Inflamación - Foliculitis - Dermatitis de contacto

4) Piel seca




7. Ingredientes clave

Nicotinamida 4 %

La nicotinamida, también conocida como niacinamida, es una forma de la vitamina B3 y uno de los componentes de las coenzimas NAD+ y NADP+ del organismo. Se encuentra en los alimentos y se utiliza como suplemento dietético y en medicamentos. Se toma por vía oral como suplemento para prevenir y tratar la pelagra, una afección causada por la deficiencia de niacina. La nicotinamida también puede utilizarse por su participación en el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los ácidos grasos, la respiración celular y los procesos de síntesis de esteroides. Una de las ventajas de la nicotinamida es que no induce rubor cutáneo, lo que la hace adecuada para su uso en cremas para el tratamiento del acné. [3]

[1] World Health Organization (2009). Stuart MC, Kouimtzi M, Hill SR, Edit. «WHO Model Formulary 2008». [2] «British National Formulary: BNF 69» 69. British Medical Association. 2015. [3] Bender DA (2003). «Nutritional Biochemistry of the Vitamins». Cambridge University Press.

Funciones en la piel 1. **Aumento de ceramidas:** incremento de ceramidas (34 %) y de ácidos grasos (6–7 %). 2. **Previene la deshidratación epidérmica:** ayuda a retener la humedad de la piel en la epidermis y estimula la microcirculación en la dermis. 3. **Control del sebo:** controla el exceso de sebo y mejora los problemas de la piel grasa. 4. **Efecto antiinflamatorio / antibacteriano.** 5. **Control de la melanina:** alivia la pigmentación de la piel e inhibe la transferencia de melanosomas. 6. **Reduce la permeabilidad vascular.**



7. Ingredientes clave

Nicotinamida 4 %

1. Acción antiinflamatoria


Gráfico: Medias marginales estimadas (grado) – Basal, Semana 4, Semana 8 – Nicotinamida (N), Clindamicina (O), Nicotinamida (O), Clindamicina (N).

Método de prueba: Se incluyeron en el estudio 76 sujetos con piel propensa al acné inflamatorio moderado. Se dividieron en dos grupos: uno aplicó gel de nicotinamida al 4 % y el otro gel de clindamicina al 1 %. Ambos grupos aplicaron su tratamiento dos veces al día durante 8 semanas. A las 4 y a las 8 semanas se evaluó a los sujetos y se comparó la gravedad de su acné.

Resumen: Los resultados experimentales mostraron que el acné mejoró un 60 % con el gel de nicotinamida al 4 % y un 68 % con la clindamicina.

Conclusión: En el tratamiento del acné, la eficacia del gel tópico de nicotinamida al 4 % resultó equivalente a la del gel de clindamicina al 1 %. Dado que la clindamicina tópica, al igual que otros antibióticos, se asocia con la aparición de microorganismos resistentes, el gel de nicotinamida se considera una alternativa deseable para el tratamiento del acné.

Referencia: Topical nicotinamide compared with clindamycin gel in the treatment of inflammatory acne vulgaris. Int J Dermatol. 1995 Jun;34(6):434-7. Shalita AR, Smith JG, Parish LC, Sofman MS, Chalker DK.



7. Ingredientes clave

Nicotinamida 4 %

2. Inhibición de la pérdida de humedad epidérmica y mejora de los síntomas de la rosácea

Valores medios asignados por el investigador para los signos y síntomas de la rosácea (puntuación media, recuento)

Signos y síntomas	Basal	Semana 4
Eritema*	1.8 (0.7)	0.8 (0.7)
Telangiectasias*	1.6 (0.7)	1.6 (0.7)
Resequedad*	0.8 (0.8)	0.0 (0.2)
Descamación/peeling*	0.6 (0.8)	0.0 (0.2)
Lesiones inflamatorias†	2.3 (3.2)	0.5 (1.3)


*Puntuado en una escala en la que 0 = ninguno y 3 = grave. †Suma de los recuentos de pápulas y pústulas.

Gráfico (% de sujetos): aspecto general de la piel · enrojecimiento/manchas · tono/color de la piel · imperfecciones · resequedad/descamación — Mejoría / Sin cambios / Empeoramiento.

- **Método de prueba:** se aplicó una crema hidratante con nicotinamida en un antebrazo dos veces al día durante cuatro semanas. Tras cuatro semanas de aplicación regular, se evaluó la función barrera de la piel de ambos antebrazos.
- **Resumen:** los resultados demostraron que la aplicación de una crema hidratante con nicotinamida en un antebrazo durante cuatro semanas mejoró la función barrera e hidratante del estrato córneo. Se observaron resultados similares en la piel del rostro según estos parámetros. Tanto la evaluación del investigador como la autoevaluación de los sujetos mostraron una mejoría de los síntomas de la rosácea.

- **Resultados:** los resultados de este experimento confirman las ventajas de una crema hidratante con nicotinamida en la zona facial para mejorar la función barrera del estrato córneo.

Referencia: Niacinamide Containing Facial Moisturizer Improves Skin Barrier and Benefits Subjects With Rosacea. Int J Dermatol. 1995 Jun;34(6):434-7. Zoe Diana Draelos, MD; Keith Ertel, PhD; Cindy Berge, BS.



Preguntas y respuestas

P1. ¿NICOMED es eficaz en otras afecciones inflamatorias de la piel además del acné? Existen datos que muestran efectos terapéuticos en las siguientes afecciones: - Penfigoide ampolloso - Complejo pénfigo, penfigoide cicatricial - Erupción polimorfa lumínica - Dermatosis IgA lineal, IgA - Necrobiosis lipoídica, liquen plano penfigoide - Dermatitis herpetiforme, granuloma anular - Eritema elevatum diutinum

P2. ¿Es eficaz cuando se aplica solo? En un tratamiento del acné de 8 semanas, la eficacia del gel tópico de nicotinamida al 4 % resultó equivalente a la del gel de clindamicina al 1 %. La clindamicina tópica, al igual que otros antibióticos, se asocia con la aparición de microorganismos resistentes. Por ello, el gel de nicotinamida se considera una alternativa deseable para el tratamiento del acné.

P3. ¿Cuáles son los pasos de aplicación y por qué aplicar NICOMED en combinación con un tratamiento tópico para el acné? NICOMED regula el sistema inmunitario de la piel activado por la inflamación. Por ello, se recomienda aplicarlo antes de otros productos tópicos para estabilizar la piel. Su excelente tasa de absorción lo hace ideal para aplicarlo inmediatamente después de la limpieza; después se puede continuar con otros tratamientos para el acné o con el maquillaje.

P4. Cuando se usa solo, se recomienda utilizarlo de 8 a 12 semanas para ver resultados. Sin embargo, cuando se usa en combinación con otros medicamentos, ¿cuánto tiempo tarda en verse el resultado? Nicomed puede regular el sistema inmunitario de la piel, que se activa con la inflamación. Por ello, cuando se usa en combinación con otros tratamientos tópicos, Nicomed puede ayudar a calmar las respuestas inflamatorias. Esto significa que, a medida que la piel se estabiliza, la eficacia del tratamiento para el acné administrado conjuntamente puede maximizarse, y se espera ver la mejoría en un período más corto.



Preguntas y respuestas


P6. Cuando se usa en combinación con productos de tretinoína (≒ isotretinoína) como Stieva-A 0.01 % (tretinoína), RETACNYL 0.025 % (tretinoína), Differin gel 0.1 % (adapaleno) y Acrein gel (isotretinoína), ¿cómo puede Nicomed potenciar la evolución? El mecanismo exacto de los productos de isotretinoína no se conoce por completo, pero se sabe que reducen el tamaño y la producción de las glándulas sebáceas, normalizan la queratinización folicular y ejercen efectos antiinflamatorios, reduciendo el tamaño de los poros y las lesiones inflamatorias entre un 40 y un 70 %. Sin embargo, durante el tratamiento tópico con retinoides es habitual que los pacientes presenten efectos secundarios como descamación, piel seca, ardor punzante, enrojecimiento e irritación y, en algunos casos, durante las primeras semanas de tratamiento puede haber un empeoramiento de las lesiones inflamatorias. Los resultados del tratamiento pueden hacerse evidentes después de 2–3 semanas, pero el efecto óptimo suele observarse a las 6 semanas aproximadamente. Es fundamental controlar eficazmente estas irritaciones durante este período, ya que ello puede mejorar la adherencia del paciente. Nicomed regula el sistema inmunitario de la piel activado por la inflamación, lo que calma las respuestas inflamatorias. En otras palabras, al disminuir la sensibilidad de la piel, pueden potenciarse los efectos de los retinoides tópicos asociados y es probable que mejore la adherencia del paciente.

P7. ¿Qué beneficios aporta Nicomed cuando se usa en combinación con preparados tópicos de peróxido de benzoílo como BENZAC AC y Brevoxyl? El peróxido de benzoílo libera oxígeno activo en la piel, que actúa como agente antimicrobiano contra las bacterias que residen en los poros. También tiene un efecto queratolítico, que ayuda a disolver y eliminar la queratina. Sin embargo, no solo el peróxido de benzoílo, sino la mayoría de los medicamentos tópicos para el acné tienden a causar una irritación cutánea moderada, con enrojecimiento y resequedad. Nicomed regula el sistema inmunitario de la piel activado por la inflamación y aporta humedad a la piel inflamada, lo que calma la respuesta inflamatoria. En otras palabras, al reducir la irritación cutánea, pueden potenciarse los efectos del peróxido de benzoílo concomitante y es probable que mejore la adherencia del paciente.

P8. ¿Qué beneficios aporta Nicomed cuando se usa en combinación con preparados antibióticos tópicos como Eryacne (eritromicina) y Stiemycin gel (eritromicina)? Debido a la eficacia desinfectante


del alcohol contra las bacterias del acné, se usa habitualmente como disolvente principal de los antibióticos tópicos. Sin embargo, además de la resequedad, pueden presentarse efectos secundarios como enrojecimiento, descamación y sensación de ardor. Nicomed regula el sistema inmunitario de la piel activado por la inflamación y aporta humedad a la piel inflamada, por lo que puede calmar las respuestas inflamatorias. Se espera que esta reducción de la irritación cutánea aumente la eficacia de los antibióticos tópicos asociados y mejore la adherencia del paciente.

(Nota: el documento original pasa de la P4 a la P6; no incluye una P5.)



Referencias

(Las referencias bibliográficas se mantienen en su idioma original.) 1. Griffths CEM. Nicotinamide 4% gel for the treatment of inflammatory acne vulgaris. J Dermarol Treat. 1995;6(suppl): S8~S10. 2. Fivenson DP, Breneman DL, Rosen GB, et al. Nicotinamide and tetracycline therapy of bullous pemphigoid. Arch Dermatol. 1994;130;753-758. 3. Shimoyama M, Kawai M, Hoshi Y, et al. Nicotinamide inhibition of 3',5'-cyclic AMP phosphodiesterase in vitro. Biochem Biophys Res Commun. 1972;49:1137~1141. 4. Wyczolkowska J, Maslinski C. Inhibition by nicotinamide of an homologous PCA reaction and antigen-induced histamine release from rat peritoneal mast cells. Int Arch Allergy Appl Immunol. 1975;49:285-292. 5. Bekier E, Wyczolkowska J, Szyc H, et al. The inhibitory effect of nicotinamide on asthma-like symptoms and eosinophilia in guinea pigs, anaphylactic mast cell degranulation in mice, and histamin release from rat isolate peritoneal mast cells by compound 48-80. Int Arch Allergy Appl Immunol. 1974;47;737-748. 6. Berk MA, Lorincz AL. The treatment of bullous pemphigoid with tetracycline and naicinamide. A preliminary report. Arch Dermatol. 1986;122;670-674. 7. Shalita AR, Smith JG, Parish LC, et al. Topical nicotinamide compared with clindamycin gel in the treatment of inflammatory acne vulgaris. Int J Dermatol. 1995;34;434-437. 8. Bekier E, Maslinski C. Antihstaminic action of nicitinamide. Agents Actions. 1974;4;196.



Gracias.

RIBESKIN MED – *patient centric MEDical aesthetic* (estética médica centrada en el paciente)

JM BIOTECH – Innovation that matters · Confidencial