Tratamiento con Fipronil y Cebo en Gel: Dinámica del Nido y Efecto Cascada

Dirigido a: Administradores de Oficina, Encargados de Cocineta y Clientes en Tratamiento de Cucaracha Alemana

Dinámica de Plagas

Bioseguridad y Exclusión

MARCO NORMATIVO Y SANITARIO: NOM-256-SSA1-2012 (Control y Manejo de Plagas Urbanas), Registros Sanitarios COFEPRIS y Principios de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

DIAGNÓSTICO SANITARIO Y PROBLEMÁTICA OBSERVADA:

La cucaracha alemana (Blattella germanica) es una plaga gregaria que anida en grietas profundas, motores y bisagras. Usar insecticidas comerciales de lata o productos con olor provoca su dispersión a escritorios y computadoras. Nuestro tratamiento especializado no las ahuyenta: las infecta para que lleven el principio activo al corazón del nido.

MATRIZ OPERATIVA: ACCIÓN INCORRECTA HABITUAL vs. PROTOCOLO CORRECTO

ACCIÓN INCORRECTA HABITUAL [X]	PROTOCOLO CORRECTO DE LA EMPRESA [OK]
x Rociar insecticidas en aerosol (Raid, H24) sobre las cucarachas o muebles tratados.	+ **Dejar que las cucarachas caminen libremente sobre las zonas tratadas para que contagien a las demás en el nido.**
x Limpiar o retirar con trapo húmedo los puntos de gel aplicados en bisagras y muebles.	+ **Respetar las gotas de gel; son alimento tóxico letal que las ninfas y hembras consumirán durante días.**
x Trapear con cloro y desengrasante los zoclos y bases de muebles en las primeras 48 horas.	+ **Trapear solo el centro de pisos; mantener intacta la película residual de Fipronil en orillas y partes bajas.**
x Dejar café, azúcar, pan o galletas expuestos en cajones y estantes de cocineta.	+ **Guardar todo alimento en recipientes herméticos rígidos; si no hay comida disponible, el consumo de cebo se multiplica.**

REGLAS DE HIGIENE Y EXCLUSIÓN OBLIGATORIAS PARA EL PERSONAL

1. EFECTO CASCADA ACTIVO: Las cucarachas son coprófagas y necrófagas; las heces y el cuerpo de una cucaracha que pisó Fipronil envenenan a 10 más dentro de la pared o estantería.
2. **PROHIBIDO EL USO DE AEROSOLES: Cualquier insecticida de lata anula el efecto del Fipronil, repele a la plaga y la dispersa a computadoras y escritorios limpios.**
3. RESIDUALIDAD Y NO LAVADO: No lave con químicos desinfectantes las esquinas, bisagras ni zoclos donde se colocó el producto durante al menos 5 días.
4. LIMPIEZA DE GRASA Y MIGAJAS: La grasa de la cocineta degrada el insecticida. Limpie derrames de grasa antes de la aplicación y mantenga cajones sin residuos de alimentos.
5. CICLO BIOLÓGICO Y SEGUNDO MES: La cáscara del huevo (ooteca) es impenetrable. Las crías que nazcan en 15-20 días morirán al pisar el producto; el seguimiento mensual es indispensable.

MEDIDAS DE INSTALACIÓN, EXCLUSIÓN FÍSICA Y MANTENIMIENTO

* SELLADO DE GRIETAS EN ESTANTERÍAS: Sellar con silicón o acrilastic las uniones entre azulejos, fórmica y marcos de estantes para eliminar refugios térmicos.
* REVISIÓN DE EMPAQUES DE REFRIGERADOR Y MICROONDAS: Limpiar con regularidad la parte trasera de motores y sellos de goma, donde el calor atrae a las ninfas.
* DESPEJE TEMPORAL DE ALACENAS: Durante la aplicación, despejar insumos alimenticios y vajillas en cajas cerradas para permitir acceso total a esquinas.
* ELIMINACIÓN DE HUMEDAD: Reparar fugas en llaves y secar el fregadero al terminar la jornada; las cucarachas resisten semanas sin comida pero solo días sin agua.

CRONOGRAMA Y FASES DE EVOLUCIÓN BIOLÓGICA DEL TRATAMIENTO

FASE / ETAPA	TIEMPO	COMPORTAMIENTO Y EFECTIVIDAD TÉCNICA
Fase 1: Desalojo e Intoxicación del Nido	Días 1 a 3	Cucarachas salen descoordinadas y aturdidas a la vista. Es señal de que el sistema nervioso fue afectado y el químico está trabajando.
Fase 2: Quiebre de la Población Adulta	Días 4 a 14	Mortalidad masiva (80-90%). Las cucarachas mueren dentro de sus refugios contagiando a ninfas que nunca salieron a la superficie.
Fase 3: Eclosión de Ninfas y Control Total	Día 15 a 45	Nacen crías diminutas de los huevecillos residuales. Al comer el gel fresco o caminar sobre el Fipronil, mueren sin llegar a reproducirse.

PREGUNTAS FRECUENTES TÉCNICAS (FAQ DE CAMPO)

P: ¿Por qué sigo viendo cucarachas vivas después de la fumigación?
R: Fipronil no mata de golpe porque necesita tiempo para que la cucaracha vuelva al nido viva y contagie al resto de la colonia. La muerte retardada es exactamente lo que garantiza la erradicación total.

P: ¿El Fiprax y el gel manchan o huelen mal en la oficina?
R: No. Es una fórmula en suspensión concentrada base agua y geles específicos, inodoros, que no emiten vapores tóxicos ni manchan muebles, aptos para áreas de trabajo y preparación de alimentos.

PRINCIPIO TÉCNICO: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y TRABAJO EN EQUIPO

El tratamiento con Fipronil y cebo en gel de EJ Exterminadores es la tecnología de mayor precisión para cucaracha alemana. La efectividad depende de evitar el uso de insecticidas comerciales que repelan a la plaga y mantener estrictas medidas de higiene en cocinetas y escritorios.

DICTAMEN Y PROTOCOLO CERTIFICADO POR:
ING. JORGE ELIZONDO / REP. TÉCNICO
Responsable de Operaciones y Bioseguridad | EJ Exterminadores

ATENCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA:
Tel. 813-175-9342
www.ejexterminadores.com | Monterrey, N.L.