Homoclave	GC_S_002
estado sanitario e inmunologico	MALO
desarrollo del aparato reproductor	DESARROLLADO
edad a la pubertad	180
edad al primer servicio	240
peso vivo a la primera inseminacion	135
numero total de pezones	16
indice genetico de la linea	BAJO
tasa de longevidad predicha	4
alineacion y calidad de los pezones	BUENA
estructura y solidez de aplomos	MALA
integridad y simetria de pezuñas	MALA
espesor de grasa dorsal al primer servicio	14
capacidad pelvica y amplitud de cadera	BUENA
ganancia media diaria	650
temperamento y docilidad	DOCIL
raza	YORK



Enteropatía Proliferativa Porcina (PPE / Ileítis)
Descripción / Etiología: Infección intestinal causada por Lawsonia intracellularis que afecta la mucosa del íleon, provocando diarreas agudas o crónicas y desmedro.
Medicamentos de ElecciónTratamiento: Tilosina, Tiamulina, Valnemulina, Vacunación.
Dosificación y Vía de Administración• Tilosina: 10 mg/kg IM cada 24 hrs por 3 días o 100-200 ppm en agua/alimento por 7-14 días.
• Tiamulina: 8.8 - 15 mg/kg Vía Oral en agua por 5 días.
• Valnemulina: 10 - 12 mg/kg en alimento por 10-14 días.
• Vacunación: Oral o IM según fabricante en lechones.
Observación Clínica al TratarSIN MEJORÍA / OBSERVACIÓN DESFAVORABLE: Diarrea continua de aspecto alquitranado (hemorrágica) o acuosa grisácea; el animal muestra palidez severa por anemia, deshidratación avanzada y pérdida rápida de peso.