Homoclave	GC_S_014
estado sanitario e inmunologico	MALO
desarrollo del aparato reproductor	DESARROLLADO
edad a la pubertad	210
edad al primer servicio	240
peso vivo a la primera inseminacion	150
numero total de pezones	16
indice genetico de la linea	ALTO
tasa de longevidad predicha	4
alineacion y calidad de los pezones	BUENA
estructura y solidez de aplomos	MALA
integridad y simetria de pezuñas	MALA
espesor de grasa dorsal al primer servicio	14
capacidad pelvica y amplitud de cadera	BUENA
ganancia media diaria	650
temperamento y docilidad	DOCIL
raza	YORK



Cojeras Porcinas

Descripción / Etiología: Afecciones osteoarticulares o de las pezuñas que producen claudicación, dolor, inflamación articular e incapacidad para desplazarse.

Medicamentos de ElecciónTratamiento: Ketoprofeno, Zinc, Cobre y Biotina.

Dosificación y Vía de Administración• Ketoprofeno: 3 mg/kg IM cada 24 hrs por 3 días consecutivos.

• Suplementación mineral (Zinc, Cobre y Biotina): Vía oral/alimento (Zinc: 100-150 ppm; Biotina: 0.2-0.5 mg/kg de alimento de forma continua).

Observación Clínica al TratarEVALUACIÓN FAVORABLE: Apoyo progresivo del miembro afectado, disminución notoria de la claudicación y retorno gradual del desplazamiento fluido dentro del corral.