Homoclave	GC_S_021
estado sanitario e inmunologico	MALO
desarrollo del aparato reproductor	SIN DESARROLLAR
edad a la pubertad	180
edad al primer servicio	240
peso vivo a la primera inseminacion	135
numero total de pezones	16
indice genetico de la linea	BAJO
tasa de longevidad predicha	4
alineacion y calidad de los pezones	BUENA
estructura y solidez de aplomos	MALA
integridad y simetria de pezuñas	BUENA
espesor de grasa dorsal al primer servicio	14
capacidad pelvica y amplitud de cadera	BUENA
ganancia media diaria	650
temperamento y docilidad	DOCIL
raza	LANDRACE



Leptospirosis Porcina

Descripción / Etiología: Infección bacteriana por Leptospira spp. que afecta riñones y tracto reproductivo, causando hemoglobinuria y fallos reproductivos.

Medicamentos de ElecciónTratamiento: Oxitetraciclina, Estreptomicina, Vacunación.

Dosificación y Vía de Administración• Oxitetraciclina LA: 20 mg/kg IM (dosis única, repetir a las 72 hrs si es necesario).

• Estreptomicina: 25 mg/kg IM dosis única para la eliminación del estado de portador renal.

• Vacunación: 2 mL IM de bacterina específica según esquema del hato.

Observación Clínica al TratarEVALUACIÓN FAVORABLE: Normalización del color de la orina (desaparición del tono rojizo/oscuro), recuperación del estado general y detención de abortos.