


2.2 Rotations, Projections and Reflections

Rotations in \mathbb{R}^2

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos(\alpha + \theta) \\ r \sin(\alpha + \theta) \end{bmatrix}$$

trig
ID

$$= \begin{bmatrix} r (\cos \alpha \cos \theta - \sin \alpha \sin \theta) \\ r (\sin \alpha \cos \theta + \cos \alpha \sin \theta) \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$



A Vector \vec{v} and $\text{rot}_\theta(\vec{v})$,

its Counterclockwise Rotation by θ

$$= \begin{bmatrix} (\cos \theta)(r \cos \alpha) + (-\sin \theta)(r \sin \alpha) \\ (\cos \theta)(r \sin \alpha) + (\sin \theta)(r \cos \alpha) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \end{bmatrix}$$


$$= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}_\theta(\vec{v}) = \langle x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta \rangle$$

✓ **Theorem:** The function $rot_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ that takes a vector \vec{v} and rotates \vec{v} counterclockwise by an angle of θ about the origin is a **linear transformation**, with:

$$[rot_\theta] = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}.$$

Note
 θ is fixed!
 so $L \nmid T!$



$$\theta = \pi/6 \approx 30^\circ$$



$$[rot_{\pi/6}] = \begin{bmatrix} \cos(\pi/6) & -\sin(\pi/6) \\ \sin(\pi/6) & \cos(\pi/6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \quad \& \quad \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

$$\sqrt{3}/2 \approx 0.866$$


$$\approx \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\approx \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.9 \end{bmatrix}$$






Basic Projections in \mathbb{R}^2

$$\text{proj}_x(\langle x, y \rangle) = \langle x, 0 \rangle.$$



$$\text{proj}_y(\langle x, y \rangle) = \langle 0, y \rangle.$$



Key Relationship:

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \langle x, y \rangle \\ &= \langle x, 0 \rangle + \langle 0, y \rangle \\ &= \text{proj}_x(\vec{v}) + \text{proj}_y(\vec{v}) \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \text{Proj}_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$$

||

$$\begin{bmatrix} \text{Proj}_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}$$


$$\checkmark \quad \text{proj}_x(\vec{v}) = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{and}$$

$$\checkmark \quad \text{proj}_y(\vec{v}) = \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$[\text{proj}_x] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[\text{proj}_y] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Basic Reflections in \mathbb{R}^2



A Vector \vec{v} and its Three Basic Reflections in \mathbb{R}^2 .

• Reflection Across x-axis

across x-axis
across y-axis

$$\text{Ref}_x(\vec{v}) = \text{proj}_x(\vec{v}) - \text{proj}_y(\vec{v})$$

$$[\text{Ref}_x] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$$

Check

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-0 \\ 0-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}.$$

• Reflection Across y-axis

$$\text{Ref}_y(\vec{v}) = \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix} = -\text{proj}_x(\vec{v}) + \text{proj}_y(\vec{v})$$

$$[\text{Ref}_y] = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$-\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix}$$


$$\begin{aligned} \text{refl}_x \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right) &= \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{refl}_y \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right) &= \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \text{ and} \end{aligned}$$

Across the origin

$$\begin{aligned} \text{refl}_{\vec{0}_2} \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right) &= \begin{bmatrix} -x \\ -y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \end{aligned}$$





The Geometric Relationships Among
 \vec{v} , $proj_x(\vec{v})$, $proj_y(\vec{v})$, $refl_x(\vec{v})$ and $refl_y(\vec{v})$

✓

$$refl_x(\vec{v}) = proj_x(\vec{v}) - proj_y(\vec{v}), \text{ and}$$

✓

$$refl_y(\vec{v}) = proj_y(\vec{v}) - proj_x(\vec{v}).$$

General Projections and Reflections in \mathbb{R}^2



L : line through origin

L^\perp : line through origin
perpendicular to L



$$\vec{v} = \text{proj}_L(\vec{v}) + \text{proj}_{L^\perp}(\vec{v})$$

$$\text{refl}_{L^\perp}(\vec{v})$$



$$\text{Ref}_{L^\perp}(\vec{v}) = -\text{proj}_L(\vec{v}) + \text{proj}_{L^\perp}(\vec{v})$$

$$\text{Ref}_L(\vec{v}) = \text{proj}_L(\vec{v}) - \text{proj}_{L^\perp}(\vec{v})$$

The Projections of \vec{v} Onto a Line L and its Orthogonal Complement L^\perp , and the Reflection of \vec{v} Across L .

Basic Projections in \mathbb{R}^3

$$\text{proj}_x(\langle x, y, z \rangle) = \langle x, 0, 0 \rangle$$

$$\text{proj}_y(\langle x, y, z \rangle) = \langle 0, y, 0 \rangle$$

$$\text{proj}_z(\langle x, y, z \rangle) = \langle 0, 0, z \rangle$$

$$\text{proj}_{xy}(\langle x, y, z \rangle) = \langle x, y, 0 \rangle$$


$$\text{proj}_{xz}(\langle x, y, z \rangle) = \langle x, 0, z \rangle$$

$$\text{proj}_{yz}(\langle x, y, z \rangle) = \langle 0, y, z \rangle$$

$$\begin{aligned}
\vec{v} &= \langle x, y, z \rangle \\
&= \langle x, 0, 0 \rangle + \langle 0, y, z \rangle \\
&= \textit{proj}_x(\langle x, y, z \rangle) + \textit{proj}_{yz}(\langle x, y, z \rangle),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{v} &= \langle x, y, z \rangle \\
&= \langle 0, y, 0 \rangle + \langle x, 0, z \rangle \\
&= \textit{proj}_y(\langle x, y, z \rangle) + \textit{proj}_{xz}(\langle x, y, z \rangle), \text{ and}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{v} &= \langle x, y, z \rangle \\
&= \langle 0, 0, z \rangle + \langle x, y, 0 \rangle \\
&= \textit{proj}_z(\langle x, y, z \rangle) + \textit{proj}_{xy}(\langle x, y, z \rangle)
\end{aligned}$$



The Relationships Among \vec{v} , $proj_{xy}(\vec{v})$ and $proj_z(\vec{v})$.

$$\begin{aligned}
 refl_{xy}(\langle x, y, z \rangle) &= \langle x, y, -z \rangle \\
 &= \langle x, y, 0 \rangle - \langle 0, 0, z \rangle \\
 &= proj_{xy}(\langle x, y, z \rangle) - proj_z(\langle x, y, z \rangle).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 refl_z(\langle x, y, z \rangle) &= proj_z(\langle x, y, z \rangle) - proj_{xy}(\langle x, y, z \rangle) \\
 &= \langle 0, 0, z \rangle - \langle x, y, 0 \rangle \\
 &= \langle -x, -y, z \rangle.
 \end{aligned}$$

The Basic *Reflection Operators*:

$$\text{refl}_x(\langle x, y, z \rangle) = \langle x, -y, -z \rangle$$

$$\text{refl}_y(\langle x, y, z \rangle) = \langle -x, y, -z \rangle$$

$$\text{refl}_z(\langle x, y, z \rangle) = \langle -x, -y, z \rangle$$


$$\text{refl}_{xy}(\langle x, y, z \rangle) = \langle x, y, -z \rangle$$

$$\text{refl}_{xz}(\langle x, y, z \rangle) = \langle x, -y, z \rangle$$

$$\text{refl}_{yz}(\langle x, y, z \rangle) = \langle -x, y, z \rangle$$

$$\text{refl}_{\vec{0}_3}(\langle x, y, z \rangle) = \langle -x, -y, -z \rangle$$

General Projections and Reflections in \mathbb{R}^3



We need the decomposition:

$$\vec{v} = proj_\Pi(\vec{v}) + proj_L(\vec{v}),$$

where $proj_\Pi(\vec{v}) \in \Pi$ and $proj_L(\vec{v}) \in L$.

General Principle:

If $\vec{v} = \text{proj}_W(\vec{v}) + \text{proj}_{W^\perp}(\vec{v})$, then:

$$\text{refl}_W(\vec{v}) = \text{proj}_W(\vec{v}) - \text{proj}_{W^\perp}(\vec{v})$$

For planes Π and lines L through the origin:

$$\text{refl}_\Pi(\vec{v}) = \text{proj}_\Pi(\vec{v}) - \text{proj}_L(\vec{v}), \text{ and}$$

$$\text{refl}_L(\vec{v}) = \text{proj}_L(\vec{v}) - \text{proj}_\Pi(\vec{v}).$$