

Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
Análisis de señales y sistemas.

Tercer examen: Solución de ejercicios

Junio de 2011

Nombre: _____ Grupo: _____

Instrucciones

- a) resuelva todos los problemas
- b) debe justificar sus resultados (mostrar el procedimiento)
- c) escribir las soluciones de manera ordenada y clara
- d) se prohíbe copiar
- e) estudiantes que falten al inciso b) y c), el problema respectivo será anulado, alumnos que falten al inciso d), el examen será anulado y se le reportará con las autoridades competentes

1. La Figura 1 muestra el espectro trigonométrico de Fourier de una señal $f(t)$




Figura 1: Espectro de Fourier

- a) Escribe la serie de Fourier trigonométrica compacta de la señal $f(t)$.
 - b) Escribe la serie de Fourier exponencial compleja de la señal $f(t)$ a partir de la serie de Fourier trigonométrica compacta.
 - c) Gráfica el espectro exponencial de Fourier.
2. La serie de Fourier exponencial compleja de una cierta función periódica es dada por
- $$f(t) = (2+2j)e^{-3tj} + 2je^{-tj} + 3 - 2je^{tj} + (2-2j)e^{3tj}$$
- a) Gráfica el espectro exponencial de Fourier
 - b) Gráfica el espectro trigonométrico de Fourier.
 - c) Encuentra la serie de Fourier en forma trigonométrica compacta para este espectro.

3. Encontrar la serie de Fourier para la función $f(t)$ definida por $f(t) = t$ en el intervalo $(-\pi, \pi)$, sabiendo que $f(t+2\pi) = f(t)$, a partir de esto concluya que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

4. El conjunto de polinomios de Legendre $P_n(t)$ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$), forma un conjunto completo de funciones ortogonales sobre el intervalo $(-1, 1)$. Estos polinomios están definidos por:

$$P_n(t) = \frac{1}{n!2^n} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Así $P_0(t) = 1$, $P_1(t) = t$, $P_2(t) = \frac{1}{2}(3t^2 - 1)$, $P_3(t) = \frac{1}{2}(5t^3 - 3t)$, etc. Los polinomios de Legendre son ortogonales se puede verificar que:

$$\int_{-1}^1 P_m(t)P_n(t) dt = \begin{cases} \frac{2}{2m+1} & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

Representa $f(t)$ de la Figura 2 mediante su serie Legendre de Fourier sobre el intervalo $(-1, 1)$. Calcula solo los dos primeros coeficientes no cero de la serie.




Figura 2: Función $f(t)$

5. Resuelve lo siguiente

a) Si $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, demostrar que

$$\mathcal{F}\{f(at)e^{j\omega_0 t}\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega - \omega_0}{a}\right)$$

b) Si $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, demostrar que la transformada de Fourier de $f(t)\sin(\omega_0 t)$ es

$$\frac{1}{2j} [F(\omega - \omega_0) - F(\omega + \omega_0)]$$

c) Utilizar el teorema de convolución para encontrar

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{(1 + j\omega)(2 + j\omega)}\right\}$$

d) Hallar la transformada de Fourier de

$$f(t) = e^{-a|t|}$$