

Lista 1 de Álgebra Linear e Aplicações

11 de setembro de 2022

Exercício 1: Determine se W é um subespaço vetorial do espaço vetorial V dado em cada um dos casos. Em caso positivo encontre uma base para W .

- (a) $W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4; x^2 = 0\}$ e $V = \mathbb{R}^4$ com as operações usuais.
- (b) $W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4; z = 1\}$ e $V = \mathbb{R}^4$ com as operações usuais.
- (c) $W = \{p(x) \in \mathcal{P}_{2022}(\mathbb{R}); p'(x) = 0\}$ e $V = \mathcal{P}_{2022}(\mathbb{R})$ com as operações usuais.
- (d) $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ a & a+b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}); a, b \in \mathbb{R} \right\}$ e $V = M_2(\mathbb{R})$ com as operações usuais.
- (e) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x, y \text{ e } z \text{ estão em PA}\}$ e $V = \mathbb{R}^3$ com as operações usuais.
- (f) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x - y + 1 = 0\}$ e $V = \mathbb{R}^3$ com as operações usuais.
- (g) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x - y + z = 0\}$ e $V = \mathbb{R}^3$ com as operações usuais.

Exercício 2: Considere o espaço vetorial real $V = \mathcal{C}(\mathbb{R})$, das funções contínuas de \mathbb{R} em \mathbb{R} , com a soma $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ e o produto por escalar $\lambda(f(x)) = \lambda f(x)$.

- (a) Prove que V tem dimensão infinita.

Sugestão: Encontre um conjunto infinito de vetores LI.

- (b) Determine se $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}) = \{f(x) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}); f'(x) \text{ existe e é contínua}\}$, o conjunto das funções em V que são diferenciáveis de derivada contínua, é um subespaço próprio de V .
- (c) Determine se $W = \{f(x) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}); f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}\}$, o conjunto das funções contínuas não negativas, é um subespaço próprio de V .

Exercício 3: Seja V um espaço vetorial genérico. Determine se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Caso seja falsa, dê um contra-exemplo.

- (a) Seja $W \subset \mathbb{R}^4$ um subespaço vetorial próprio. Então existem 4 vetores LI em W .
- (b) $X = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2; x \in \mathbb{R}\}$ e $Y = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2; y \in \mathbb{R}\}$ são subespaços vetoriais de \mathbb{R}^2 .
- (c) Se U e W são subespaços vetoriais de V então $U \cup W$ também é um subespaço vetorial de V .
- (d) Se U e W são subespaços vetoriais de V então $U \cap W$ também é um subespaço vetorial de V .
- (e) Dados $u, v \in V$, temos que u e v são LI, se e somente se, $u + v$ e $u - v$ são LI.
- (f) Quaisquer 10 vetores LI em \mathbb{R}^{10} formam uma base.
- (g) Dados 4 vetores não nulos em \mathbb{R}^3 , eles não podem formar uma base de \mathbb{R}^3 pois apesar de gerarem todo o espaço, eles não serão LI.