
Trabajo Grupal - Primer Parcial

Física Computacional

Nombres de los Integrantes:

Mamani Huarsaya, Jorge Luis

Aragón Carpio Fredy José

Ayamamani Anasco, Francis Willian

Estudiante 4

Estudiante 5

13 de mayo de 2026

Índice

1. Movimiento parabólico	3
1.1. Enunciado	3
1.2. Aplicación de la ecuación	3
1.3. Aplicación del método de Heun	5
1.4. Comparación de resultados	7
2. Simulación de 5 cuerpos gravitacionales	8
2.1. Modelo y aceleraciones	8
2.2. Implementación	8

1. Movimiento parabólico

1.1. Enunciado

La trayectoria de una partícula es (extraído del libro de Serway o Sears):

$$y = x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2 \quad (1)$$

donde v_0 y α_0 son las condiciones iniciales.

1. Mediante una gráfica determine el alcance mediante la ecuación de arriba. Las condiciones iniciales son $v_0 = 5 \text{ m/s}$ con $\alpha_0 = 60^\circ$.
2. Aplicar el método de Heun y encuentre el alcance.
3. Haga la comparación de los resultados encontrados. Para ello varíe el tamaño de paso h para que el resultado sea confiable.

1.2. Aplicación de la ecuación

Para resolver la primera parte del problema, se utilizó directamente la ecuación analítica del movimiento parabólico mostrada en la Ecuación 1. Se implementó un programa en Python que genera múltiples valores de la posición horizontal x y evalúa la altura correspondiente $y(x)$ para cada punto.

Las condiciones iniciales consideradas fueron $v_0 = 5 \text{ m/s}$, $\alpha_0 = 60^\circ$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$. Luego, se graficó la trayectoria de la partícula y se observó la forma parabólica característica del movimiento y determinar visualmente el alcance horizontal.

La implementación utilizada se muestra en el Código 1.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parámetros
5 g = 10
6 v0 = 5
7 alpha = np.radians(60)
8
9 # Ecuación
10 x = np.linspace(0, 2.3, 500)
11 y = x * np.tan(alpha) - (g / (2 * v0**2 * np.cos(alpha)**2)) * x**2
12
13 # Encontrar el alcance
14 indice = np.where(y >= 0)[0][-1]
15 alcance = x[indice]
16
17 # Gráfica
18 plt.plot(x, y)
19 plt.scatter(alcance, 0)
20 plt.text(alcance, 0, f'{alcance:.4f}')
21 plt.grid(True)
22 plt.xlabel('x (m)')
23 plt.ylabel('y (m)')
24 plt.title('Movimiento parabólico - Analítico')
25
26 plt.savefig('../images/problem01_1.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
27 plt.show()
```

Código 1: Implementación de la gráfica de la ecuación 1.

La Figura 1 muestra la trayectoria obtenida mediante la ecuación analítica.




Figura 1: Solución analítica.

A partir de la gráfica obtenida, se observa que el proyectil alcanza aproximadamente una dis-

tancia horizontal de 2.16 m antes de regresar al suelo.

1.3. Aplicación del método de Heun

Para resolver numéricamente el movimiento parabólico, se empleó el método de Heun, el cual corresponde a un método predictor-corrector de segundo orden utilizado para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias.

El movimiento de la partícula puede describirse mediante el siguiente sistema:

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (2)$$

$$\frac{dy}{dt} = v_y \quad (3)$$

$$\frac{dv_x}{dt} = 0 \quad (4)$$

$$\frac{dv_y}{dt} = a \quad (5)$$

donde la aceleración gravitacional se considera constante:

$$a = -10 \text{ m/s}^2 \quad (6)$$

Las componentes iniciales de la velocidad se calcularon a partir de la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento:

$$v_{x0} = v_0 \cos \alpha_0 \quad (7)$$

$$v_{y0} = v_0 \sin \alpha_0 \quad (8)$$

El método de Heun se aplicó utilizando un esquema predictor-corrector. En cada iteración, primero se estimó una velocidad vertical predictora mediante el método de Euler y posteriormente se corrigió la posición vertical utilizando el promedio entre la pendiente inicial y la pendiente predicha.

La integración numérica se realizó para intervalos de tiempo separados por un tamaño de paso $h = 0.01$. La simulación continuó hasta que la partícula regresó al suelo, es decir, cuando la coordenada vertical tomó valores menores que cero.

La implementación desarrollada se muestra en el Código 2.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parámetros
5 a = -10
6 v0 = 5
7 alpha = np.radians(60)
8
9 vx = v0 * np.cos(alpha)
10 vy = v0 * np.sin(alpha)
11
12 x = 0
13 y = 0
14
15 h = 0.01
16 tfin = 50
17
18 px = [x]
19 py = [y]
20
21 for t in np.arange(0, tfin, h):
22
23     vy_pred = vy + h * a
24
25     y = y + h * (vy + vy_pred) / 2
26     x = x + h * vx
27
28     vy = vy_pred
29
30     px.append(x)
31     py.append(y)
32
33     if y < 0:
34         break
35
36 # Último punto físico válido
37 alcance = px[-2]
38
39 # Gráfica
40 plt.plot(px, py)
41 plt.scatter(alcance, 0)
42 plt.text(alcance, 0, f'{alcance:.4f}')
43 plt.grid(True)
44 plt.xlabel('x (m)')
45 plt.ylabel('y (m)')
46 plt.title('Movimiento parabólico - Método de Heun')
47
48 plt.savefig('../images/problem01_2.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
49 plt.show()
```

Código 2: Implementación del método de Heun para el movimiento parabólico.

La Figura 2 muestra la trayectoria obtenida mediante el método numérico.




Figura 2: Trayectoria obtenida mediante el método de Heun.

El alcance horizontal obtenido mediante el método de Heun fue aproximadamente 2.16 m, mostrando una buena concordancia con el resultado analítico obtenido previamente.

1.4. Comparación de resultados

Finalmente, se realizaron simulaciones utilizando distintos tamaños de paso h con el objetivo de analizar la convergencia del método de Heun. Para cada simulación, el alcance horizontal se determinó tomando el último punto válido antes de que la trayectoria atravesase el suelo, es decir, antes de que la coordenada vertical tome valores negativos.

Posteriormente, los resultados numéricos fueron comparados con el alcance obtenido mediante la solución analítica desarrollada en la primera parte del problema.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.

Paso h	Alcance obtenido (m)	Error relativo (%)
0.1	2.0000	7.4812
0.01	2.1500	0.5423
0.001	2.1650	0.1516

Tabla 1: Comparación del alcance para diferentes tamaños de paso.

Se observa que el alcance calculado mediante el método numérico depende directamente del tamaño de paso utilizado durante la integración temporal. Para valores grandes de h , la simulación produce una aproximación menos precisa debido a que el método avanza mediante intervalos discretos relativamente amplios.

Al disminuir el tamaño de paso, los puntos calculados se aproximan progresivamente a la trayectoria analítica y el error relativo disminuye considerablemente. Esto evidencia la convergencia del método de Heun hacia la solución exacta del problema.

En conclusión, el método de Heun proporciona resultados satisfactorios para el movimiento pa-

rábólico y mejora su precisión conforme se reduce el tamaño de paso empleado en la simulación.

2. Movimiento de 2 cuerpos

2.1. Enunciado

Se estudió el movimiento del objeto interestelar *3I/ATLAS*, el cual atravesó el sistema solar siguiendo una trayectoria abierta alrededor del Sol. El objetivo fue modelar numéricamente su movimiento utilizando la ley de gravitación universal y datos aproximados obtenidos de información astronómica disponible públicamente.

Para el desarrollo del problema se consideraron:

- Masa del Sol.
- Radio del Sol.
- Velocidad aproximada de *3I/ATLAS*.
- Movimiento gravitacional de dos cuerpos.

El sistema se simplificó considerando únicamente la interacción gravitacional entre el Sol y el objeto interestelar.

2.2. Modelo físico

La fuerza gravitacional entre el Sol y el objeto se modeló mediante la ley de gravitación universal:

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^3}\vec{r} \quad (9)$$

donde:

- G es la constante de gravitación universal.
- M es la masa del Sol.
- m es la masa del objeto.
- r es la distancia entre ambos cuerpos.

A partir de esta expresión se obtuvieron las aceleraciones en cada eje:

$$a_x = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (10)$$

$$a_y = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (11)$$

Estas ecuaciones fueron implementadas numéricamente en MATLAB para calcular la trayectoria del objeto alrededor del Sol.

2.3. Normalización de unidades

Con el objetivo de simplificar los cálculos numéricos, las distancias fueron expresadas en radios solares.

Se tomó:

$$R_{\odot} = 696\,350 \text{ km} \quad (12)$$

Por tanto:

$$1 \text{ unidad} = 1R_{\odot} \quad (13)$$

Las velocidades obtenidas de información astronómica fueron inicialmente expresadas en km/h y posteriormente convertidas a radios solares por hora dividiendo entre el radio solar.

Las componentes aproximadas de velocidad utilizadas fueron:

$$v_x \approx 62\,689 \text{ km/h} \quad (14)$$

$$v_y \approx -211\,922 \text{ km/h} \quad (15)$$

Luego de la conversión:

$$v_x \approx 0.090 \quad (16)$$

$$v_y \approx -0.304 \quad (17)$$

Las posiciones iniciales también fueron expresadas en radios solares:

$$x_0 = -458.33079 \quad (18)$$

$$y_0 = 2665.95683 \quad (19)$$

Estos valores fueron estimados utilizando una hoja de cálculo para realizar conversiones y aproximaciones temporales hacia atrás desde el perihelio.

2.4. Implementación numérica

La trayectoria se calculó utilizando integración temporal mediante el método de Euler explícito.

La implementación utilizada se muestra en el Código ??.

```

1 function ax = aceleracionx(x,y,a,b)
2     ax = -((x-a)/((x-a)^2+(y-b)^2)^1.5);
3 end
4 function ay = aceleraciony(x,y,a,b)
5     ay = -((y-b)/((x-a)^2+(y-b)^2)^1.5);
6 end
7 clear, clf, hold off; n=0;
8 % Constantes del Sistema
9 %M_sol = 1.9885e30;
10 M_sol = 1; %1 masa de sol
11 %g_sol = 274;
12 g_sol = 1; %1 gravedad del sol
13 %R=0.7e9;
14 R=1; % 1 radio del sol
15 h=1; tfin=16000;
16 GM = M_sol*g_sol;
17 a = 0;
18 b = 0;
19 th2 = 0:0.01:2*pi;
20 xunit2 = a + 1 * cos(th2);
21 yunit2 = b + 1 * sin(th2);
22 hold on;
23 plot(xunit2, yunit2, 'g');
24 % Condiciones iniciales
25 x=-458.33079; y=2665.95683; vx=0.090026; vy=-0.304333; px(1)=x; py(1)=y; n=0;
26 for t=0:h:tfin
27     ax=(aceleracionx(x,y,a,b)*GM)/R^2; ay=(aceleraciony(x,y,a,b)*GM)/R^2;
28     vx = vx + ax*h; x = x + vx*h;
29     vy = vy + ay*h; y = y + vy*h;
30     px(n+1) = x; py(n+1) = y; n=n+1;
31 end
32 plot(px,py);
33 grid on;
34 xlim([-3000 3000]);
35 ylim([-3000 3000]);

```

Código 3: Simulación numérica de la trayectoria de 3I/ATLAS.

La simulación se realizó utilizando un tamaño de paso pequeño para reducir el error numérico durante la integración.

2.5. Resultados

La Figura ?? muestra la trayectoria obtenida para el objeto interestelar al pasar cerca del Sol.




Figura 3: Trayectoria aproximada de 3I/ATLAS alrededor del Sol.

En la figura se observa una trayectoria abierta característica de un objeto interestelar que no permanece ligado gravitacionalmente al Sol.

Debido a pequeñas variaciones decimales en las condiciones iniciales y en las conversiones realizadas, la trayectoria puede desplazarse aproximadamente entre 10 y 20 radios solares. Sin embargo, el comportamiento general permanece consistente y conserva la forma hiperbólica esperada.

Asimismo, la gráfica presenta una trayectoria visualmente muy abierta. Esto ocurre porque el objeto posee una velocidad extremadamente alta y la gravedad solar únicamente desvía parcialmente su movimiento.

2.6. Tipo de trayectoria

La trayectoria obtenida corresponde a una órbita hiperbólica.

Una órbita hiperbólica ocurre cuando la energía mecánica total del sistema es positiva, es decir, cuando el objeto posee suficiente velocidad para escapar permanentemente de la atracción gravitacional del Sol.

La excentricidad orbital cumple:

$$e > 1 \quad (20)$$

En el caso de 3I/ATLAS, los datos astronómicos indican una excentricidad aproximada:

$$e \approx 6.3 \quad (21)$$

lo cual confirma que el objeto proviene del espacio interestelar y continuará alejándose del sistema solar después de su acercamiento al Sol.

2.7. Conclusiones

La simulación permitió modelar de manera aproximada el movimiento de un objeto interestelar utilizando el problema gravitacional de dos cuerpos.

Los resultados obtenidos muestran una trayectoria hiperbólica abierta, coherente con las observaciones astronómicas reportadas para 3I/ATLAS.

Además, se verificó que pequeñas variaciones numéricas en las condiciones iniciales producen desplazamientos apreciables en la trayectoria, lo cual evidencia la sensibilidad del sistema a errores de redondeo y aproximación durante las conversiones numéricas.

3. Simulación de 5 cuerpos gravitacionales

Simular el movimiento de 5 cuerpos gravitacionales. Los primeros 4 se ubican en los vértices de un cuadrado de lado a . Encontrar las aceleraciones, modificar las funciones de dichas aceleraciones y graficar las trayectorias resultantes.

3.1. Modelo y aceleraciones

El sistema consiste en cuatro masas fijas ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado $a = 2$, y una quinta partícula C_5 que se mueve libremente bajo la atracción gravitacional de las cuatro masas. A diferencia del problema general de N cuerpos, aquí solo C_5 se desplaza, mientras que las masas de los vértices permanecen estáticas.

La aceleración de C_5 en la posición (x, y) se obtiene sumando la contribución gravitacional de cada masa fija:

$$\vec{a}_5 = \sum_{k=1}^4 \frac{\vec{r}_k - \vec{r}_5}{|\vec{r}_k - \vec{r}_5|^3} \quad (22)$$

donde $\vec{r}_k$ es la posición del vértice k y $\vec{r}_5 = (x, y)$ es la posición actual de C_5 . Esta expresión corresponde directamente a la ley de gravitación de Newton con $G = 1$ y masas unitarias. No se emplea parámetro de suavizado, por lo que se detecta explícitamente una colisión cuando C_5 se aproxima a menos de $R_{\text{col}} = 0.5$ de alguna masa fija, descartando esa trayectoria.

Para explorar distintas trayectorias se realiza un barrido sobre la velocidad horizontal inicial v_{x0} de C_5 , manteniendo fijas su posición inicial $(x_0, y_0) = (2, 7)$ y velocidad vertical $v_{y0} = 0$. De todas las trayectorias simuladas se seleccionan las cinco cuya trayectoria más se aproxima al punto de partida, es decir, las más cercanas a ser órbitas cerradas.

3.2. Implementación

El primer bloque define los parámetros del sistema: el lado del cuadrado $a = 2$, el paso de integración $h = 0.01$, el tiempo de simulación $t_{\text{fin}} = 750$, las condiciones iniciales de C_5 y el barrido de velocidades $v_{x0} \in [0, 1.4]$. También se establecen las posiciones fijas de los cuatro vértices y el radio de colisión $R_{\text{col}} = 0.5$.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # =====
5 #  SIMULACIÓN DE 5 CUERPOS GRAVITACIONALES
6 #  4 masas fijas en vértices del cuadrado de lado a
7 #  C5: partícula de prueba que orbita bajo su atracción
8 #  =====
9
```

```

10 # -----
11 # Parámetros del sistema
12 # -----
13 a = 2 # lado del cuadrado
14 h = 0.01 # paso de integración (método de Euler)
15 tfin = 750 # tiempo final de simulación
16 x0 = 2 # posición inicial x de C5
17 y0 = 7 # posición inicial y de C5
18 vy0 = 0 # velocidad vertical inicial de C5
19
20 # -----

```

```

22 # Se prueban distintos vx0 para encontrar órbitas cerradas
23 # -----
24 vx0_list = np.arange(0, 1.4 + 0.02, 0.02)
25
26 # -----
27 # Posiciones fijas de las 4 masas en los vértices
28 # y radio de colisión para detectar impacto con C5
29 # -----
30 vx_vert = np.array([ a/2, -a/2, -a/2, a/2])
31 vy_vert = np.array([ a/2, a/2, -a/2, -a/2])
32 R_col = 0.5

```

Código 4: Parámetros del sistema, condiciones iniciales y posiciones de los vértices.

El segundo bloque define la función `acel_cuadrado`, que calcula la aceleración gravitacional sobre C_5 sumando la atracción de cada una de las cuatro masas fijas. Luego, el bucle principal itera sobre cada valor de v_{x0} , integra la trayectoria mediante el método de Euler, detecta posibles colisiones y almacena las trayectorias válidas. Al finalizar, se ordenan por distancia mínima al punto de partida y se seleccionan las cinco más cerradas.

```

34 # -----
35 # Función de aceleración gravitacional sobre C5
36 # Suma la atracción de las 4 masas fijas en los vértices
37 # -----
38 def acel_cuadrado(x, y, a):
39     vx = np.array([ a/2, -a/2, -a/2, a/2])
40     vy = np.array([ a/2, a/2, -a/2, -a/2])
41     ax = 0.0
42     ay = 0.0
43     for k in range(4):
44         dx = x - vx[k]
45         dy = y - vy[k]
46         r3 = (dx**2 + dy**2)**1.5
47         ax = ax - dx / r3
48         ay = ay - dy / r3
49     return ax, ay
50
51 # -----
52 # Simulación con método de Euler para cada vx0
53 # Se integra la trayectoria de C5 y se descarta si impacta
54 # -----
55 trayectorias = []

```

```

57 for vx0 in vx0_list:
58     x = x0
59     y = y0

```

```

60     vx = vx0
61     vy = vy0
62     px = [x]
63     py = [y]
64     impacto = False
65
66     for t in np.arange(0, tfin, h):
67         ax, ay = acel_cuadrado(x, y, a)
68
69         vx = vx + ax * h
70         x = x + vx * h
71         vy = vy + ay * h
72         y = y + vy * h
73
74         for i in range(4):
75             if np.sqrt((x - vx_vert[i])**2 + (y - vy_vert[i])**2) <= R_col:
76                 impacto = True
77                 break
78         if impacto:
79             break
80
81         px.append(x)
82         py.append(y)
83
84     if not impacto and len(px) > 1:
85         px = np.array(px)
86         py = np.array(py)
87         dist = np.sqrt((px[1:] - x0)**2 + (py[1:] - y0)**2)
88         min_dist = np.min(dist)
89         trayectorias.append({
90             'vx0': vx0,
91             'px': px,
92             'py': py,
93             'dist_min': min_dist
94         })
95

```

Código 5: Función de aceleración gravitacional, integración por Euler y selección de trayectorias.

El tercer bloque genera la figura con fondo oscuro. Cada trayectoria seleccionada se traza con un color distinto e incluye su valor de v_{x0} en la leyenda. Las cuatro masas fijas se representan como círculos rellenos en los vértices del cuadrado, unidos por un contorno punteado, y C_5 aparece como un círculo blanco en el origen para referencia visual.

```

97 # Seleccionar las 5 trayectorias más cerradas
98 # -----
99 trayectorias.sort(key=lambda t: t['dist_min'])
100 N_cerradas = min(5, len(trayectorias))
101 candidatas = trayectorias[:N_cerradas]
102
103 # -----
104 # Figura - trayectorias de C5 + masas fijas
105 # -----
106 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 8))
107 fig.patch.set_facecolor('k')
108 ax1.set_facecolor('k')
109 ax1.tick_params(colors='w')
110 ax1.xaxis.label.set_color('w')
111 ax1.yaxis.label.set_color('w')
112 ax1.title.set_color('w')
113 for spine in ax1.spines.values():
114     spine.set_edgecolor([0.3, 0.3, 0.3])

```

```

115 ax1.grid(True, color=[0.3, 0.3, 0.3])
116 ax1.set_aspect('equal')
117
118 colores = [
119     [1.0, 0.0, 0.0],
120     [0.0, 1.0, 0.0],
121     [0.0, 0.5, 1.0],
122     [1.0, 0.0, 1.0],
123     [1.0, 1.0, 0.0]
124 ]
125 for i, tray in enumerate(candidatas):
126     ax1.plot(tray['px'], tray['py'],
127             color=colores[i], linewidth=1.5,
128             label=f"$v_{\{x0\}}$ = {tray['vx0']:.2f}")
129
130 # Cuadrado punteado que une los 4 vértices
131 vx_cierre = np.append(vx_vert, vx_vert[0])
132 vy_cierre = np.append(vy_vert, vy_vert[0])
133 ax1.plot(vx_cierre, vy_cierre, 'w--', linewidth=1.2)
134
135 # 4 masas fijas: círculo relleno
136 theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 200)
137 colores_masas = [
138     [1.0, 0.0, 0.0],
139     [0.0, 1.0, 0.0],
140     [0.0, 0.5, 1.0],
141     [1.0, 0.0, 1.0]
142 ]
143 for i in range(4):
144     cx = vx_vert[i] + R_col * np.cos(theta)
145     cy = vy_vert[i] + R_col * np.sin(theta)

```

Código 6: Configuración visual y generación de la figura de trayectorias.

La Figura 3 muestra las cinco trayectorias más cerradas obtenidas para C_5 durante el tiempo de simulación $t_{\text{fin}} = 750$.




Figura 4: Trayectorias de C_5 bajo la atracción de cuatro masas fijas en los vértices del cuadrado. Se muestran las cinco órbitas cuya trayectoria más se aproxima al punto de partida.

Se observa que C_5 describe trayectorias complejas bajo la influencia simultánea de las cuatro masas fijas. Ninguna de las órbitas obtenidas es perfectamente cerrada, pero las seleccionadas presentan el mayor grado de recurrencia al punto de partida. La simetría del cuadrado impone cierta regularidad en las trayectorias, que tienden a rodear el conjunto de masas o a oscilar entre ellas. La velocidad inicial v_{x0} determina si C_5 escapa hacia el exterior, queda atrapada en una órbita acotada o impacta contra alguna de las masas.

3.3. Conclusión

La simulación reproduce la dinámica gravitacional de una partícula bajo la atracción de cuatro masas fijas mediante la ley de gravitación de Newton. Las trayectorias obtenidas muestran que la geometría del cuadrado genera un campo gravitacional con simetría cuadrada que atrapa a C_5 en órbitas complejas para ciertos valores de v_{x0} . El método de Euler permite integrar el sistema de forma sencilla, aunque acumula error con el tiempo, lo que limita la precisión de las trayectorias para simulaciones largas.