

Nº Pedido: **653559**
Espécie: **Canino**
Gênero: **F**
Responsável: **RONNIE PATRICK AGUIAR**
Dr(a): **3552 JHENIFER ALICE**

Paciente: **BELA**
Raça: **Pinscher**
Idade: **14 anos**
Clínica: **3552 Hosp Vet Upa Pet**
CRMV: **2503**

Data Entrada: **12/12/2025**
Local: **Laboratório**
ID:

Oncohistopatológico de Cadeia Mamária Unilateral (até 3 papilas)

Material: Biópsia
Método: Microscopia e Coloração

Anatomopatológico

Natureza do material conforme requisição:

Cadeia mamária unilateral.

Descrição macroscópica:

Recebido(s) um (1) frasco(s) contendo um (1) produto de mastectomia unilateral com 4 papilas mamárias, medindo 16,2 cm x 2,5 cm x 3,5 cm.

Em M.5, nódulo irregular, elevado e macio medindo 2,5 cm x 2,5 cm x 3 cm. Ao corte, sólido e brancacento (B,C); Em M.5, nódulo irregular, verrucoso e macio medindo 0,8 cm x 0,8 cm x 0,8 cm. Ao corte, sólido e brancacento (D); Linfonodo inguinal amostrado na peça, medindo 1 cm x 0,8 cm x 0,6 cm (A). O material encaminhado foi seccionado, fragmentos representativos foram acondicionados em 4 cassete(s) e encaminhados para processamento histopatológico.

Coloração:

Hematoxilina e eosina

Descrição microscópica:

M.5, nódulo maior - Fragmento de tecido mamário apresentando uma neoformação epitelial maligna, densamente celular, mal demarcada e infiltrativa, composta por células arredondadas a poliédricas dispostas em túbulos com algumas projeções papilares intraluminais com formação de lúmen secundário, formando espaços regulares com bordas definidas e focos de necrose central. Tais células possuem bordos definidos variáveis, citoplasma escasso a moderado eosinofílico e núcleos grandes ovalados com cromatina frouxa e um nucléolo evidente. Há pleomorfismo celular moderado e são observadas 16 figuras de mitose em 2,37 mm². Invasão linfática observada.

M.5, nódulo menor - Fragmento cutâneo apresentando neoplasia maligna caracterizada por células redondas arranjadas predominantemente em ninhos e cordões. As células são redondas com citoplasma moderado, com grânulos basofílicos. Núcleo arredondado, central, com cromatina frouxamente pontilhada sem nucléolo evidente. Observa-se discreto pleomorfismo celular. Observam-se moderados eosinófilos de entremeio. - Figuras de mitose (em 2,37 mm²): 0; - Presença de células multinucleadas (em 2,37 mm²): 1; - Nível de invasão/ infiltração: subcutâneo. Topografia de linfonodo inguinal - Fragmento de tecido não capsulado, ausente de arquitetura histomorfológica referencial, apresentando uma neoplasia epitelial maligna, como descrito nos segmentos acima, associada a extensos focos de necrose.

Diagnóstico / Conclusão:

M.5, nódulo maior - Carcinoma mamário cribriforme grau
M.5, nódulo menor - Mastocitoma grau II (Patnaik) / baixo grau (Kiupel).
Topografia de linfonodo inguinal - Carcinoma mamário cribriforme, sugestivo de metástase nodal.

Observação:

M.5, nódulo maior - Destaque para a observação de invasão linfática. Sugere-se pesquisa de metástases.
Topografia de linfonodo inguinal - Devido à ausência de tecido referencial linfóide não é possível determinar somente pela topografia

Assinado eletronicamente por:
Responsável Técnico MV Dr. Danilo Montanhas de Andrade -
CRMV:47801/SP

Diretor Técnico Prof. Dr. Adilson Kleber Ferreira - CRF:48034/SP

A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Nº Pedido: **653559**
Espécie: **Canino**
Gênero: **F**
Responsável: **RONNIE PATRICK AGUIAR**
Dr(a): **3552 JHENIFER ALICE**

Paciente: **BELA**
Raça: **Pinscher**
Idade: **14 anos**
Clínica: **3552 Hosp Vet Upa Pet**
CRMV: **2503**

Data Entrada: **12/12/2025**
Local: **Laboratório**
ID:

se tratar de linfonodo.

Nota:

A descrição microscópica da análise histopatológica segue as normas do Descriptive Veterinary Pathology Course de acordo com Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) por Bruce Williams, DVM, DACVP, em 2001; modificado do esboço original de 1973 por Garrett S. Dill, Jr, DVM, James B. Moe, DVM, PhD, e Ralph Bunte, DVM.

Referência:

DE NARDI, A. B. et al. Diagnosis, prognosis and treatment of canine cutaneous and subcutaneous mast cell tumors. Cells, v. 11, n. 4, p. 618, 2022.
KIUPEL, M. et al. Proposal of a 2-tier histologic grading system for canine cutaneous mast cell tumors to more accurately predict biological behavior. Veterinary Pathology, v. 48, n. 1, p. 147–155, 2011.
PATNAIK, A. K.; EHLER, W. J.; MACEWEN, E. G. Canine cutaneous mast cell tumor: morphologic grading and survival time in 83 dogs. Veterinary Pathology, v. 21, n. 5, p. 469–474, 1984.
ROMANSIK, E. M.; REILLY, C. M.; KASS, P. H.; MOORE, P. F.; LONDON, C. A. Mitotic index is predictive for survival for canine cutaneous mast cell tumors. Veterinary Pathology, v. 44, n. 3, p. 335–341, 2007.
GOLDSCHMIDT, M. H. et al. Classification and grading of canine mammary tumors. Veterinary Pathology, v. 48, n. 1, p. 117–131, 2011.

Resultado liberado por MV. Natália da Silva Santos - CRMV/SP 48741 em 22/12/2025 às 19:23

Assinado eletronicamente por:
Responsável Técnico MV Dr. Danilo Montanhas de Andrade -
CRMV:47801/SP

Diretor Técnico Prof. Dr. Adilson Kleber Ferreira - CRF:48034/SP

A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.