

แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Nicardipine (CARDIPINE®) ความแรง : 10 mg/10 mL (Pregnancy Cat D)	ชื่อ..... HN..... อายุ.....ปี เตี้ย.....
---	--

ข้อบ่งใช้	ข้อบ่งใช้และขนาดยาที่แนะนำ (FDA use) ☐ Hypertensive Emergency หรือ Stroke Fast track ☐ อื่นๆ โปรดระบุ..... เริ่มต้น: 1 mg/hr (5 mL/hr) IV infusion โดย titrate 1 mg/hr ทุกๆ 5-15 นาที ขนาดยาสูงสุด 15 mg/hr ***เมื่อบรรลุค่าเป้าหมายในการลดความดันโลหิตแล้วให้ลดอัตราการหยดยาลงจนได้ 3 mg/hr
------------------	--

ขนาดยา	Nicardipine (10 mg/10mL) IV infusion ***ใช้ Infusion pump เท่านั้น*** ☐ 20 mg (2 Amp) ใน ☐ NSS หรือ ☐ D5W ปริมาตร 80 ml (Conc.= 0.2 mg/ml หรือ 1:5) Body Weight ที่ใช้ในการคำนวณขนาดยา.....kg	
	เริ่มต้นที่ขนาด.....mg/hr (.....mL/hr) จนถึงขนาด 15 mg/hr (.....mL/hr) Keep MAPmmHg., BP.....mmHg	ลงชื่อแพทย์ผู้สั่ง..... (.....) ลงชื่อพยาบาลผู้รับคำสั่ง..... (.....)

วิธีผสม 1.ใช้ D5W/NSS 100 ml ดูดออก 20 ml ให้เหลือ 80 ml 2.เติม Nicardipine จำนวน 2 vial (20 mL) ลงในขวด D5W/NSS ยาที่ผสมแล้วมีอายุ 24 hr (25 C) 3.ไม่สามารถผสมกับ sodium bicarbonate หรือ lactated ringer's solution 4.หากให้ยาทาง peripheral vein ควรเปลี่ยนตำแหน่งให้ยา ทุก 12 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงของการระคายเคืองหลอดเลือดดำ ***Maximum concentration = 0.2 mg/mL, Maximum rate = 15 mg/hr (หรือ 75 mL/hr)	อาการไม่พึงประสงค์ (Side effect: S/E) ปวดศีรษะ, หน้ามืด/วิงเวียน, ปวดจาลับสน ชิมเศร้า, เหนื่อย/อ่อนเพลีย, ใจสั่น, คลื่นไส้/อาเจียน, หน้าแดง/ร้อนวูบวาบ Antidote Calcium gluconate - ผู้ใหญ่ 3-12 g slow IV push (10% solution [100 mg/mL]) - เด็ก 100 mg (1 mL)/kg slow IV push
--	--

ขนาด (mg/hr)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Infusion rate (mcdrop/min หรือ mL/hr)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75 Max rate

ส่วนการติดตามของพยาบาลในการติดตามการให้ยาผู้ป่วย (ตลอดระยะเวลาที่ให้ยา)															
เวลา															
BP															
HR															
ลงชื่อ															
เวลา															
BP															
HR															
ลงชื่อ															
IV site															
S/E															
***ติดตามผู้ป่วยทุก 5 นาทีจนถึงระดับที่ต้องการจากนั้นทุก 15 นาทีหรือตามแพทย์สั่ง															