

GUIAMAR

Guía de Medicamentos de Alto Riesgo

Hospital Universitario Torrecárdenas
Servicio de Farmacia Hospitalaria (H.U.T)



Versión 1.0 · 2026

Índice

Aviso legal y notas de uso	2
Introducción y objetivos	3
Fichas de medicamentos	5
A	5
B	45
C	61
D	83
E	106
F	135
G	148
H	155
I	158
K	181
L	182
M	193
N	225
O	232
P	239
R	263
S	280
T	295
U	330
V	333
Z	343
Glosario y Siglas	344
Bibliografía	346
Créditos y Agradecimientos	347

Aviso legal y notas de uso

GUIAMAR es una herramienta de apoyo a la práctica clínica dirigida a profesionales sanitarios, elaborada a partir de los medicamentos de alto riesgo utilizados en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

La información contenida en GUIAMAR tiene carácter informativo y orientativo. Su finalidad es facilitar el acceso a información práctica relacionada con la utilización segura de estos medicamentos en el ámbito hospitalario.

GUIAMAR no sustituye en ningún caso la consulta de la ficha técnica oficial del medicamento, el prospecto autorizado, las alertas y comunicaciones emitidas por las autoridades sanitarias, los protocolos y procedimientos vigentes del centro, ni el juicio clínico del profesional responsable.

La información deberá ser interpretada y utilizada por profesionales sanitarios teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada paciente, la situación clínica concreta y las recomendaciones y procedimientos que resulten aplicables en cada momento.

El uso de GUIAMAR no exime de la responsabilidad profesional correspondiente en los procesos de prescripción, validación, preparación, dispensación, administración y seguimiento de los medicamentos.

La información contenida en GUIAMAR puede ser objeto de revisiones, correcciones y actualizaciones periódicas de acuerdo con la evidencia científica disponible, las fichas técnicas autorizadas, las recomendaciones de los organismos competentes y los procedimientos del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Antes de utilizar la información para la toma de decisiones clínicas, se recomienda comprobar la versión y fecha de actualización de GUIAMAR y, cuando proceda, contrastarla con las fuentes oficiales vigentes.

GUIAMAR es un proyecto desarrollado sin ánimo de lucro, fruto de la colaboración y del trabajo de profesionales implicados en la mejora de la seguridad en el uso de medicamentos.

La utilización de GUIAMAR implica la aceptación de estas condiciones de uso.

Introducción y objetivos

Los medicamentos de alto riesgo son aquellos que presentan una mayor probabilidad de causar daños graves a los pacientes en caso de error en su utilización.

GUIAMAR — Guía de Medicamentos de Alto Riesgo — es un proyecto colaborativo sin ánimo de lucro orientado a facilitar el acceso a información práctica sobre los medicamentos de alto riesgo utilizados en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

Su objetivo es proporcionar información de apoyo que contribuya a mejorar la seguridad en los procesos de prescripción, validación, preparación, dispensación y administración de estos medicamentos.

GUIAMAR pretende servir como herramienta de consulta rápida para profesionales sanitarios, facilitando una utilización más segura de los medicamentos y contribuyendo a la prevención de errores de medicación en el ámbito asistencial.

La información contenida en la guía deberá utilizarse de acuerdo con los protocolos y procedimientos vigentes y no sustituye la consulta de las fuentes oficiales ni el juicio clínico del profesional responsable.

Fichas de medicamentos alto riesgo

Uso hospitalario y consideraciones prácticas

ABEMACICLIB

VERZENIOS 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos

Principio activo: ABEMACICLIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EF-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEPENDIENTE DE CICLINA (CDK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis se puede tomar con o sin alimentos. No se debe tomar con pomelo o zumo de pomelo.

Los pacientes deben tomar las dosis aproximadamente a las mismas horas cada día. El comprimido se debe tragar entero (los pacientes no deben masticar, triturar o partir los comprimidos antes de tragarlos).

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VERZENIOS 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos

Principio activo: ABEMACICLIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EF-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEPENDIENTE DE CICLINA (CDK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis se puede tomar con o sin alimentos. No se debe tomar con pomelo o zumo de pomelo.

Los pacientes deben tomar las dosis aproximadamente a las mismas horas cada día.

El comprimido se debe tragar entero (los pacientes no deben masticar, triturar o partir los comprimidos antes de tragarlos).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VERZENIOS 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos

Principio activo: ABEMACICLIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EF-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEPENDIENTE DE CICLINA (CDK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración**OR:** ORAL

La dosis se puede tomar con o sin alimentos. No se debe tomar con pomelo o zumo de pomelo.

Los pacientes deben tomar las dosis aproximadamente a las mismas horas cada día.

El comprimido se debe tragar entero (los pacientes no deben masticar, triturar o partir los comprimidos antes de tragarlos).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ABIRATERONA

ABIRATERONA ACCORD 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos

Principio activo: ABIRATERONA

Datos generales

Grupo terapéutico: L02B-ANTAGONISTAS HORMONALES Y SUSTANCIAS RELACIONADAS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos se deben tomar por lo menos una hora antes o al menos dos horas después de tomar cualquier alimento. Los comprimidos se deben tragar enteros con agua. La toma de los comprimidos con alimentos aumenta la exposición sistémica a Abiraterona por el aumento significativo de su absorción.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Mujeres embarazadas o que puedan estarlo (ver sección 4.6). - Insuficiencia hepática grave [Clase C de Child-Pugh (ver secciones 4.2, 4.4 y 5.2)]. - Acetato de abiraterona con prednisona o prednisolona está contraindicado en combinación con Ra-223.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ACALABRUTINIB

CALQUENCE 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: ACALABRUTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EL-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DE BRUTON (BTK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos deben tragarse enteros con agua, aproximadamente a la misma hora cada día, con o sin alimentos. Los comprimidos no deben masticarse, triturarse, disolverse ni dividirse.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ACENOCUMAROL

SINTROM 1 mg COMPRIMIDOS , 60 comprimidos

Principio activo: ACENOCUMAROL

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AA-ANTITROMBÓTICOS: ANTAGONISTAS DE VITAMINA K

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis diaria ha de tomarse siempre a la misma hora del día. El comprimido debe tragarse entero con un vaso de agua.

Contraindicaciones

•Hipersensibilidad al acenocumarol y derivados cumarínicos o a alguno de los excipientes.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SINTROM 4 mg COMPRIMIDOS , 500 comprimidos

Principio activo: ACENOCUMAROL

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AA-ANTITROMBÓTICOS: ANTAGONISTAS DE VITAMINA K

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis diaria ha de tomarse siempre a la misma hora del día. El comprimido debe tragarse entero con un vaso de agua.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al acenocumarol y derivados cumarínicos o a alguno de los excipientes (Lactosa monohidrato, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio, almidón de maíz, almidón de maíz pregelatinizado).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ADENOSINA

ADENOSINA HIKMA 6 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE EFG, 10 ampollas

Principio activo: ADENOSINA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01EB-OTROS PREPARADOS PARA TERAPIA CARDÍACA, SOLOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La Adenosina debe administrarse por vía intravenosa (IV) rápida en bolo, directamente en vena o bien por un catéter intravenoso. Si se administra a través de un catéter intravenoso, la inyección debe realizarse lo más proximal posible, y seguido de un lavado rápido con suero fisiológico. Si se administra a través de una vena periférica, se debe utilizar una cánula de calibre grande.

Contraindicaciones

Adenosina está contraindicada en pacientes que presentan: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Síndrome de disfunción sinusal o bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado (salvo pacientes con marcapasos en funcionamiento). Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con signos de broncoespasmo (p. ej. asma bronquial). Síndrome del QT largo. Hipotensión grave. Estados descompensados de insuficiencia cardíaca.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ADRENALINA

ADRENALINA B. BRAUN 1 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 1 ml

Principio activo: ADRENALINA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CA-ESTIMULANTES CARDÍACOS: ADRENÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV-SC

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

En ataques agudos de asma, reacciones alérgicas y shock anafiláctico.

IV: INTRAVENOSA

Diluir la dosis prescrita en 10 mL de SF o agua p.i. o SG5% (concentración 1:10.000 cuando se diluye una ampolla de 1 mg/mL con 9 mL adicionales) y administrar lentamente. En caso de parada cardíaca y excepcionalmente en shock anafiláctico.

PF: PERFUSIÓN

Diluir 1 mg en 250 mL de SG5%, para obtener una concentración de 4 mcg/mL y administrar a una velocidad de 1-10 mcg/min. Alternativamente se puede diluir 1 mg en 100 mL de SF y administrar a una velocidad de 5-15 mcg/min. La solución de Adrenalina en SF o SG5% a una concentración de 1 mcg/mL es estable durante 24 h en nevera.

SC: SUBCUTANEA

En ataques agudos de asma y reacciones alérgicas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la epinefrina (adrenalina), a los simpaticomiméticos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Sin embargo, la presencia de sulfitos y la posibilidad de reacciones

alérgicas no impide el uso del medicamento para el tratamiento de reacciones alérgicas severas o en otras situaciones de emergencia. La posibilidad de que el paciente desarrolle reacciones adversas a los sulfitos debe ser considerada en personas asmáticas que muestran un empeoramiento de la función respiratoria tras la administración de la solución (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). La utilización de este medicamento está contraindicada en pacientes con insuficiencia o dilatación cardíaca, insuficiencia coronaria y en la mayoría de los pacientes con arritmias cardíacas, ya que se aumentaría más la necesidad de oxígeno del miocardio. El empleo de adrenalina está generalmente contraindicado en casos de hipertiroidismo y cuando existe hipertensión arterial grave ya que estos pacientes son más susceptibles a los efectos adversos de este medicamento. Debe evitarse el uso en pacientes con feocromocitoma, ya que pueden desarrollar hipertensión severa. También está contraindicada en pacientes con lesiones orgánicas cerebrales, como arteriosclerosis cerebral y en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Debe evitarse la administración de adrenalina de forma conjunta con la anestesia con hidrocarburos halogenados (cloroformo, tricloroetileno) o ciclopropano. Debe utilizarse con extrema precaución con otros anestésicos hidrocarburos halogenados, como el halotano. La combinación con este medicamento puede provocar arritmias graves (ver sección 4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción). La administración de adrenalina está contraindicada durante el parto. Durante el último mes de gestación y en el momento del parto, adrenalina inhibe el tono uterino y las contracciones. Sin embargo, en situaciones de extrema gravedad no existen contraindicaciones absolutas.

Observaciones

También se administra diluida por vía intracardiaca en casos de extrema urgencia por parada y cuando la vía IV sea inaccesible.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ADRENALINA LEVEL 1mg/ml SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRECARGADA, 50 jeringas precargadas de 1 ml

Principio activo: ADRENALINA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CA-ESTIMULANTES CARDÍACOS: ADRENÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV-SC

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

En ataques agudos de asma, reacciones alérgicas y shock anafiláctico.

IV: INTRAVENOSA

Diluir la dosis prescrita en 10 mL de SF o agua p.i. o SG5% (concentración 1:10.000 cuando se diluye una ampolla de 1 mg/mL con 9 mL adicionales) y administrar lentamente. En caso de parada cardíaca y excepcionalmente en shock anafiláctico.

PF: PERFUSIÓN

Diluir 1 mg en 250 mL de SG5%, para obtener una concentración de 4 mcg/mL y administrar a una velocidad de 1-10 mcg/min. Alternativamente se puede diluir 1 mg en 100 mL de SF y administrar a una velocidad de 5-15 mcg/min. La solución de Adrenalina en SF o SG5% a una concentración de 1 mcg/mL es estable durante 24 h en nevera.

SC: SUBCUTANEA

En ataques agudos de asma y reacciones alérgicas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. No debe administrarse Adrenalina Level si el paciente presenta hipersensibilidad a la adrenalina, a los simpaticomiméticos o a cualquier componente de la formulación (ej. Sulfito ácido de sodio). Sin embargo, la presencia de sulfitos y la posibilidad de reacciones alérgicas no impiden el uso del medicamento para el tratamiento de reacciones alérgicas severas o en otras situaciones de emergencia. La posibilidad de que el paciente desarrolle reacciones adversas a los sulfitos debe ser considerada en personas asmáticas que muestran un empeoramiento de la función respiratoria tras la administración de la solución. (Ver apartado 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo). La utilización de este medicamento está contraindicada en pacientes con insuficiencia o dilatación cardíaca, insuficiencia coronaria y en la mayoría de los pacientes con arritmias cardíacas, ya que se aumentaría más la necesidad de oxígeno del miocardio. El empleo de adrenalina está generalmente contraindicado en casos de hipertiroidismo y cuando existe hipertensión arterial grave ya que estos pacientes son más susceptibles a los efectos adversos de este medicamento. Debe evitarse el uso en pacientes con feocromocitoma, ya que pueden desarrollar hipertensión severa. También está contraindicada en pacientes con lesiones orgánicas cerebrales, como arteriosclerosis cerebral y en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Debe evitarse la administración de adrenalina de forma conjunta con la anestesia con hidrocarburos halogenados (cloroformo, tricloroetileno) o ciclopropano. Debe utilizarse con extrema precaución con otros anestésicos hidrocarburos halogenados, como el halotano. La combinación con este medicamento puede provocar arritmias graves (Ver apartado 4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción). La administración de adrenalina está contraindicada durante el parto. Durante el último mes de gestación y en el momento del parto, la adrenalina inhibe el tono uterino y las contracciones. Sin embargo, en situaciones de extrema gravedad no existen contraindicaciones absolutas.

Observaciones

También se administra diluida por vía intracardiaca en casos de extrema urgencia por parada y cuando la vía IV sea inaccesible.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AFATINIB

GIOTRIF 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 28 comprimidos

Principio activo: AFATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EB-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Afatinib se debe tomar sin alimentos. No se deben ingerir alimentos al menos 3 horas antes y 1 hora después de tomar este medicamento.

Los comprimidos se deben tragar enteros con agua. Si los comprimidos no se pueden tragar enteros, se pueden dispersar en 100 ml, aproximadamente, de agua no carbonatada. No se deben utilizar otros líquidos. Se debe echar el comprimido en el agua sin tritularlo y se debe remover el vaso de vez en cuando durante unos 15 minutos hasta que se haya disuelto en partículas muy pequeñas. La dispersión debe consumirse inmediatamente. El vaso se debe enjuagar con unos 100 ml de agua que se deben beber también. La dispersión puede ser administrada también a través de una sonda gástrica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a afatinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GIOTRIF 30 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 28 comprimidos

Principio activo: AFATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EB-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Afatinib se debe tomar sin alimentos. No se deben ingerir alimentos al menos 3 horas antes y 1 hora después de tomar este medicamento.

Los comprimidos se deben tragar enteros con agua. Si los comprimidos no se pueden tragar enteros, se pueden dispersar en 100 ml, aproximadamente, de agua no carbonatada. No se deben utilizar otros líquidos. Se debe echar el comprimido en el agua sin tritularlo y se debe remover el vaso de vez en cuando durante unos 15 minutos hasta que se haya disuelto en partículas muy pequeñas. La dispersión debe consumirse inmediatamente. El vaso se debe enjuagar con unos 100 ml de agua que se deben beber también. La dispersión puede ser administrada también a través de una sonda gástrica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a afatinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GIOTRIF 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 28 comprimidos

Principio activo: AFATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EB-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Afatinib se debe tomar sin alimentos. No se deben ingerir alimentos al menos 3 horas antes y 1 hora después de tomar este medicamento.

Los comprimidos se deben tragar enteros con agua. Si los comprimidos no se pueden tragar enteros, se pueden dispersar en 100 ml, aproximadamente, de agua no carbonatada. No se deben utilizar otros líquidos. Se debe echar el comprimido en el agua sin tritularlo y se debe remover el vaso de vez en cuando durante unos 15 minutos hasta que se haya disuelto en partículas muy pequeñas. La dispersión debe consumirse inmediatamente. El vaso se debe enjuagar con unos 100 ml de agua que se deben beber también. La dispersión puede ser administrada también a través de una sonda gástrica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a afatinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AFLIBERCEPT

ZALTRAP 25 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 8 ml

Principio activo: AFLIBERCEPT

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Debido a la hiperosmolaridad del concentrado (1000 mOsmol/kg), no debe administrarse el concentrado sin diluir como bolo intravenoso.

PA: PARENTERAL

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a aflibercept o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Uso oftálmico / intravítreo, debido a las propiedades hiperosmóticas de ZALTRAP (ver sección 4.4). Respecto a las contraindicaciones de los componentes de FOLFIRI (irinotecan, 5-FU y ácido folínico), consultar las correspondientes fichas técnicas del producto en vigor.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AGUA BIDESTILADA

AGUA PARA INYECCION 500 ML

Principio activo: AGUA BIDESTILADA

Datos generales

Grupo terapéutico: V07AB-DISOLVENTES Y DILUYENTES (INCL. SOLUCIONES PARA IRRIGACIÓN)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Este medicamento es para disolución y/o reconstitución de otras sustancias terapéuticas. La forma de administración vendrá determinada por los volúmenes empleados para la dilución/reconstitución, así como por la vía de administración del medicamento disuelto/reconstituido.

Contraindicaciones

No inyectar Agua para inyección sola. Se deben tener en cuenta las contraindicaciones relacionadas con los medicamentos que se añaden.

Observaciones

El Agua estéril para inyección de envases de gran volumen se utilizan en el Servicio de Farmacia para elaborar preparaciones estériles y en algunas unidades de hospitalización para los respiradores. Es hipotónica (0 mOsm/L), por lo que si se administra directamente por perfusión intravenosa puede causar efectos adversos graves, incluyendo hemólisis.

Las principales medidas de prevención de errores con el Agua estéril para inyección de gran volumen son: - La dispensación debe restringirse a las Áreas específicas donde se precise su utilización. Se establecerá un sistema para verificar que la dispensación se limita a estas Áreas. - El almacenamiento tanto en el Servicio de Farmacia como en las Unidades autorizadas, se realizará en un lugar separado de las soluciones de fluidoterapia y de otras soluciones intravenosas, con el fin de evitar cualquier confusión entre ellas.

<https://www.vademecum.es/francia/medicamento/5779/eau-pour-preparations-injectables-lavoisier-solvent-for-parenteral-use>

AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES FRESENIUS KABI

DISOLVENTE PARA USO PARENTERAL, 1 frasco de 1.000 ml

Principio activo: AGUA BIDESTILADA

Datos generales

Grupo terapéutico: V07AB-DISOLVENTES Y DILUYENTES (INCL. SOLUCIONES PARA IRRIGACIÓN)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Este medicamento es para disolución y/o reconstitución de otras sustancias terapéuticas. La forma de administración vendrá determinada por los volúmenes empleados para la dilución/reconstitución, así como por la vía de administración del medicamento disuelto/reconstituido.

Contraindicaciones

No inyectar Agua para inyección Fresenius Kabi sola. Se deben tener en cuenta las contraindicaciones relacionas con los medicamentos que se añaden.

Observaciones

El Agua estéril para inyección de envases de gran volumen se utilizan en el Servicio de Farmacia para elaborar preparaciones estériles y en algunas unidades de hospitalización para los respiradores. Es hipotónica (0 mOsm/L), por lo que si se administra directamente por perfusión intravenosa puede causar efectos adversos graves, incluyendo hemólisis.

Las principales medidas de prevención de errores con el Agua estéril para inyección de gran volumen son: - La dispensación debe restringirse a las Áreas específicas donde se precise su utilización. Se establecerá un sistema para verificar que la dispensación se limita a estas Áreas. - El almacenamiento tanto en el Servicio de Farmacia como en las Unidades autorizadas, se realizará en un lugar separado de las soluciones de fluidoterapia y de otras soluciones intravenosas, con el fin de evitar cualquier confusión entre ellas.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ALECTINIB

ALECENSA 150 MG CAPSULAS DURAS, 224 cápsulas

Principio activo: ALECTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01ED-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEL LINFOMA ANAPLÁSICO (ALK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas duras se deben tragar enteras, sin abrirlas ni disolverlas. Se deben tomar con alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alectinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ALPELISIB

PIQRAY 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos

Principio activo: ALPELISIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EM-INHIBIDORES DE LA FOSFATIDILINOSITOL-3-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Alpelisib se deben tragar enteros. No se deben masticar, triturar o partir antes de tragar. No se deben tomar los comprimidos que estén rotos, agrietados o que no estén intactos. Se deben tomar inmediatamente después de una comida, aproximadamente a la misma hora cada día.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ALTEPLASA

ACTILYSE POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 1 vial 20 mg + vial de disolvente

Principio activo: ALTEPLASA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AD-ANTITROMBÓTICOS: ENZIMAS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Administrar la dosis prescrita en forma de bolus IV.

PA: PARENTERAL

Diluir con SF hasta una concentración mínima de 0.2 mg/mL. Administrar según prescripción médica. La solución de Alteplasa en SF es estable 24 h en nevera protegido de la luz y 8 h a temperatura ambiente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Contraindicaciones en caso de infarto agudo de miocardio, embolia pulmonar aguda masiva e ictus isquémico agudo:

- Actilyse está contraindicado en casos en los que existe un alto riesgo de hemorragia como p.ej.: trastorno hemorrágico significativo actual o durante los últimos 6 meses
- diátesis hemorrágica conocida
- pacientes que reciben tratamiento efectivo con anticoagulantes orales (p.ej. warfarina sódica con INR > 1,3) (ver sección 4.4)
- hemorragia grave o peligrosa manifiesta o reciente
- sospecha o historia conocida de hemorragia intracraneal
- sospecha de hemorragia subaracnoidea o trastorno después de una hemorragia subaracnoidea por aneurisma
- cualquier historia de lesión del sistema nervioso central (es decir, neoplasia, aneurisma, cirugía intracraneal o espinal)
- masaje cardíaco externo traumático reciente (menos de 10 días), parto obstétrico reciente, punción reciente de un vaso sanguíneo no comprimible (p.ej. punción de la vena yugular o subclavia)
- hipertensión arterial grave no controlada
- endocarditis bacteriana, pericarditis
- pancreatitis aguda

- enfermedad gastrointestinal ulcerativa documentada durante los últimos 3 meses, varices esofágicas, aneurismas arteriales, malformaciones venosas/arteriales
- neoplasia con riesgo de hemorragia aumentado
- enfermedad hepática grave, incluyendo insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal (varices esofágicas) y hepatitis activa
- cirugía mayor o traumatismo importante en los últimos 3 meses
- Contraindicaciones adicionales en el infarto agudo de miocardio: cualquier historia conocida de ictus hemorrágico o ictus de origen desconocido historia conocida de ictus isquémico o ataque isquémico transitorio (AIT) en los 6 meses anteriores, excepto ictus isquémico agudo actual durante las 4,5 horas anteriores.
- Contraindicaciones adicionales en la embolia pulmonar aguda masiva: cualquier historia conocida de ictus hemorrágico o ictus de origen desconocido historia conocida de ictus isquémico o ataque isquémico transitorio (AIT) en los 6 meses anteriores, excepto ictus isquémico agudo actual durante las 4,5 horas anteriores.
- Contraindicaciones adicionales en el ictus isquémico agudo: síntomas de accidente isquémico que empiezan más de 4,5 horas antes del inicio de la perfusión o síntomas para los cuales se desconoce la hora del inicio y ésta puede ser potencialmente superior a las 4,5 horas (ver sección 5.1) déficit neurológico leve o síntomas de rápida mejora antes del inicio de la perfusión ictus grave evaluado clínicamente (p.ej.
- NIHSS>25) y/o por técnicas de imagen apropiadas convulsiones al inicio del ictus evidencia de una hemorragia intracraneal en la TC síntomas que sugieran hemorragia subaracnoidea, incluso con TC normal - administración de heparina dentro de las 48 horas previas y un tiempo de tromboplastina que exceda el límite superior normal - pacientes con cualquier historia previa de ictus y diabetes concomitante ictus previo en los últimos 3 meses recuento plaquetar inferior a 100.000/mm³ presión sanguínea sistólica > 185 mm Hg o presión sanguínea diastólica > 110 mm Hg, o controles agresivos (farmacoterapia intravenosa) necesarios para reducir la presión sanguínea a estos límites niveles de glucosa en sangre 400 mg/dl (22,2 mM).
- Uso en niños y adolescentes Actilyse no está indicado en el tratamiento del ictus isquémico agudo en niños menores de 16 años (para adolescentes de 16 años o mayores, ver sección 4.4).

Observaciones

Reconstituir con el vial de agua p.i. utilizando la cánula de transferencia proporcionada para obtener una concentración de 1 mg/mL. Para obtener una concentración de 2 mg/mL con la mitad del volumen de agua p.i. La solución reconstituida es de incolora a amarilla clara.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ACTILYSE POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 1 vial 50 mg + vial de disolvente

Principio activo: ALTEPLASA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AD-ANTITROMBÓTICOS: ENZIMAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Administrar la dosis prescrita en forma de bolus IV.

PA: PARENTERAL

Diluir con SF hasta una concentración mínima de 0.2 mg/mL. Administrar según prescripción médica. La solución de Alteplasa en SF es estable 24 h en nevera protegido de la luz y 8 h a temperatura ambiente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Contraindicaciones en caso de infarto agudo de miocardio, embolia pulmonar aguda masiva e ictus isquémico agudo:

- Actilyse está contraindicado en casos en los que existe un alto riesgo de hemorragia como p.ej.: trastorno hemorrágico significativo actual o durante los últimos 6 meses - diátesis hemorrágica conocida - pacientes que reciben tratamiento efectivo con anticoagulantes orales (p.ej.
- warfarina sódica con INR > 1,3) (ver sección 4.4) - hemorragia grave o peligrosa manifiesta o reciente - sospecha o historia conocida de hemorragia intracraneal - sospecha de hemorragia subaracnoidea o trastorno después de una hemorragia subaracnoidea por aneurisma - cualquier historia de lesión del sistema nervioso central (es decir, neoplasia, aneurisma, cirugía intracraneal o espinal) - masaje cardíaco externo traumático reciente (menos de 10 días), parto obstétrico reciente, punción reciente de un vaso sanguíneo no comprimible (p.ej.
- punción de la vena yugular o subclavia) - hipertensión arterial grave no controlada - endocarditis bacteriana, pericarditis - pancreatitis aguda - enfermedad gastrointestinal ulcerativa documentada durante los últimos 3 meses, varices esofágicas, aneurismas arteriales, malformaciones venosas/arteriales - neoplasia con riesgo de hemorragia aumentado - enfermedad hepática grave, incluyendo insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal (varices esofágicas) y hepatitis activa - cirugía mayor o traumatismo importante en los últimos 3 meses Contraindicaciones adicionales en el infarto agudo de miocardio: cualquier historia conocida de ictus hemorrágico o ictus de origen desconocido historia conocida de ictus isquémico o ataque isquémico transitorio (AIT) en los 6 meses anteriores, excepto ictus isquémico agudo actual durante las 4,5 horas anteriores.
- Contraindicaciones adicionales en la embolia pulmonar aguda masiva: cualquier historia conocida de ictus hemorrágico o ictus de origen desconocido historia conocida de ictus isquémico o ataque isquémico transitorio (AIT) en los 6 meses anteriores, excepto ictus isquémico agudo actual durante las 4,5 horas anteriores.

- Contraindicaciones adicionales en el ictus isquémico agudo: síntomas de accidente isquémico que empiezan más de 4,5 horas antes del inicio de la perfusión o síntomas para los cuales se desconoce la hora del inicio y ésta puede ser potencialmente superior a las 4,5 horas (ver sección 5.1) déficit neurológico leve o síntomas de rápida mejora antes del inicio de la perfusión ictus grave evaluado clínicamente (p.ej.
- NIHSS>25) y/o por técnicas de imagen apropiadas convulsiones al inicio del ictus evidencia de una hemorragia intracraneal en la TC síntomas que sugieran hemorragia subaracnoidea, incluso con TC normal - administración de heparina dentro de las 48 horas previas y un tiempo de tromboplastina que exceda el límite superior normal - pacientes con cualquier historia previa de ictus y diabetes concomitante ictus previo en los últimos 3 meses recuento plaquetar inferior a 100.000/mm³ presión sanguínea sistólica > 185 mm Hg o presión sanguínea diastólica > 110 mm Hg, o controles agresivos (farmacoterapia intravenosa) necesarios para reducir la presión sanguínea a estos límites niveles de glucosa en sangre 400 mg/dl (22,2 mM).
- Uso en niños y adolescentes Actilyse no está indicado en el tratamiento del ictus isquémico agudo en niños menores de 16 años (para adolescentes de 16 años o mayores, ver sección 4.4).

Observaciones

Reconstituir con el vial de agua p.i. utilizando la cánula de transferencia proporcionada para obtener una concentración de 1 mg/mL. Para obtener una concentración de 2 mg/mL con la mitad del volumen de agua p.i. La solución reconstituida es de incolora a amarilla clara.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AMIODARONA

TRANGOREX 150 mg / 3 ml SOLUCION INYECTABLE , 6 ampollas de 3 ml

Principio activo: AMIODARONA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01BD-ANTIARRÍTMICOS, CLASE III

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria:

300 mg en 94 mL SG5%

Concentración total: 300 mg en 100 mL.

UNIDADES: mL/h

Perfusión Continua Hospitalaria:

900 mg en 482 mL SG5%

Concentración total: 900 mg en 500 mL.

UNIDADES: mL/h

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al yodo, amiodarona o a alguno de los excipientes. Bradicardia sinusal, bloqueo sino-auricular, enfermedad del nódulo sinusal (riesgo de paro sinusal), trastorno de la conducción auriculo-ventricular grave, a menos de que un marcapasos sea implementado. Trastornos de la conducción bi- o trifasciculares, excepto en los pacientes a los que se les haya implantado un marcapasos o pacientes con un marcapasos electrosistólico que se encuentren en la unidad de cuidados intensivos. Colapso circulatorio, hipotensión arterial grave. Disfunción tiroidea. Asociación con fármacos que puedan inducir "torsade de pointes" (ver sección 4.5). Embarazo:

- excepto en circunstancias excepcionales (ver sección 4.6).
- Lactancia (ver sección 4.6).
- La administración IV está contraindicada en caso de hipotensión, insuficiencia respiratoria grave, miocardiopatía o insuficiencia cardíaca (posible empeoramiento).
- Todas las contraindicaciones arriba mencionadas no aplican cuando amiodarona se utiliza para la resucitación cardiopulmonar en el tratamiento de fibrilación ventricular resistente a la desfibrilación.

Observaciones

Conservación de las perfusiones de Amiodarona a temperatura ambiente. Estabilidad: 24 h.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AMIVANTAMAB

RYBREVENT 1600 MG SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 10 ml

Principio activo: AMIVANTAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RYBREVANT 2240 MG SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 14 ml

Principio activo: AMIVANTAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ANAGRELIDA

XAGRID 0,5 MG CAPSULAS DURAS, 100 cápsulas

Principio activo: ANAGRELIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas se deben tragar enteras. No triturar ni diluir el contenido en líquido.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Anagrelida o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con insuficiencia hepática moderada o intensa. Pacientes con insuficiencia renal moderada o intensa (aclaramiento de creatinina <50 ml/min).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ANFOTERICINA B (COMPLEJO LIPÍDICO)

ABELCET COMPLEJO LIPIDICO 5 mg/ml CONCENTRADO PARA DISPERSION PARA PERFUSION , 10 viales de 20 ml

Principio activo: ANFOTERICINA B (COMPLEJO LIPÍDICO)

Datos generales

Grupo terapéutico: J02AA-ANTIMICÓTICOS, USO SISTÉMICO: ANTIBIÓTICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la anfotericina B o a alguno de los excipientes, a menos que en la opinión del médico las ventajas del tratamiento sean mayores que los riesgos de hipersensibilidad.

Observaciones

La Anfotericina tiene dos presentaciones una liposomal y otra complejo lipídico con dosificaciones distintas y NO son intercambiables. La Anfotericina complejo lipídico sólo debe diluirse en S. Glucosado 5% y no en Soluciones salinas ni mezclarse con otros medicamentos o electrolitos.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ANFOTERICINA B (LIPOSOMAS)

AMBISOME LIPOSOMAL 50 MG POLVO PARA DISPERSION PARA PERFUSION , 10 viales

Principio activo: ANFOTERICINA B (LIPOSOMAS)

Datos generales

Grupo terapéutico: J02AA-ANTIMICÓTICOS, USO SISTÉMICO: ANTIBIÓTICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a anfotericina B o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

La Anfotericina tiene dos presentaciones una liposomal y otra complejo lipídico con dosificaciones distintas y NO son intercambiables. La Anfotericina liposomal sólo debe diluirse en S. Glucosado 5% y no en Soluciones salinas ni mezclarse con otros medicamentos o electrolitos.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ANGIOTENSINA II

GIAPREZA 2,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 10 viales de 1 ml

Principio activo: ANGIOTENSINA II

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CX-OTROS ESTIMULANTES CARDÍACOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

La Angiotensina II sólo se debe administrar mediante perfusión intravenosa continua bajo estrecha vigilancia de los parámetros hemodinámicos y orgánicos. Se recomienda administrar a través de una vía venosa central.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ANTITROMBINA III

ANBINEX POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 1.000 UI + 1 jeringa precargada de disolvente

Principio activo: ANTITROMBINA III

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Administrar lentamente por vía intravenosa directa. La velocidad de administración no debe superar 0,08 ml/kg/min.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Observaciones

Preparación de la solución:

- Reconstituir el vial con 10 mL de agua p.i de la jeringa precargada, utilizando el filtro proporcionado que se acopla a la jeringa y el adaptador del vial.
- Agitar el vial mediante giros suaves hasta la total disolución.
- Acoplar el filtro-jeringa al vial y aspirar el contenido del mismo en la jeringa.
- Tras la reconstitución el producto es estable química y físicamente durante 12 horas a 25° C.
- Desde un punto de vista microbiológico, el producto debe utilizarse inmediatamente.
- Si no se utiliza inmediatamente, el tiempo y las condiciones de conservación antes de su uso son responsabilidad del usuario y, normalmente no serán más de 24 horas a 2° C - 8° C a menos que la reconstitución se haya realizado en condiciones asépticas controladas y validadas.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ANBINEX POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 500 UI + 1 jeringa precargada de disolvente

Principio activo: ANTITROMBINA III

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Administrar lentamente por vía intravenosa directa. La velocidad de administración no debe superar 0,08 ml/kg/min.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Observaciones

Preparación de la solución:

- Reconstituir el vial con 10 mL de agua p.i de la jeringa precargada, utilizando el filtro proporcionado que se acopla a la jeringa y el adaptador del vial.
- Agitar el vial mediante giros suaves hasta la total disolución.
- Acoplar el filtro-jeringa al vial y aspirar el contenido del mismo en la jeringa.
- Tras la reconstitución el producto es estable química y físicamente durante 12 horas a 25° C.
- Desde un punto de vista microbiológico, el producto debe utilizarse inmediatamente.
- Si no se utiliza inmediatamente, el tiempo y las condiciones de conservación antes de su uso son responsabilidad del usuario y, normalmente no serán más de 24 horas a 2° C - 8° C a menos que la reconstitución se haya realizado en condiciones asépticas controladas y validadas.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

APALUTAMIDA

ERLEADA 240 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos

Principio activo: APALUTAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L02BB-ANTIANDRÓGENOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos se deben tragar enteros para garantizar que se tome la dosis prevista completa, no se deben machacar ni partir y se pueden tomar con o sin alimentos.

Para los pacientes que no puedan tragar los comprimidos enteros, se puede disolver en agua sin gas y después mezclar con una de las siguientes bebidas sin gas o alimentos blandos: zumo de naranja, té verde, compota de manzana, yogur bebible o más agua, colocando la dosis completa en una taza sin machacar ni partir los comprimidos. Se añaden aproximadamente 20 ml de agua sin gas para que los comprimidos queden totalmente cubiertos de agua, se espera 2 minutos hasta que los comprimidos se rompan y se dispersen y a continuación, remover la mezcla. Posteriormente añadir en 30 ml (6 cucharaditas o 2 cucharadas) de las bebidas sin gas o alimentos blandos anteriores y remover la mezcla. Se traga la mezcla de inmediato enjuagando la taza con agua suficiente para asegurar que se toma la dosis completa y beber de inmediato. No guardar la mezcla de medicamento/alimento para tomar más tarde.

Para la administración a través de sonda nasogástrica de calibre 8F o mayor, colocar la dosis completa en el cilindro de una jeringuilla (utilizar una jeringuilla de 50 ml como mínimo) y extraer 20 ml de agua sin gas con la jeringuilla, se espera 10 minutos y a continuación, agitar vigorosamente para dispersar el contenido por completo. Se administra de inmediato a través de la sonda NG y se rellena la jeringuilla

con agua sin gas y repetir hasta que no queden residuos del comprimido ni en la jeringuilla ni en la sonda.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ERLEADA 60 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 112 comprimidos

Principio activo: APALUTAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L02BB-ANTIANDRÓGENOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos se deben tragar enteros para garantizar que se tome la dosis prevista completa, no se deben machacar ni partir y se pueden tomar con o sin alimentos.

Para los pacientes que no puedan tragar los comprimidos enteros, se puede disolver en agua sin gas y después mezclar con una de las siguientes bebidas sin gas o alimentos blandos: zumo de naranja, té verde, compota de manzana, yogur bebible o más agua, colocando la dosis completa en una taza sin machacar ni partir los comprimidos. Se añaden aproximadamente 20 ml de agua sin gas para que los comprimidos queden totalmente cubiertos de agua, se espera 2 minutos hasta que los comprimidos se rompan y se dispersen y a continuación, remover la mezcla. Posteriormente añadir en 30 ml (6 cucharaditas o 2 cucharadas) de las bebidas sin gas o alimentos blandos anteriores y remover la mezcla. Se traga la mezcla de inmediato enjuagando la taza con agua suficiente para asegurar que se toma la dosis completa y beber de inmediato. No guardar la mezcla de medicamento/alimento para tomar más tarde.

Para la administración a través de sonda nasogástrica de calibre 8F o mayor, colocar la dosis completa en el cilindro de una jeringuilla (utilizar una jeringuilla de 50 ml como mínimo) y extraer 20 ml de agua sin gas con la jeringuilla, se espera 10 minutos y a continuación, agitar vigorosamente para dispersar el contenido por completo. Se administra de inmediato a través de la sonda NG y se rellena la jeringuilla con agua sin gas y repetir hasta que no queden residuos del comprimido ni en la jeringuilla ni en la sonda.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

APIXABAN

ELIQUIS 2,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 comprimidos

Principio activo: APIXABAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AF-INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTO XA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Apixaban debe ingerirse con agua, con o sin alimentos.

Para pacientes que no pueden tragar los comprimidos enteros, se pueden triturar y disolver con agua, o glucosa al 5 % en agua (G5A), o zumo de manzana o mezclarse con puré de manzana y administrarse inmediatamente por vía oral. Como alternativa, los comprimidos de Apixaban se pueden triturar y disolver en 60 ml de agua o G5A y administrarse inmediatamente a través de una sonda nasogástrica. Los comprimidos son estables en agua, G5A, zumo de manzana, y puré de manzana hasta 4 horas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Sangrado activo, clínicamente significativo. Hepatopatía, asociada a coagulopatía y a riesgo de sangrado clínicamente relevante (ver sección 5.2). Lesión o patología si se considera que supone un riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir una úlcera gastrointestinal existente o reciente; presencia de neoplasmas malignos con alto riesgo de sangrado; daño cerebral o espinal reciente; reciente cirugía cerebral, espinal u oftálmica; reciente hemorragia intracraneal; sospecha o conocimiento de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares; o grandes anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales. Tratamiento concomitante con cualquier otro agente anticoagulante como heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de heparinas (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, rivaroxaban, dabigatran etexilato, etc.), excepto en circunstancias específicas de cambio de tratamiento anticoagulante (ver sección 4.2), cuando las heparinas no

fraccionadas se administren a las dosis necesarias para mantener abierto un catéter central venoso o arterial o cuando se administre heparina no fraccionada durante la ablación por catéter en pacientes con fibrilación auricular (ver las secciones 4.4 y 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ELIQUIS 5 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA, 100 comprimidos

Principio activo: APIXABAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AF-INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTO XA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Apixaban debe ingerirse con agua, con o sin alimentos.

Para pacientes que no pueden tragar los comprimidos enteros, se pueden triturar y disolver con agua, o glucosa al 5 % en agua (G5A), o zumo de manzana o mezclarse con puré de manzana y administrarse inmediatamente por vía oral. Como alternativa, los comprimidos de Apixaban se pueden triturar y disolver en 60 ml de agua o G5A y administrarse inmediatamente a través de una sonda nasogástrica. Los comprimidos son estables en agua, G5A, zumo de manzana, y puré de manzana hasta 4 horas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Sangrado activo, clínicamente significativo. Hepatopatía, asociada a coagulopatía y a riesgo de sangrado clínicamente relevante (ver sección 5.2). Lesión o patología si se considera que supone un riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir una úlcera gastrointestinal existente o reciente; presencia de neoplasmas malignos con alto riesgo de sangrado; daño cerebral o espinal reciente; reciente cirugía cerebral, espinal u oftálmica; reciente hemorragia intracraneal; sospecha o conocimiento de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares; o grandes anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales. Tratamiento concomitante con cualquier otro agente anticoagulante como heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de heparinas (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, rivaroxaban, dabigatran etexilato, etc.), excepto en circunstancias específicas de cambio de tratamiento anticoagulante (ver sección 4.2), cuando las heparinas no fraccionadas se administren a las dosis necesarias para mantener abierto un catéter central venoso o

arterial o cuando se administre heparina no fraccionada durante la ablación por catéter en pacientes con fibrilación auricular (ver las secciones 4.4 y 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ARGIPRESINA (VASOPRESINA ARGININA)

EMPRESSIN 20 UI/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 10 ampollas de 2 ml

Principio activo: ARGIPRESINA (VASOPRESINA ARGININA)

Datos generales

Grupo terapéutico: H01BA-VASOPRESINA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: AMPOLLAS IV

Vías de administración

SU: EN SUERO

Preparar una solución para perfusión diluyendo 2 ml del concentrado con 48 ml de solución de cloruro sódico 0,9 % (lo que equivale a 0,8 U.I. de Argipresina por ml). El volumen total tras la dilución debe ser de 50 ml.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ARSENICO TRIOXIDO

TRISENOX 2 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 10 viales de 6 ml

Principio activo: ARSENICO TRIOXIDO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ASCIMINIB

SCEMBLIX 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: ASCIMINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos recubiertos con película se deben tragar enteros con un vaso de agua. No se deben romper ni triturar ni masticar.

Los comprimidos se deben tomar por vía oral sin comida. Se debe evitar el consumo de alimentos durante las 2 horas previas y 1 hora después de la toma de Asciminib.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ASPARAGINASA

ERWINASE 10.000 UI POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 5 viales

Principio activo: ASPARAGINASA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Antecedentes de hipersensibilidad grave al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Función hepática gravemente alterada.

Pancreatitis grave actual o en el pasado asociada al tratamiento con L-asparaginasa. Pancreatitis actual no asociada al tratamiento con L-asparaginasa.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ONCASPAR 750 U/ML POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: ASPARAGINASA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Insuficiencia hepática grave (bilirrubina mayor 3 veces el límite superior de la normalidad [LSN]; transaminasas mayor 10 veces el LSN).

Antecedentes de trombosis grave con un tratamiento anterior con L-asparaginasa. Antecedentes de pancreatitis, incluida pancreatitis relacionada con un tratamiento anterior con L-asparaginasa (ver sección 4.4).

Antecedentes de acontecimientos hemorrágicos graves con un tratamiento anterior con L-asparaginasa (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ATENOLOL

TENORMIN 0,5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 5 ampollas de 10 ml

Principio activo: ATENOLOL

Datos generales

Grupo terapéutico: C07AB-BETA-BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS CARDIOSELECTIVOS, SOLOS.

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Administrar a una velocidad de 1 mg/min.

SU: EN SUERO

Infusión intermitente: Diluir la dosis prescrita en 50-100 mL de S. Fisiológico ó S. G5% y administrar en 20 min.

Contraindicaciones

Tenormin, al igual que otros betabloqueantes, no debe emplearse en pacientes que presenten alguna de las siguientes situaciones: hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 bradicardia shock cardiogénico hipotensión acidosis metabólica trastornos graves de la circulación arterial periférica bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado síndrome del seno enfermo feocromocitoma no tratado insuficiencia cardíaca no controlada.

Observaciones

Tanto la ampolla como la solución reconstituida deben estar protegidas de la luz.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ATEZOLIZUMAB

TECENTRIQ 1200 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: ATEZOLIZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a atezolizumab o a cualquiera de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

La formulación intravenosa de Atezolizumab no se puede utilizar para administración subcutánea, y se debe utilizar únicamente como perfusión intravenosa. Las perfusiones no se deben administrar en perfusión rápida o bolo intravenoso.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TECENTRIQ 1875 MG SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 15 ml

Principio activo: ATEZOLIZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a atezolizumab o a cualquiera de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

La formulación de Atezolizumab SC no se puede utilizar para administración intravenosa y se debe utilizar únicamente como inyección subcutánea.

Es importante revisar las etiquetas del producto para asegurar el uso de la formulación correcta (intravenosa o subcutánea) según lo prescrito antes de ser administrado al paciente.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TECENTRIQ 840 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 14 ml

Principio activo: ATEZOLIZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a atezolizumab o a cualquiera de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

La formulación intravenosa de Atezolizumab no se puede utilizar para administración subcutánea, y se debe utilizar únicamente como perfusión intravenosa. Las perfusiones no se deben administrar en perfusión rápida o bolo intravenoso.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ATRACURIO,BESILATO

TRACRIUM 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN , 5 ampollas de 5 ml

Principio activo: ATRACURIO,BESILATO

Datos generales

Grupo terapéutico: M03AC-OTROS COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

IV DIRECTA: SÍ

PF: PERFUSIÓN

Diluir la dosis prescrita en 50-100 mL de SF ó SG5% para obtener una solución entre 0.5-5 mg/mL. La solución de Atracurio es estable 24 h a temperatura ambiente y debe protegerse de la luz.

Contraindicaciones

Atracurio está contraindicado en pacientes que tengan una hipersensibilidad conocida a atracurio, cisatracurio o ácido bencenosulfónico o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AVAPRITINIB

AYVAKYT 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: AVAPRITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Avapritinib se deben tomar con el estómago vacío al menos 1 hora antes o 2 horas después de una comida y se deben tragar enteros con un vaso de agua.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AVELUMAB

BAVENCIO 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial 10 ml

Principio activo: AVELUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AXITINIB

INLYTA 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 56 comprimidos

Principio activo: AXITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EK-INHIBIDORES DEL RECEPTOR DE LA TIROSINA QUINASA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Axitinib se administran por vía oral dos veces al día, cada 12 horas aproximadamente, con o sin alimentos. Se deben tragar enteros con un vaso de agua.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a Axitinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INLYTA 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 56 comprimidos

Principio activo: AXITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EK-INHIBIDORES DEL RECEPTOR DE LA TIROSINA QUINASA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Axitinib se administran por vía oral dos veces al día, cada 12 horas aproximadamente, con o sin alimentos. Se deben tragar enteros con un vaso de agua.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a Axitinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AZACITIDINE

AZACITIDINA ACCORD 25 MG/ML POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE EFG, 1 vial

Principio activo: AZACITIDINE

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Tumores hepáticos malignos avanzados (ver sección 4.4). Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

AZACITIDINA ACCORD 25 MG/ML POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE EFG, 1 vial con 150 mg

Principio activo: AZACITIDINE

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Tumores hepáticos malignos avanzados (ver sección 4.4). Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BEMIPARINA

HIBOR 10.000 UI ANTI-XA/0,4 ml SOLUCIÓN INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS, 50 jeringas precargadas de 0,4 ml

Principio activo: BEMIPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: JERINGA PRECARGADA

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

sí

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hipersensibilidad a la heparina o sus derivados, incluidas otras heparinas de bajo peso molecular, o sustancias de origen porcino. Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (TIH) (ver sección 4.4). Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Trastorno grave de la función hepática o pancreática. Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos que hayan tenido lugar en los últimos 2 meses. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. Endocarditis bacteriana aguda y endocarditis lenta. Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.:

- úlcera péptica activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales).
- En pacientes que reciban heparina con fines de tratamiento y no de profilaxis, está contraindicada la utilización de anestesia regional en las intervenciones quirúrgicas programadas.

Observaciones

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir "unidades" en lugar de "U".

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HIBOR 12.500 U.I. ANTI XA/0,5 ml SOLUCION INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS, 50 jeringas precargadas de 0,5 ml

Principio activo: BEMIPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: JERINGA PRECARGADA

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

sí

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a la heparina o sus derivados, incluidas otras heparinas de bajo peso molecular, o sustancias de origen porcino. Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (TIH) (ver sección 4.4). Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Trastorno grave de la función hepática o pancreática. Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos que hayan tenido lugar en los últimos 2 meses. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. Endocarditis bacteriana aguda y endocarditis lenta. Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.:

- úlcera péptica activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales).
- En pacientes que reciban heparina con fines de tratamiento y no de profilaxis, está contraindicada la utilización de anestesia regional en las intervenciones quirúrgicas programadas.

Observaciones

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal.

Escribir "unidades" en lugar de "U".

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HIBOR 2.500 UI ANTI-XA/0,2 ml SOLUCIÓN INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS, 50 jeringas precargadas de 0,2 ml

Principio activo: BEMIPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: JERINGA PRECARGADA

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

sí

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a la heparina o sus derivados, incluidas otras heparinas de bajo peso molecular, o sustancias de origen porcino. Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (TIH) (ver sección 4.4). Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Trastorno grave de la función hepática o pancreática. Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos que hayan tenido lugar en los últimos 2 meses. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. Endocarditis bacteriana aguda y endocarditis lenta. Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.: úlcera péptica activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales).

Observaciones

En prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea se inyecta una única dosis en forma de bolus en la línea arterial del circuito de diálisis al comienzo de la sesión de diálisis.

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir "unidades" en lugar de "U".

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HIBOR 3.500 UI ANTI XA/0,2 ml SOLUCIÓN INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS , 50 jeringas precargadas de 0,2 ml

Principio activo: BEMIPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: JERINGA PRECARGADA

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

sí

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a la heparina o sus derivados, incluidas otras heparinas de bajo peso molecular, o sustancias de origen porcino. Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (TIH) (ver sección 4.4). Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Trastorno grave de la función hepática o pancreática. Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos que hayan tenido lugar en los últimos 2 meses. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. Endocarditis bacteriana aguda y endocarditis lenta. Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.: úlcera péptica activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales).

Observaciones

En prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea se inyecta una única dosis en forma de bolus en la línea arterial del circuito de diálisis al comienzo de la sesión de diálisis.

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir "unidades" en lugar de "U".

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HIBOR 5.000 UI ANTI-XA/0,2 ml SOLUCIÓN INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS, 50 jeringas precargadas de 0,2 ml

Principio activo: BEMIPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: JERINGA PRECARGADA

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

sí

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a la heparina o sus derivados, incluidas otras heparinas de bajo peso molecular, o sustancias de origen porcino. Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (TIH) (ver sección 4.4). Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Trastorno grave de la función hepática o pancreática. Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos que hayan tenido lugar en los últimos 2 meses. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. Endocarditis bacteriana aguda y endocarditis lenta. Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.:

- úlcera péptica activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales).
- En pacientes que reciban heparina con fines de tratamiento y no de profilaxis, está contraindicada la utilización de anestesia regional en las intervenciones quirúrgicas programadas.

Observaciones

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal.

Escribir “unidades” en lugar de “U”.

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HIBOR 7.500 UI ANTI XA/0,3 ml SOLUCIÓN INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS, 50 jeringas precargadas de 0,3 ml

Principio activo: BEMIPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: JERINGA PRECARGADA

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

sí

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a la heparina o sus derivados, incluidas otras heparinas de bajo peso molecular, o sustancias de origen porcino. Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (TIH) (ver sección 4.4). Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Trastorno grave de la función hepática o pancreática. Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos que hayan tenido lugar en los últimos 2 meses. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. Endocarditis bacteriana aguda y endocarditis lenta. Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.:

- úlcera péptica activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales).
- En pacientes que reciban heparina con fines de tratamiento y no de profilaxis, está contraindicada la utilización de anestesia regional en las intervenciones quirúrgicas programadas.

Observaciones

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal.

Escribir “unidades” en lugar de “U”.

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BENDAMUSTIN

BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 MG/ML POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 5 viales de 25 mg

Principio activo: BENDAMUSTIN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AD-AGENTES ALQUILANTES: NITROSOUREAS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Durante el periodo de lactancia. Insuficiencia hepática grave (bilirrubina sérica > 3,0 mg/dl). Ictericia. Supresión medular grave y alteraciones graves del hemograma (reducción de la cifra de leucocitos < 3.000/ μ l o de la de plaquetas < 75.000/ μ l). Cirugía mayor en los 30 días anteriores del inicio del tratamiento. Infecciones, sobre todo si se acompañan de leucocitopenia. Vacunación frente a fiebre amarilla.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BENDAMUSTINA GLENMARK 2,5 MG/ML POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 5 viales de 100 mg

Principio activo: BENDAMUSTIN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AD-AGENTES ALQUILANTES: NITROSOUREAS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Durante el periodo de lactancia. Insuficiencia hepática grave (bilirrubina sérica > 3,0 mg/dl). Ictericia. Supresión medular grave y alteraciones graves del hemograma (reducción de la cifra de leucocitos < 3.000/ μ l o de la de plaquetas < 75.000/ μ l). Cirugía mayor en los 30 días anteriores del inicio del tratamiento. Infecciones, sobre todo si se acompañan de leucocitopenia. Vacunación frente a fiebre amarilla.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BEVACIZUMAB

ABEVMY 25 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 16 ml

Principio activo: BEVACIZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FG-INHIBIDORES DEL VEGF/VEGFR

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hipersensibilidad a productos derivados de células de ovario de hámster chino (CHO) o a otros anticuerpos recombinantes humanos o humanizados. Embarazo (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BEXAROTENO

BEXAROTENO CIPLA 75 MG CAPSULAS BLANDAS EFG, 100 cápsulas

Principio activo: BEXAROTENO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XF-RETINOIDES PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Bexaroteno se deben tomar en dosis única oral diaria con una comida. La cápsula no se debe masticar.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Embarazo o lactancia. - Mujeres en edad fértil que no toman medidas anticonceptivas eficaces. - Historial de pancreatitis. - Hipercolesterolemia incontrolada. - Hipertrigliceridemia incontrolada. - Hipervitaminosis A. - Enfermedad tiroidea no controlada. - Insuficiencia hepática. - Infección sistémica activa.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BINIMETINIB

MEKTOVI 15 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 84 comprimidos

Principio activo: BINIMETINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EE-INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA ACTIVADA POR MITÓGENOS (MEK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Binimetinib deben tragarse enteros con agua. Pueden tomarse con o sin alimentos.

Para pacientes con dificultad para tragar, los comprimidos de Binimetinib se pueden dispersar en un vaso pequeño (aproximadamente 10 ml) de agua, zumo de naranja o zumo de manzana y tomarse inmediatamente. El vaso se debe enjuagar con aproximadamente 10 ml de agua, zumo de naranja o zumo de manzana y beberse el contenido inmediatamente.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MEKTOVI 45 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos

Principio activo: BINIMETINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EE-INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA ACTIVADA POR MITÓGENOS (MEK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Binimetinib deben tragarse enteros con agua. Pueden tomarse con o sin alimentos. Para pacientes con dificultad para tragar, los comprimidos se pueden dispersar en un vaso pequeño (aproximadamente 10 ml) de agua, zumo de naranja o zumo de manzana y tomarse inmediatamente. El vaso se debe enjuagar con aproximadamente 10 ml de agua, zumo de naranja o zumo de manzana y beberse el contenido inmediatamente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BLEOMICINA

BLEOMICINA VIATRIS 15.000 UI (PH EUR) = 15 U (USP) POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial

Principio activo: BLEOMICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DC-OTROS ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración

II: IM e IV

Bleomicina puede ser administrada por vía intravenosa, intramuscular, intrapleural, intraperitoneal o intraarterial. De forma ocasional puede indicarse la inyección local directa en el tumor.

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Bleomicina está contraindicada en pacientes: Con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Con infección pulmonar aguda o función pulmonar gravemente reducida Con toxicidad pulmonar relacionada con bleomicina o función pulmonar reducida que puede ser indicativo de toxicidad pulmonar relacionada con bleomicina Con ataxia telangiectasia Que están en periodo de lactancia (ver sección 4.6)

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BLINATUMOMAB

Blincyto 38,5mcg de polvo para concentrado y solución para solución para perfusión 1 vial

Principio activo: BLINATUMOMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BORTEZOMIB

VELCADE 3,5 mg, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial

Principio activo: BORTEZOMIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XG-INHIBIDORES DEL PROTEOSOMA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV-SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, al boro o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa aguda y enfermedad pericárdica. Cuando VELCADE se administre en combinación con otros medicamentos, consultar la Ficha Técnica o Resumen de las Características de Producto de dichos medicamentos para contraindicaciones adicionales.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BOSUTINIB**BOSULIF 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos**

Principio activo: BOSUTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

El Bosutinib se debe tomar por vía oral una vez al día junto con alimentos. Los comprimidos recubiertos con película se deben tragar enteros, no cortar, triturar, romper ni masticar.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Insuficiencia hepática.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BOSULIF 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos

Principio activo: BOSUTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

El Bosutinib se debe tomar por vía oral una vez al día junto con alimentos. Los comprimidos recubiertos con película se deben tragar enteros, no cortar, triturar, romper ni masticar.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Insuficiencia hepática.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BRENTUXIMAB

ADCETRIS 50 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: BRENTUXIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. El uso combinado de bleomicina y ADCETRIS causa toxicidad pulmonar (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BUPRENORFINA**FELIBEN 35 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS. , 5 parches**

Principio activo: BUPRENORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AE-OPIOIDES: DERIVADOS DE ORIPAVINA

Forma farmacéutica: PARCHES

Vías de administración**TD: TRANSDERMICA**

Un parche transdérmico contiene 20 mg de Buprenorfina.

Velocidad nominal de liberación: 35 microgramos de Buprenorfina por hora (durante un periodo de 72 horas).

Contraindicaciones

Feliben está contraindicado en: Hipersensibilidad al principio activo buprenorfina, soja o cacahuete o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes opioide-dependientes y en el tratamiento de abstinencia de narcóticos. Situaciones en las que la función y el centro respiratorio están gravemente dañadas o puedan estarlo. Pacientes que están recibiendo inhibidores de la MAO o que los hayan tomado en las dos últimas semanas (ver apartado 4.5). Pacientes que padezcan miastenia grave. Pacientes que padezcan delirium tremens Embarazo (ver sección 4.6)

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FELIBEN 52,5 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS. , 5 parches

Principio activo: BUPRENORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AE-OPIOIDES: DERIVADOS DE ORIPAVINA

Forma farmacéutica: PARCHES

Vías de administración

TD: TRANSDERMICA

Un parche transdérmico contiene 30 mg Buprenorfina.

Velocidad nominal de liberación: 52.5 microgramos de Buprenorfina por hora (durante un periodo de 72 horas).

Contraindicaciones

Feliben está contraindicado en: Hipersensibilidad al principio activo buprenorfina, soja o cacahuete o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes opioide-dependientes y en el tratamiento de abstinencia de narcóticos. Situaciones en las que la función y el centro respiratorio están gravemente dañadas o puedan estarlo. Pacientes que están recibiendo inhibidores de la MAO o que los hayan tomado en las dos últimas semanas (ver apartado 4.5). Pacientes que padezcan miastenia grave. Pacientes que padezcan delirium tremens Embarazo (ver sección 4.6)

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CABAZITAXEL

CABAZITAXEL AUROVIT 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 3 ml

Principio activo: CABAZITAXEL

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CD-TAXANOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a cabazitaxel, a otros taxanos, a polisorbato 80 o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Recuento de neutrófilos menor de 1.500/mm³. - Insuficiencia hepática grave (bilirrubina total >3 × LNS). - Vacunación concomitante con la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CABOZANTINIB

CABOMETYX 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos

Principio activo: CABOZANTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Cabozantinib es para administración por vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros y sin triturar. Se deben dar instrucciones a los pacientes para que no ingieran ningún alimento durante al menos 2 horas antes de tomar Cabozantinib y una hora después de hacerlo.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CABOMETYX 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: CABOZANTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Cabozantinib es para administración por vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros y sin triturar. Se deben dar instrucciones a los pacientes para que no ingieran ningún alimento durante al menos 2 horas antes de tomar Cabozantinib y una hora después de hacerlo.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CABOMETYX 60 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: CABOZANTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Cabozantinib es para administración por vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros y sin triturar. Se deben dar instrucciones a los pacientes para que no ingieran ningún alimento durante al menos 2 horas antes de tomar Cabozantinib y una hora después de hacerlo.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CANGRELOR

KENGREXAL 50 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 10 viales

Principio activo: CANGRELOR

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AC-ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (EXCL. HEPARINA)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Se administra por vía intravenosa, únicamente tras la reconstitución y la dilución. El volumen del bolo se debe administrar de forma rápida (<1 minuto), desde la bolsa de dilución por medio de una inyección rápida intravenosa manual o una bomba. Se debe asegurar de que se administra todo el bolo antes de empezar la ICP. Comenzar la perfusión inmediatamente tras la administración del bolo.

Contraindicaciones

Sangrado activo o aumento del riesgo de sangrado, debido a la alteración de la hemostasia y/o a trastornos de la coagulación irreversibles o debido a una cirugía o a un traumatismo mayor reciente o a una hipertensión grave no controlada. Antecedentes de ictus o de ataque isquémico transitorio (AIT). Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CAPECITABINA

XELCIP 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos

Principio activo: CAPECITABINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Capecitabina se deben ingerir enteros con agua dentro de los 30 minutos siguientes a una comida. No se deben triturar ni dividir.

Contraindicaciones

- Antecedentes de reacciones adversas intensas e inesperadas al tratamiento con una fluoropirimidina - Hipersensibilidad a la capecitabina o a cualquiera de los excipientes incluidos en la sección 6.1 o a fluorouracilo - Deficiencia completa conocida de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) - Durante el embarazo y la lactancia - Pacientes con leucocitopenia, neutrocitopenia o trombocitopenia intensas - Pacientes con deterioro hepático grave - Pacientes con alteración renal grave (aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml/min) - Tratamiento reciente o concomitante con brivudina (ver sección 4.4 y 4.5 para interacción medicamentosa) Si existe alguna contraindicación con cualquiera de los medicamentos incluidos en la pauta en combinación, no debe utilizarse ese medicamento.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

XELCIP 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 120 comprimidos

Principio activo: CAPECITABINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Capecitabina se deben ingerir enteros con agua dentro de los 30 minutos siguientes a una comida. No se deben triturar ni dividir.

Contraindicaciones

- Antecedentes de reacciones adversas intensas e inesperadas al tratamiento con una fluoropirimidina - Hipersensibilidad a la capecitabina o a cualquiera de los excipientes incluidos en la sección 6.1 o a fluorouracilo - Deficiencia completa conocida de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) - Durante el embarazo y la lactancia Pacientes con leucocitopenia, neutrocitopenia o trombocitopenia intensas - Pacientes con deterioro hepático grave - Pacientes con alteración renal grave (aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml/min) - Tratamiento reciente o concomitante con brivudina (ver sección 4.4 y 4.5 para interacción medicamentosa) Si existe alguna contraindicación con cualquiera de los medicamentos incluidos en la pauta en combinación, no debe utilizarse ese medicamento.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CARBOPLATINO

CARBOPLATINO ACCORD 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 45 ml

Principio activo: CARBOPLATINO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XA-OTROS CITOSTÁTICOS: DERIVADOS DE PLATINO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

El carboplatino está contraindicado en: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con mielosupresión grave. Pacientes con insuficiencia renal grave preexistente (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min), a menos que a juicio del médico y del paciente, los posibles beneficios del tratamiento superen los riesgos. Pacientes con tumores sangrantes Uso concomitante de la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.5) Pacientes con antecedentes de reacción alérgica severa a otros compuestos que contienen platino. El ajuste de la dosis permite el uso en presencia de insuficiencia renal leve. (ver sección 4.2).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CARBOPLATINO ACCORD 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 60 ml

Principio activo: CARBOPLATINO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XA-OTROS CITOSTÁTICOS: DERIVADOS DE PLATINO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

El carboplatino está contraindicado en: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con mielosupresión grave. Pacientes con insuficiencia renal grave preexistente (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min), a menos que a juicio del médico y del paciente, los posibles beneficios del tratamiento superen los riesgos. Pacientes con tumores sangrantes Uso concomitante de la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.5) Pacientes con antecedentes de reacción alérgica severa a otros compuestos que contienen platino. El ajuste de la dosis permite el uso en presencia de insuficiencia renal leve. (ver sección 4.2).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CARBOPLATINO TEVA 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 1 vial de 15 ml

Principio activo: CARBOPLATINO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XA-OTROS CITOSTÁTICOS: DERIVADOS DE PLATINO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración**IV: INTRAVENOSA**

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a otros compuestos que contengan platino o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Insuficiencia renal grave preexistente (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min), a menos que a juicio del médico y del paciente, los posibles beneficios del tratamiento superen los riesgos. Mielosupresión grave Tumores sangrantes Uso concomitante con la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.5). Durante la lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CARFILZOMIB

KYPROLIS 30 MG POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: CARFILZOMIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XG-INHIBIDORES DEL PROTEOSOMA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Mujeres en periodo de lactancia (ver sección 4.6). Kyprolis se administra en combinación con otros medicamentos, por lo tanto, consultar sus fichas técnicas para contraindicaciones adicionales.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

KYPROLIS 60 MG POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION 1 vial

Principio activo: CARFILZOMIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XG-INHIBIDORES DEL PROTEOSOMA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Mujeres en periodo de lactancia (ver sección 4.6). Kyprolis se administra en combinación con otros medicamentos, por lo tanto, consultar sus fichas técnicas para contraindicaciones adicionales.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CARMUSTINA

CARMUSTINA GLENMARK 100 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION EFG, 1 vial polvo + 1 vial disolvente

Principio activo: CARMUSTINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AD-AGENTES ALQUILANTES: NITROSOUREAS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a otras nitrosoureas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Mielodepresión grave. Insuficiencia renal grave (terminal). Niños y adolescentes. Lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CEMIPLIMAB

LIBTAYO 350 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: CEMIPLIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CETUXIMAB

ERBITUX 5 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 20 ml

Principio activo: CETUXIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FE-INHIBIDORES DEL EGFR (RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Erbitux está contraindicado en pacientes con reacciones de hipersensibilidad graves (grado 3 o 4) conocidas a cetuximab. La combinación de Erbitux y quimioterapia basada en oxaliplatino está contraindicada en pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con gen RAS mutado o en los pacientes con CCRm en los que el estado mutacional del gen RAS se desconozca (ver también sección 4.4). Antes de iniciar un tratamiento combinado deben tenerse en cuenta las contraindicaciones de los agentes quimioterápicos concomitantemente utilizados o la radioterapia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CICLOFOSFAMIDA

GENOXAL 1000 mg POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN , 1 vial

Principio activo: CICLOFOSFAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AA-AGENTES ALQUILANTES: MOSTAZAS NITROGENADAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Genoxal no debe utilizarse en pacientes con las contraindicaciones conocidas siguientes: Hipersensibilidad al principio activo, a cualquiera de sus metabolitos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con infecciones activas. Pacientes con disfunción grave de la médula ósea (en particular, pacientes pretratados con medicamentos citotóxicos o radioterapia) (Ver las secciones 4.2 y 4.4). Pacientes con inflamación de la vejiga (cistitis) y obstrucciones urinarias. Toxicidad urotelial aguda por la quimioterapia citotóxica o radioterapia. Embarazo y lactancia (ver sección 4.6) Genoxal no debe ser utilizado en el tratamiento de las enfermedades no malignas, con excepción de la inmunosupresión en situaciones que amenazan la vida.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GENOXAL 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 20 comprimidos

Principio activo: CICLOFOSFAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AA-AGENTES ALQUILANTES: MOSTAZAS NITROGENADAS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos recubiertos de Ciclofosfamida deben administrarse por vía oral por la mañana. Deben tragarse enteros, durante la administración o inmediatamente después de ésta, se debe beber una cantidad suficiente de líquido.

Contraindicaciones

Genoxal no debe utilizarse en pacientes con las contraindicaciones conocidas siguientes:
Hipersensibilidad al principio activo, a cualquiera de sus metabolitos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con infecciones activas. Pacientes con disfunción grave de la médula ósea (en particular, pacientes pretratados con medicamentos citotóxicos o radioterapia) (Ver las secciones 4.2 y 4.4). Pacientes con inflamación de la vejiga (cistitis) y obstrucciones urinarias. Toxicidad urotelial aguda por la quimioterapia citotóxica o radioterapia. Embarazo y lactancia (ver sección 4.6). Genoxal no debe ser utilizado en el tratamiento de las enfermedades no malignas, con excepción de la inmunosupresión en situaciones que amenazan la vida.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CISATRACURIO

CISATRACURIO NORMON 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG , 5 viales de 5 ml

Principio activo: CISATRACURIO

Datos generales

Grupo terapéutico: M03AC-OTROS COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria:

150 mg en 70 mL S.F 0.9% o SG5%

Concentración total: 150 mg en 100 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min

Rango: 1-5

Contraindicaciones

Cisatracurio NORMON está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cisatracurio, atracurio o ácido bencenosulfónico.

Observaciones

Conservación: 2-8 °C. Estabilidad: 24 h. Las soluciones pueden ser incoloras o de color amarillo claro a amarillento/verdoso. Se recomienda no utilizar Ringer Lactato ya que se degrada más rápidamente. No mezclar con soluciones alcalinas.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CISATRACURIO NORMON 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 30 ml

Principio activo: CISATRACURIO

Datos generales

Grupo terapéutico: M03AC-OTROS COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria:

150 mg en 70 mL SF o SG5%

Concentración total: 150 mg en 100 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 1-5

Contraindicaciones

Cisatracurio NORMON está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cisatracurio, atracurio o ácido bencenosulfónico.

Observaciones

Conservación: 2-8 °C. Estabilidad: 24 h. Las soluciones pueden ser incoloras o de color amarillo claro a amarillento/verdoso. Se recomienda no utilizar Ringer Lactato ya que se degrada más rápidamente. No mezclar con soluciones alcalinas.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CISPLATINO

CISPLATINO ACCORD 1 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 100 ml

Principio activo: CISPLATINO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XA-OTROS CITOSTÁTICOS: DERIVADOS DE PLATINO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cisplatino o a alguno de los excipientes listados en la sección 6.1. o a otros componentes que contengan platino. El cisplatino induce nefrotoxicidad que es acumulativa. Por lo tanto, está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal preexistente. Cisplatin también ha mostrado ser acumulativo para la neurotoxicidad (particularmente ototóxico) y no debe administrarse a

pacientes con insuficiencia auditiva preexistente. Cisplatino también está contraindicado en pacientes con mielosupresión y en aquellos que están deshidratados. Las pacientes que reciben cisplatino no deben dar el pecho (ver sección 4.6). La administración concomitante de la vacuna de la fiebre amarilla está contraindicada.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CISPLATINO FARMACIA 1 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 50 ml

Principio activo: CISPLATINO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XA-OTROS CITOSTÁTICOS: DERIVADOS DE PLATINO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Cisplatino está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo u otros compuestos que contengan platino o a cualquiera de los excipientes listados en la sección 6.1; con disfunción renal (depuración de creatinina < 60 ml/min) – cisplatino es nefrotóxico; con deshidratación (es necesaria una pre- y post-hidratación para prevenir una disfunción renal grave); con mielosupresión; con deterioro auditivo– cisplatino es neurotóxico (en particular ototóxico); con neuropatía causada por cisplatino; en combinación con la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.5); Pacientes en tratamiento con cisplatino no deben dar la lactancia (Ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CITARABINA

CITARABINA ACCORD 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 1 vial de 10 ml

Principio activo: CITARABINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la citarabina o a alguno de los excipientes. No debe considerarse la posibilidad de administrar tratamiento con citarabina en pacientes con mielosupresión inducida por el fármaco preexistente, a menos que el médico estime que este tratamiento ofrece la alternativa más prometedora al paciente. La citarabina no debe utilizarse en el tratamiento de enfermedades benignas, excepto para la inmunosupresión.

Observaciones

Citarabina no debe administrarse por vía intratecal.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CITARABINA ACCORD 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 1 vial de 20 ml

Principio activo: CITARABINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la citarabina o a alguno de los excipientes. No debe considerarse la posibilidad de administrar tratamiento con citarabina en pacientes con mielosupresión inducida por el fármaco preexistente, a menos que el médico estime que este tratamiento ofrece la alternativa más prometedora al paciente. La citarabina no debe utilizarse en el tratamiento de enfermedades benignas, excepto para la inmunosupresión.

Observaciones

Citarabina no debe administrarse por vía intratecal.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CITARABINA PFIZER 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 1 vial de 5 ml

Principio activo: CITARABINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la citarabina o a alguno de los excipientes. No debe considerarse la posibilidad de administrar tratamiento con citarabina en pacientes con mielosupresión inducida por el fármaco

preexistente, a menos que el médico estime que este tratamiento ofrece la alternativa más prometedora al paciente. La citarabina no debe utilizarse en el tratamiento de enfermedades benignas, excepto para la inmunosupresión.

Observaciones

Citarabina Pfizer puede administrarse por vía intravenosa como inyección rápida (en bolo) o en perfusión, por vía subcutánea y por vía intratecal.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CITARABINA PFIZER 500 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN , 25 viales + 25 ampollas de disolvente

Principio activo: CITARABINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la citarabina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. No debe considerarse el tratamiento con citarabina en pacientes con mielosupresión inducida por el fármaco preexistente, a menos que el médico estime que este tratamiento ofrece la alternativa más prometedora al paciente.

Observaciones

Citarabina Pfizer puede administrarse por vía intravenosa como inyección rápida (en bolo) o en perfusión, por vía subcutánea y por vía intratecal.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CLADRIBINA

LEUSTATIN 1 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION , 7 viales de 10 ml

Principio activo: CLADRIBINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BB-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PURINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Embarazo y lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LITAK 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, 5 viales de 5 ml

Principio activo: CLADRIBINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BB-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PURINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Cladribina SC se suministra como una solución inyectable lista para usar. La dosis recomendada se extrae directamente mediante una jeringa y se inyecta como una inyección en bolo, por vía subcutánea, sin diluir. Antes de su administración, debe inspeccionarse visualmente para detectar la presencia de partículas y decoloración y debe calentarse a temperatura ambiente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia. Pacientes menores de 18 años. Insuficiencia renal de moderada a grave (depuración de creatinina ≤ 50 ml/min) o con insuficiencia hepática de moderada a grave (clasificación de Child ≥ 6) (ver también sección 4.4). Uso concomitante de otros medicamentos mielosupresores.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CLORAMBUCILO

CLORAMBUCILO ASPEN 2 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 50 comprimidos

Principio activo: CLORAMBUCILO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AA-AGENTES ALQUILANTES: MOSTAZAS NITROGENADAS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

El Clorambucilo se toma por vía oral. Se ha demostrado que el pH gástrico alto disminuye significativamente la biodisponibilidad, por lo tanto se recomienda su ingestión con el estómago vacío (al menos una hora antes o tres horas después de las comidas).

Contraindicaciones

- Uso en el tratamiento de pacientes con enfermedades no malignas. - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). Conservar en el envase original.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

COBIMETINIB

COTELLIC 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 63 comprimidos (3 x 21 comprimidos)

Principio activo: COBIMETINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EE-INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA ACTIVADA POR MITÓGENOS (MEK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

El Cobimetinib es para uso por vía oral. Los comprimidos se deben ingerir enteros con agua. Se pueden tomar con o sin alimentos.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CRIZOTINIB

XALKORI 200 MG CAPSULAS DURAS, 60 cápsulas

Principio activo: CRIZOTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01ED-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEL LINFOMA ANAPLÁSICO (ALK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

El Crizotinib puede tomarse después de una comida o en ayunas. Debe evitarse el pomelo y el zumo de pomelo porque pueden aumentar la concentración plasmática de Crizotinib. También debe evitarse

la hierba de San Juan porque puede disminuir su concentración plasmática. Si se olvida una dosis, se debe tomar tan pronto como el paciente o el cuidador lo recuerden, a menos que falten menos de 6 horas para la próxima dosis prevista, en cuyo caso, el paciente no debe tomar la dosis olvidada. Los pacientes no deben tomar 2 dosis al mismo tiempo para compensar la dosis olvidada. Las cápsulas duras de Crizotinib deben tragarse enteras, preferiblemente con agua, sin aplastarlas, disolverlas ni abrirlas.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a Crizotinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

XALKORI 250 MG CAPSULAS DURAS, 60 cápsulas

Principio activo: CRIZOTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01ED-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEL LINFOMA ANAPLÁSICO (ALK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas duras de Crizotinib deben tragarse enteras, preferiblemente con agua, sin aplastarlas, disolverlas ni abrirlas. Puede tomarse después de una comida o en ayunas. Debe evitarse el pomelo y el zumo de pomelo porque pueden aumentar su concentración plasmática. También debe evitarse la hierba de San Juan porque puede disminuir su concentración plasmática. Si se olvida una dosis, se debe tomar tan pronto como el paciente o el cuidador lo recuerden, a menos que falten menos de 6 horas para la próxima dosis prevista, en cuyo caso, el paciente no debe tomar la dosis olvidada. Los pacientes no deben tomar 2 dosis al mismo tiempo para compensar la dosis olvidada.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a crizotinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DABIGATRAN

DABIGATRAN ETEXILATO CINFA 110 MG CAPSULAS DURAS EFG, 60 cápsulas

Principio activo: DABIGATRAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AE-INHIBIDORES DIRECTOS DE LA TROMBINA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas se pueden tomar con o sin alimentos. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, para facilitar la liberación en el estómago. Debe indicarse a los pacientes que no abran la cápsula debido a que el riesgo de hemorragia puede aumentar.

Para pacientes pediátricos menores de 8 años o pacientes de edad avanzada que tengan dificultades para tragar o que no sepan tragar, existen en el mercado otras formulaciones para el tratamiento adecuadas a la edad.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1
Insuficiencia renal grave ($\text{ACr} < 30 \text{ ml/min}$) en pacientes adultos. $\text{TFGe} < 50 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ en pacientes pediátricos. Hemorragia activa clínicamente significativa. Lesiones o enfermedades, si se consideran un factor de riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, traumatismo cerebral o espinal reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores. Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, p. ej., heparina no fraccionada (HNF), heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, rivaroxabán, apixabán, etc.) excepto bajo circunstancias específicas. Estas son el cambio de tratamiento anticoagulante (ver sección 4.2) cuando se administra HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central abierto o cuando se administra HNF durante la ablación con catéter para fibrilación auricular (ver sección 4.5). Insuficiencia o enfermedad hepática que pueda afectar a la supervivencia. Tratamiento concomitante con los siguientes inhibidores potentes de la gp-P:

- ketoconazol por vía sistémica, ciclosporina, itraconazol, dronedarona y la asociación en dosis fijas glecaprevir/pibrentasvir (ver sección 4.5).
- Prótesis valvulares cardíacas que requieran tratamiento anticoagulante (ver sección 5.1).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PRADAXA 150 mg CAPSULAS DURAS, 60 cápsulas

Principio activo: DABIGATRAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AE-INHIBIDORES DIRECTOS DE LA TROMBINA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas se pueden tomar con o sin alimentos. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, para facilitar la liberación en el estómago. Debe indicarse a los pacientes que no abran la cápsula debido a que el riesgo de hemorragia puede aumentar.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1
Insuficiencia renal grave ($ACr < 30$ ml/min) en pacientes adultos. $TFGe < 50$ ml/min/1,73 m² en pacientes pediátricos. Hemorragia activa clínicamente significativa. Lesiones o enfermedades, si se consideran un factor de riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, traumatismo cerebral o espinal reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores. Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, p. ej., heparina no fraccionada (HNF), heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, rivaroxabán, apixabán, etc.) excepto bajo circunstancias específicas. Estas son el cambio de tratamiento anticoagulante (ver sección 4.2) cuando se administra HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central abierto o cuando se administra HNF durante la ablación con catéter para fibrilación auricular (ver sección 4.5). Insuficiencia o enfermedad hepática que pueda afectar a la supervivencia. Tratamiento concomitante con los siguientes inhibidores potentes de la gp-P:

- ketoconazol por vía sistémica, ciclosporina, itraconazol, dronedarona y la asociación en dosis fijas glecaprevir/pibrentasvir (ver sección 4.5).
- Prótesis valvulares cardíacas que requieran tratamiento anticoagulante (ver sección 5.1).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DABRAFENIB

TAFINLAR 50 mg capsulas duras, 28 CAPSULAS

Principio activo: DABRAFENIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EC-INHIBIDORES DE LA SERINA-TREONINA QUINASA BRAF

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

El Dabrafenib se administra por vía oral. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua. No se deben masticar o abrir y no se deben mezclar con alimentos o líquidos, debido a la inestabilidad química de Dabrafenib. Se recomienda que la dosis de Dabrafenib se tome a la misma hora cada día, dejando un intervalo de aproximadamente 12 horas entre dosis. Dabrafenib se debe tomar al menos una hora antes o 2 horas después de las comidas. Si el paciente vomita después de tomar Dabrafenib, no debe volver a tomar la dosis, y debe esperar a la siguiente toma.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TAFINLAR 75 mg capsulas duras, 28 cápsulas

Principio activo: DABRAFENIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EC-INHIBIDORES DE LA SERINA-TREONINA QUINASA BRAF

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

El Dabrafenib se administra por vía oral. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua. No se deben masticar o abrir y no se deben mezclar con alimentos o líquidos, debido a la inestabilidad química de Dabrafenib. Se recomienda que la dosis de Dabrafenib se tome a la misma hora cada día, dejando un intervalo de aproximadamente 12 horas entre dosis. Dabrafenib se debe tomar al menos una hora antes o 2 horas después de las comidas. Si el paciente vomita después de tomar Dabrafenib, no debe volver a tomar la dosis, y debe esperar a la siguiente toma.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DACARBAZINA

DACARBAZINA MEDAC 1000 mg POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: DACARBAZINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AX-OTROS AGENTES ALQUILANTES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia (ver sección 4.6). Leucopenia y/o trombocitopenia. Enfermedades hepáticas o renales graves.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DACTINOMICINA

DACTINOMICINA 500 MCG iny

Principio activo: DACTINOMICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DA-ACTINOMICINAS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquier componente del producto; pacientes con varicela o herpes zóster o poco antes o después de estas infecciones.

Observaciones

Ficha técnica de Cosmogen®. Centro de Información online de Medicamentos de la FDA [base de datos en Internet]. US Department of Health & Human Services Disponible en: www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm

DARATUMUMAB

DARZALEX 1.800 MG SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 15 ml

Principio activo: DARATUMUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FC-INHIBIDORES DE CD38 (GRUPOS DE DIFERENCIACIÓN 38)

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

La formulación subcutánea de Daratumumab no está indicado para la administración intravenosa y se debe administrar únicamente mediante inyección subcutánea, utilizando las dosis especificadas.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DARZALEX 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 20 ml

Principio activo: DARATUMUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FC-INHIBIDORES DE CD38 (GRUPOS DE DIFERENCIACIÓN 38)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DARZALEX 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 5 ml

Principio activo: DARATUMUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FC-INHIBIDORES DE CD38 (GRUPOS DE DIFERENCIACIÓN 38)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DAROLUTAMIDA

NUBEQA 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 112 comprimidos

Principio activo: DAROLUTAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L02BB-ANTIANDRÓGENOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

La Darolutamida se administra por vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros con alimentos.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Mujeres que estén o puedan quedarse embarazadas.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DASATINIB

DASATINIB VIATRIS 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 56 comprimidos

Principio activo: DASATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Dasatinib se debe administrar por vía oral. Los comprimidos recubiertos con película no se deben triturar, ni fraccionar, ni masticar para mantener la consistencia de la dosificación y minimizar el riesgo de exposición dérmica, se deben tragar enteros. Los comprimidos recubiertos no se deben disolver ya que la exposición en pacientes que reciben un comprimido disuelto es menor que en aquellos que ingieren un comprimido completo. Dasatinib polvo para suspensión oral también está disponible para pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica y LLA Ph+ y pacientes adultos con LMC en fase crónica que no pueden tragar los comprimidos. Dasatinib se puede tomar con o sin comida y se debe tomar de manera constante o por la mañana o por la noche. No se debe tomar Dasatinib con pomelo o zumo de pomelo.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DASATINIB VIATRIS 70 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 56 comprimidos

Principio activo: DASATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Dasatinib se debe administrar por vía oral. Los comprimidos recubiertos con película no se deben triturar, ni fraccionar, ni masticar para mantener la consistencia de la dosificación y minimizar el riesgo de exposición dérmica, se deben tragar enteros. Los comprimidos recubiertos no se deben disolver ya que la exposición en pacientes que reciben un comprimido disuelto es menor que en aquellos que ingieren un comprimido completo. Dasatinib polvo para suspensión oral también está disponible para pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica y LLA Ph+ y pacientes adultos con LMC en fase crónica que no pueden tragar los comprimidos. Dasatinib se puede tomar con o sin comida y se debe tomar de manera constante o por la mañana o por la noche. No se debe tomar Dasatinib con pomelo o zumo de pomelo.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DAUNORUBICINA**DAUNOBLASTINA 20 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE , 1 vial + 1 ampolla de disolvente**

Principio activo: DAUNORUBICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración**IV:** INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a otras antraciclinas o antracenodionas. Mielosupresión persistente. Infecciones graves. Deterioro grave de la función hepática [Child-Pugh grado C (puntuación total 10-15)] o renal (GFR 7,9 mg/dl). Insuficiencia cardíaca. Infarto de miocardio reciente. Arritmias graves. Tratamientos anteriores con dosis acumulativas máximas de daunorubicina (500-600 mg/m² en adultos, 300 mg/m²

en niños de 2 años o mayores, 10 mg/kg de peso en niños menores de dos años) u otras antraciclinas cardiotóxicas. En estos casos, aumenta notablemente el riesgo de daño cardíaco amenazante para la vida (ver sección 4.4). Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VYXEOS LIPOSOMAL 44 MG/100 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: DAUNORUBICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XY-COMBINACIONES DE ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Antecedentes de hipersensibilidad grave a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

No se debe administrar por vía intramuscular, intratecal ni subcutánea.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DESFLURANO

DESFLURANO BAXTER 100% LÍQUIDO PARA INHALACIÓN DEL VAPOR, 6 frascos de 240 ml

Principio activo: DESFLURANO

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AB-ANESTÉSICOS GENERALES: HIDROCARBUROS HALOGENADOS

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN PARA INHALA

Vías de administración

IH: INHALATORIA

El Desflurano se administra vía inhalatorio y deberá ser administrado exclusivamente por personas formadas en la administración anestesia, con un vaporizador diseñado e indicado específicamente para su uso.

Contraindicaciones

El desflurano está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a los agentes halogenados. El desflurano no debe emplearse en pacientes en los que esté contraindicada una anestesia general. No debe utilizarse en pacientes con susceptibilidad conocida o genética a la hipertermia maligna (ver sección 4.4). El desflurano está contraindicado en pacientes con antecedentes de hepatitis confirmada debida a un anestésico de inhalación halogenado o con una historia de disfunción hepática de moderada a grave inexplicable (por ejemplo, ictericia asociada con fiebre y/o eosinofilia) posterior a la administración previa de anestésicos halogenados. El desflurano no debe utilizarse como único agente en la inducción anestésica en pacientes con riesgo de enfermedad de las arterias coronarias o en pacientes en los que el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca están contraindicados. El desflurano no debe emplearse como agente de inducción por inhalación en pacientes pediátricos debido a la frecuente aparición de tos, contención de la respiración, apnea, laringoespasma y aumento de las secreciones.

Observaciones

Todos los pacientes anestesiados con Desflurano deben estar monitorizados constantemente, incluyendo electrocardiograma (ECG), presión arterial (PA), y saturación de oxígeno y la concentración teleespiratoria de dióxido de carbono (CO₂). Debe conocerse con exactitud la concentración de Desflurano que se administra a través del vaporizador.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DEXMEDETOMIDINA

DEXDOR 100 MICROGRAMOS/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION (25X2 ml), 25 ampollas de 2 ml

Principio activo: DEXMEDETOMIDINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N05CM-OTROS HIPNÓTICOS Y SEDANTES

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

1 mg en 240 mL SF

Concentración total: 1 mg en 250 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 0.2-1.4 (inicio 0.7)

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Bloqueo cardíaco avanzado (grado 2 ó 3) en ausencia de marcapasos. Hipotensión no controlada. Enfermedad cerebrovascular aguda.

Observaciones

Estabilidad 24-48 h. No precisa administración por vía central. Se puede mezclar con SG5%.
Aconsejable su administración por una sola luz del catéter, para evitar la administración de bolos.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DEXMEDETOMIDINA EVER PHARMA 100 MICROGRAMOS/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 4 ampollas de 10 ml

Principio activo: DEXMEDETOMIDINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N05CM-OTROS HIPNÓTICOS Y SEDANTES

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

1 mg en 240 mL SF

Concentración total: 1 mg en 250 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 0.2-1.4 (inicio 0.7)

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Bloqueo cardíaco avanzado (grado 2 ó 3) en ausencia de marcapasos. Hipotensión no controlada. Enfermedad cerebrovascular aguda.

Observaciones

Estabilidad 24-48 h. No precisa administración por vía central. Se puede mezclar con SG5%.
Aconsejable su administración por una sola luz del catéter, para evitar la administración de bolos.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DIGOXINA**DIGOXINA KERN PHARMA 0,25 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 5
ampollas de 2 ml**

Principio activo: DIGOXINA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01AA-GLUCÓSIDOS DE DIGITAL

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración**IM: INTRAMUSCULAR**

La vía intramuscular es dolorosa y está asociada con necrosis muscular. No se puede recomendar esta vía.

IV: INTRAVENOSA

Se puede administrar sin diluir lentamente en al menos 5 minutos.

PF: PERFUSIÓN

Este medicamento se puede administrar diluido con un volumen de SF ó SG5% 4 veces mayor o más, para evitar la precipitación de la Digoxina.

Contraindicaciones

Bloqueo cardíaco intermitente o bloqueo aurículoventricular de segundo grado, especialmente si hay antecedentes de Síndrome de Stokes-Adams. Arritmias originadas por intoxicación con glucósidos cardíacos. Arritmias supraventriculares asociadas con una vía accesorio aurículoventricular, como en el caso del síndrome de Wolff-Parkinson-White, a menos que se hayan evaluado las características electrofisiológicas de la vía accesorio y cualquier efecto nocivo de digoxina sobre dichas características. Si se sabe o sospecha de la existencia de una vía accesorio y no existen antecedentes de arritmias supraventriculares previas. Taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular. Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, a menos que exista fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca concomitantes, aunque incluso en este caso, se debe tener precaución si se va a utilizar digoxina. Hipersensibilidad a digoxina, a otros glucósidos digitálicos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Se debe tener en cuenta la diferencia de biodisponibilidad entre digoxina solución inyectable y las formas orales al cambiar de una forma farmacéutica a otra. Por ejemplo, si se pasa un paciente de la formulación oral a la intravenosa la dosis debe reducirse al menos en un 33%. Contiene alcohol etílico como excipiente.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DINUTUXIMAB

QARZIBA 4,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 4,5 ml

Principio activo: DINUTUXIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Enfermedad de injerto contra huésped (EICH) aguda de grado 3 o 4, o crónica intensa.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DOBUTAMINA

DOBUTAMINA HOSPIRA 12,5 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 10 ampollas de 20 ml

Principio activo: DOBUTAMINA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CA-ESTIMULANTES CARDÍACOS: ADRENÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

1 g en 420 mL SF, SG5%, R. Lactato

Concentración total: 1 g en 500 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 1-20

Contraindicaciones

La dobutamina no debe ser administrada en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad a dobutamina o a alguno de sus derivados.
- Descompensación asociada a una cardiomiopatía hipertrófica.
- Historia de hipersensibilidad a sulfitos: en especial los pacientes asmáticos pueden presentar reacciones como broncoespasmo y shock anafiláctico.
- Obstrucción mecánica en la eyección o llenado del ventrículo izquierdo, especialmente en el caso de una cardiomiopatía obstructiva, estenosis aórtica o pericarditis constrictiva.
- Ecocardiografía de estrés con dobutamina La dobutamina no debe utilizarse para la detección de isquemia miocárdica y de miocardio viable en caso de: infarto de miocardio reciente (en los últimos 30 días) angina de pecho inestable estenosis de la arteria coronaria izquierda obstrucción hemodinámicamente significativa del flujo del ventrículo izquierdo incluyendo miocardiopatía hipertrófica obstructiva defecto valvular cardiaco hemodinámicamente significativo insuficiencia cardíaca grave (NYHA III o IV) predisposición o historia clínica documentada de arritmia clínicamente significativa o crónica, taquicardia ventricular persistente especialmente recurrente anomalía significativa de la conducción pericarditis , miocarditis o endocarditis agudas disección aórtica aneurisma aórtico imágenes ecográficas de mala calidad hipertensión arterial inadecuadamente tratada/controlada obstrucción del llenado ventricular (pericarditis constrictiva,

taponamiento pericárdico) hipovolemia antecedentes previos de hipersensibilidad a la dobutamina

Nota: Las respectivas contraindicaciones tienen que tenerse en cuenta si se administra atropina.

Observaciones

Estabilidad: 24 h (15-25 °C). Administrar por catéter venoso central. Las soluciones pueden presentar un color rosa debido a la ligera oxidación del fármaco, sin pérdida significativa de potencia durante el periodo de almacenamiento recomendado. No debe mezclarse con bicarbonato sódico ni con otras soluciones fuertemente alcalinas y contiene metabisulfito sódico como excipiente por lo que puede causar reacciones alérgicas, incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmo, especialmente en pacientes asmáticos o alérgicos.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DOCETAXEL

DOCETAXEL AUROVITAS 20 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 1 vial de 7 ml

Principio activo: DOCETAXEL

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CD-TAXANOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Docetaxel no se debe utilizar en pacientes con un recuento basal de neutrófilos <1.500 células/mm³. Docetaxel no se debe utilizar en pacientes con alteración hepática grave debido a que no se dispone de datos (ver secciones 4.2 y 4.4). Las contraindicaciones para otros medicamentos también se aplican cuando se combinan con docetaxel.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DOCETAXEL SEACROSS 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 8 ml

Principio activo: DOCETAXEL

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CD-TAXANOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con recuento basal de neutrófilos inferior a 1.500 células/mm³. Pacientes con insuficiencia hepática grave (ver las secciones 4.2 y 4.4). Las contraindicaciones de otros medicamentos se aplican asimismo cuando se combinan con docetaxel.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DOPAMINA

DOPAMINA GRIFOLS 200 mg SOLUCIÓN INYECTABLE, 6 ampollas de 5 ml

Principio activo: DOPAMINA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CA-ESTIMULANTES CARDÍACOS: ADRENÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

1 g en 475 mL SF, SG5%, Ringer Lactato.

Concentración total: 1 g en 500 mL

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 1 - 20

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Feocromocitoma. - Taquiarritmias cardíacas como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular.

Observaciones

Estabilidad de la Perfusión: 24 h (15-25°C). Administrar por catéter venoso central. No mezclar con soluciones alcalinas.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DOSTARLIMAB

JEMPERLI 500 mg CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml

Principio activo: DOSTARLIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DOXORUBICINA

DOXORUBICINA AUROVITAS 2 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 100 ml

Principio activo: DOXORUBICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

VI: INTRAVESICAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a otras antraciclinas o antracenodionas. Contraindicaciones para la administración por vía intravenosa: mielosupresión persistente o estomatitis grave inducida por tratamiento citotóxico y/o radioterapia previos infección generalizada alteración hepática grave arritmias graves, alteración cardíaca, infarto de miocardio previo, enfermedad cardíaca inflamatoria aguda tratamientos anteriores con dosis acumulativas máximas de antraciclinas periodo de lactancia. Contraindicaciones para la administración por vía intravesical: tumores invasivos que han penetrado en la vejiga (más allá de T1) infecciones en el tracto urinario inflamación de la vejiga problemas con la cateterización, por ejemplo, estenosis uretral hematuria periodo de lactancia.

Observaciones

La posología de Doxorubicina S-Liposomal y la de Doxorubicina (convencional) son diferentes. No se pueden intercambiar las dos formulaciones.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DOXORUBICINA AUROVITAS 2 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 25 ml

Principio activo: DOXORUBICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

VI: INTRAVESICAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a otras antraciclinas o antracenodionas. Contraindicaciones para la administración por vía intravenosa: mielosupresión persistente o estomatitis grave inducida por tratamiento citotóxico y/o radioterapia previos infección generalizada alteración hepática grave arritmias graves, alteración cardíaca, infarto de miocardio previo, enfermedad cardíaca inflamatoria aguda tratamientos anteriores con dosis acumulativas máximas de antraciclinas periodo de lactancia. Contraindicaciones para la administración por vía intravesical: tumores invasivos que han penetrado en la vejiga (más allá de T1) infecciones en el tracto urinario inflamación de la vejiga problemas con la cateterización, por ejemplo, estenosis uretral hematuria periodo de lactancia.

Observaciones

La posología de Doxorubicina S-Liposomal y la de Doxorubicina (convencional) son diferentes. No se pueden intercambiar las dos formulaciones.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FARMIBLASTINA 50 mg POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial

Principio activo: DOXORUBICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

VI: INTRAVESICAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a otras antraciclinas o antracenodionas. Uso por vía intravenosa: mielosupresión persistente alteración hepática grave insuficiencia miocárdica grave infarto miocárdico reciente arritmias graves tratamientos anteriores con dosis acumulativas máximas de doxorubicina, daunorubicina, epirubicina, idarubicina y/o otras antraciclinas y antracenodionas (ver sección 4.4).
Uso por vía intravesical: infecciones en el tracto urinario inflamación de la vejiga hematuria.

Observaciones

La posología de Doxorubicina S-liposomal y la de Doxorubicina (convencional) son diferentes. No se pueden intercambiar las dos formulaciones.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DOXORUBICINA (LIPOSOMIAL)

CAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL 2 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml

Principio activo: DOXORUBICINA (LIPOSOMIAL)

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, al cacahuete o a la soja, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. No debe utilizarse Caelyx pegylated liposomal para tratar SK-SIDA que puede ser tratado eficazmente con terapia local o interferón-alfa sistémico.

Observaciones

Doxorubicina pegylado liposomal presenta unas propiedades farmacocinéticas particulares por lo que no se debe utilizar de manera intercambiable con otras formulaciones de hidrocloreuro de Doxorubicina.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DURVALUMAB

IMFINZI 50 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml

Principio activo: DURVALUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IMFINZI 50 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 2,4 ml

Principio activo: DURVALUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

EDOXABAN

LIXIANA 30 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 comprimidos

Principio activo: EDOXABAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AF-INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTO XA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Edoxabán puede tomarse con o sin alimentos.

Para los pacientes que no puedan tragar los comprimidos enteros, se pueden triturar y mezclar con agua o compota de manzana, y administrarse inmediatamente por vía oral. Alternativamente, se pueden triturar y suspender en una pequeña cantidad de agua, y administrarse inmediatamente mediante sonda nasogástrica o sonda de alimentación gástrica, la cual se irrigará con agua posteriormente. Los comprimidos de Edoxaban triturados son estables en agua y en compota de manzana durante un periodo de hasta 4 horas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Sangrado activo clínicamente significativo. Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo de sangrado clínicamente relevante. Lesión o enfermedad, si se considera que tiene un riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, traumatismo cerebral o espinal reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores. Hipertensión grave no controlada. Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, p. ej., HNF, heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, dabigatrán etexilato, rivaroxabán, apixabán, etc.) excepto bajo las circunstancias concretas de cambio de tratamiento anticoagulante oral (ver sección 4.2) o cuando se administre HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central permeable (ver sección 4.5). Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LIXIANA 60 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 comprimidos

Principio activo: EDOXABAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AF-INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTO XA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Edoxabán puede tomarse con o sin alimentos.

Para los pacientes que no puedan tragar los comprimidos enteros, se pueden triturar y mezclar con agua o compota de manzana, y administrarse inmediatamente por vía oral. Alternativamente, se pueden triturar y suspender en una pequeña cantidad de agua, y administrarse inmediatamente mediante sonda nasogástrica o sonda de alimentación gástrica, la cual se irrigará con agua posteriormente. Los comprimidos de Edoxaban triturados son estables en agua y en compota de manzana durante un periodo de hasta 4 horas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Sangrado activo clínicamente significativo. Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo de sangrado clínicamente relevante. Lesión o enfermedad, si se considera que tiene un riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, traumatismo cerebral o espinal reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores. Hipertensión grave no controlada. Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, p. ej., HNF, heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, dabigatrán etexilato, rivaroxabán, apixabán, etc.) excepto bajo las circunstancias concretas de cambio de tratamiento anticoagulante oral (ver sección 4.2) o cuando se administre HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central permeable (ver sección 4.5). Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ELRANATAMAB

ELREXFIO 40 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, un vial de 1,1 ml

Principio activo: ELRANATAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ELREXFIO 40 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, un vial de 1,9 ml

Principio activo: ELRANATAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ENCORAFENIB

BRAFTOVI 75 MG CAPSULAS DURAS, 42 cápsulas

Principio activo: ENCORAFENIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EC-INHIBIDORES DE LA SERINA-TREONINA QUINASA BRAF

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Encorafenib se toma vía oral. Las cápsulas deben tragarse enteras con agua. Pueden tomarse con o sin alimentos. Se debe evitar la administración de Encorafenib con zumo de pomelo.

Para los pacientes que no pueden tragar, las cápsulas de Encorafenib se pueden abrir y dispersar el contenido en una pequeña cantidad (aproximadamente 20 ml) de puré de manzana y tomar inmediatamente.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ENFORTUMAB

PADCEV 30 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: ENFORTUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ENOXAPARINA

CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/ 1 ml SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA , 10 jeringas precargadas de 1 ml

Principio activo: ENOXAPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

En bolo intravenoso (IV) para el tratamiento de IAMCEST.

SC: SUBCUTANEA

sí

Contraindicaciones

Enoxaparina sódica está contraindicada en pacientes con: Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; Antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o en presencia de anticuerpos circulantes (ver también sección 4.4); Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u oftalmológica recientes, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o intracerebrales; Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 4.4).

Observaciones

En la prevención de la formación de coágulos durante la hemodiálisis se debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del circuito al comienzo de la sesión de diálisis.

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir “unidades” en lugar de “U”.

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INHIXA 10.000 UI (100 MG)/1 ML SOLUCION INYECTABLE, 30 jeringas precargadas de 1 ml (aguja con protector)

Principio activo: ENOXAPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

En bolo intravenoso (IV) para el tratamiento de IAMCEST.

SC: SUBCUTANEA

Sí

Contraindicaciones

Enoxaparina sódica está contraindicada en pacientes con: Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; Antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o en presencia de anticuerpos circulantes (ver también sección 4.4); Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u oftalmológica reciente, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o intracerebrales; Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 4.4).

Observaciones

En la prevención de la formación de coágulos durante la hemodiálisis se debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del circuito al comienzo de la sesión de diálisis.

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir "unidades" en lugar de "U".

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INHIXA 12.000 UI (120 MG)/0,8 ML SOLUCION INYECTABLE, 30 jeringas precargadas de 0,8 ml (aguja con protector)

Principio activo: ENOXAPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Sí

VI: INTRAVESICAL

En bolo intravenoso (IV) para el tratamiento de IAMCEST.

Contraindicaciones

Enoxaparina sódica está contraindicada en pacientes con: Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; Antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o en presencia de anticuerpos circulantes (ver también sección 4.4); Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u oftalmológica reciente, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o intracerebrales; Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 4.4).

Observaciones

En la prevención de la formación de coágulos durante la hemodiálisis se debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del circuito al comienzo de la sesión de diálisis.

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir "unidades" en lugar de "U".

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INHIXA 2.000 UI (20 MG)/0,2 ML SOLUCION INYECTABLE 50 jeringas precargadas de 0,2 ml (aguja con protector)

Principio activo: ENOXAPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

En bolo intravenoso (IV) para el tratamiento de IAMCEST.

SC: SUBCUTANEA

sí.

Contraindicaciones

Enoxaparina sódica está contraindicada en pacientes con: Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; Antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina

(TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o en presencia de anticuerpos circulantes (ver también sección 4.4); Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u oftalmológica reciente, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o intracerebrales; Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 4.4).

Observaciones

En la prevención de la formación de coágulos durante la hemodiálisis se debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del circuito al comienzo de la sesión de diálisis.

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir "unidades" en lugar de "U".

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INHIXA 4.000 UI (40 MG)/0,4 ML SOLUCION INYECTABLE, 50 jeringas precargadas de 0,4 ml (aguja con protector)

Principio activo: ENOXAPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

En bolo intravenoso (IV) para el tratamiento de IAMCEST.

SC: SUBCUTANEA

Sí

Contraindicaciones

Enoxaparina sódica está contraindicada en pacientes con: Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; Antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o en presencia de anticuerpos circulantes (ver también sección 4.4); Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias

malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u oftalmológica reciente, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o intracerebrales; Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 4.4).

Observaciones

En la prevención de la formación de coágulos durante la hemodiálisis se debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del circuito al comienzo de la sesión de diálisis.

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir “unidades” en lugar de “U”.

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INHIXA 6.000 UI (60 MG)/0,6 ML SOLUCION INYECTABLE, 30 jeringas precargadas de 0,6 ml (aguja con protector)

Principio activo: ENOXAPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

En bolo intravenoso (IV) para el tratamiento de IAMCEST.

SC: SUBCUTANEA

Sí

Contraindicaciones

Enoxaparina sódica está contraindicada en pacientes con: Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; Antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o en presencia de anticuerpos circulantes (ver también sección 4.4); Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u oftalmológica reciente, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o intracerebrales; Anestesia espinal o epidural o anestesia

locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 4.4).

Observaciones

En la prevención de la formación de coágulos durante la hemodiálisis se debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del circuito al comienzo de la sesión de diálisis.

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir “unidades” en lugar de “U”.

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INHIXA 8.000 UI (80 MG)/0,8 ML SOLUCION INYECTABLE, 30 jeringas precargadas de 0,8 ml (aguja con protector)

Principio activo: ENOXAPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

En bolo intravenoso (IV) para el tratamiento de IAMCEST.

SC: SUBCUTANEA

Sí

Contraindicaciones

Enoxaparina sódica está contraindicada en pacientes con: Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; Antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o en presencia de anticuerpos circulantes (ver también sección 4.4); Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u oftalmológica reciente, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o intracerebrales; Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 4.4).

Observaciones

En la prevención de la formación de coágulos durante la hemodiálisis se debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del circuito al comienzo de la sesión de diálisis.

Dosificar las HBPM considerando la posología recomendada para cada indicación, el peso real del paciente y la función renal. Escribir "unidades" en lugar de "U".

Proporcionar información clara y comprensible a los pacientes (o familiares o cuidadores), para que utilicen correctamente las HBPM. Se debe informar verbalmente y también proporcionar instrucciones escritas y material de soporte educativo.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ENZALUTAMIDA

XTANDI 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 112 comprimidos

Principio activo: ENZALUTAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L02BB-ANTIANDRÓGENOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Enzalutamida se administra por vía oral. Las cápsulas blandas no se deben masticar, disolver ni abrir, se deben tragar enteras con una cantidad suficiente de agua y se pueden tomar con o sin alimentos.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

EPCORITAMAB

TEPKINLY 4 MG/0,8 ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 0,8 ml

Principio activo: EPCORITAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TEPKINLY 48 MG SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 0,8 ml

Principio activo: EPCORITAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

EPIRUBICINA

EPIRUBICINA TEVA 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 100 ml

Principio activo: EPIRUBICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

VI: INTRAVESICAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 o a otras antraciclinas o antracenodionas. Lactancia Vía intravenosa Mielosupresión persistente Insuficiencia hepática grave Infarto agudo de miocardio (incluyendo insuficiencia cardíaca grado IV, infarto agudo e infarto previo con insuficiencia cardíaca residual grado III ó IV, enfermedad inflamatoria aguda de corazón) Infarto de miocardio reciente Angina de pecho inestable Miocardiopatía Arritmias graves Pacientes con infecciones sistémicas agudas Tratamientos previos con dosis máximas acumuladas de epirubicina hidrocloreuro y/u otras antraciclinas y antracenodionas (ver sección 4.4) Vía intravesical Infecciones del tracto urinario Inflamación vesical Hematuria Tumores invasivos que penetran en la vejiga Problemas de cateterización Volumen elevado de orina residual Vejiga contraída

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FARMORUBICINA 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 1 vial de 25 ml

Principio activo: EPIRUBICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

VI: INTRAVESICAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Farmorubicina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a epirubicina, a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, a otras antraciclinas o antracenodionas. Asimismo, está contraindicada durante la lactancia. La administración por vía intravenosa de Farmorubicina está contraindicada en las siguientes situaciones: Mielosupresión persistente. Insuficiencia hepática grave. Insuficiencia cardíaca grave. Infarto de miocardio reciente. Arritmias graves. Tratamientos previos con dosis máximas acumulativas de hidroclicloruro de epirubicina y/u otras antraciclinas o antracenodionas (ver sección 4.4). Pacientes con infecciones sistémicas agudas. Angina de pecho inestable. Miocardiopatía. La administración por vía intravesical de Farmorubicina está contraindicada en las siguientes situaciones: Infecciones del tracto urinario. Inflamación de la vejiga. Hematuria. Tumores invasivos que han penetrado en la pared de la vejiga. Problemas con el cateterismo.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

EPOPROSTENOL

VELETRI 0,5 MG POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: EPOPROSTENOL

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AC-ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (EXCL. HEPARINA)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Epoprostenol se administra en perfusión continua a través de un catéter venoso central. No se debe administrar como inyección en bolo.

En Diálisis renal el Epoprostenol es adecuado solo para perfusión continua, bien por vía intravascular o en la sangre que alimenta el dializador.

Contraindicaciones

VELETRI está contraindicado en pacientes: • con hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. • con insuficiencia cardíaca congestiva derivada de una disfunción grave del ventrículo izquierdo. • VELETRI no se debe utilizar de forma crónica en los pacientes que desarrollen edema pulmonar durante la fase de búsqueda de dosis.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VELETRI 1,5 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial + 1 frasco de disolvente

Principio activo: EPOPROSTENOL

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AC-ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (EXCL. HEPARINA)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Epoprostenol se administra en perfusión continua a través de un catéter venoso central. No se debe administrar como inyección en bolo.

En Diálisis renal el Epoprostenol es adecuado sólo para perfusión continua, bien por vía intravascular o en la sangre que alimenta el dializador.

Contraindicaciones

VELETRI está contraindicado en pacientes: • con hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. • con insuficiencia cardíaca congestiva derivada de una disfunción grave del ventrículo izquierdo. • VELETRI no se debe utilizar de forma crónica en los pacientes que desarrollen edema pulmonar durante la fase de búsqueda de dosis.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ERDAFITINIB

BALVERSA 3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 84 comprimidos

Principio activo: ERDAFITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EN-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS (FGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Erdafitinib se deben tragar enteros, con o sin alimentos, aproximadamente a la misma hora todos los días. Se debe evitar el consumo de pomelo o naranjas amargas mientras se esté tomando debido a la potente inhibición del CYP3A4.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BALVERSA 4 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos

Principio activo: ERDAFITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EN-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS (FGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Erdafitinib se administra por vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros, con o sin alimentos, aproximadamente a la misma hora todos los días. Se debe evitar el consumo de pomelo o naranjas amargas mientras se esté tomando Erdafitinib debido a la potente inhibición del CYP3A4.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

BALVERSA 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos

Principio activo: ERDAFITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EN-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS (FGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Erdafitinib se administra por vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros, con o sin alimentos,

aproximadamente a la misma hora todos los días. Se debe evitar el consumo de pomelo o naranjas amargas mientras se esté tomando Erdafitinib debido a la potente inhibición del CYP3A4.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ERIBULINA

HALAVEN 0,44 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 2 ml

Principio activo: ETRIBULINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ERLOTINIB

ERLOTINIB TEVA GROUP 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos

Principio activo: ERLOTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EB-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis diaria recomendada de Erlotinib será administrada al menos una hora antes o dos después de la ingestión de alimentos.

Se ha demostrado que fumar cigarrillos reduce la exposición a Erlotinib en un 50-60%. Por lo tanto se debe recomendar a los fumadores activos que dejen de fumar.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a Erlotinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TARCEVA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: ERLOTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EB-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis diaria recomendada de Erlotinib será administrada al menos una hora antes o dos después de la ingestión de alimentos.

Se ha demostrado que fumar cigarrillos reduce la exposición a Erlotinib en un 50-60%. Por lo tanto se debe recomendar a los fumadores activos que dejen de fumar.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a Erlotinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ESKETAMINA

SPRAVATO 28 MG SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 envase con pulverizador

Principio activo: ESKETAMINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N06AX-OTROS ANTIDEPRESIVOS

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN NASAL

Vías de administración

IH: INHALATORIA

VN: NASAL

Este medicamento es para vía nasal únicamente. El pulverizador nasal es un dispositivo de un solo uso que administra un total de 28 mg de Esketamina en dos pulverizaciones (una por fosa nasal). Está destinado para la administración por el propio paciente bajo la supervisión de un profesional sanitario, utilizando uno, dos o tres dispositivos con un intervalo de 5 minutos de descanso entre cada dispositivo.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, ketamina, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes en quienes el aumento de la presión arterial o de la presión intracraneal suponga un riesgo grave (ver sección 4.8): Pacientes con vasculopatía aneurismática (incluida la de vasos intracraneales, torácicos o de la aorta abdominal o de arterias periféricas). Pacientes con antecedentes de hemorragia intracerebral. Episodio cardiovascular reciente (en las 6 semanas previas), incluido el infarto de miocardio (IM).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ESMOLOL

BREVIBLOC 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 5 viales de 10 ml

Principio activo: ESMOLOL

Datos generales

Grupo terapéutico: C07AB-BETA-BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS CARDIOSELECTIVOS, SOLOS.

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Esmolol se administra por vía intravenosa con una dosis de carga inicial seguido de una perfusión de mantenimiento.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes (puede producirse sensibilidad cruzada entre los betabloqueantes) Bradicardia sinusal grave (menos de 50 pulsaciones por minuto); Síndrome de disfunción sinusal; trastornos graves de conductancia del nodo auriculoventricular (sin marcapasos); bloqueo AV de segundo o tercer grado; Shock cardiogénico; Hipotensión grave; Insuficiencia cardíaca descompensada; La administración intravenosa concomitante o reciente de verapamilo. No se debe administrar Brevibloc en un plazo de 48 horas posteriores a la interrupción del tratamiento con verapamilo (ver sección 4.5); Feocromocitoma no tratado; Hipertensión pulmonar; Crisis asmática aguda; Acidosis metabólica.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ETOMIDATO

HYPNOMIDATE 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 5 ampollas de 10 ml

Principio activo: ETOMIDATO

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AX-OTROS ANESTÉSICOS GENERALES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Etomidato debe inyectarse lentamente por vía intravenosa.

La hipnosis se puede prolongar mediante inyecciones adicionales y no se debe sobrepasar la cantidad total de 3 ampollas (30 ml).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ETOPOSIDO

ETOPOSIDO ACCORD 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 5 ml

Principio activo: ETOPOSIDO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CB-DERIVADOS DE LA PODOFILOTOXINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6) El uso concomitante con la vacuna de la fiebre amarilla u otras vacunas con virus vivos está contraindicado en pacientes inmunodeprimidos (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ETOPÓSIDO SANDOZ 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN EFG , 1 vial de 10 ml

Principio activo: ETOPOSIDO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CB-DERIVADOS DE LA PODOFILOTOXINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. El uso concomitante de vacuna contra la fiebre amarilla u otras vacunas con virus vivos está contraindicado en los pacientes inmunodeprimidos (ver sección 4.5). Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VEPESID 100 mg CAPSULAS BLANDAS , 10 cápsulas

Principio activo: ETOPOSIDO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CB-DERIVADOS DE LA PODOFILOTOXINA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas deben tomarse con el estómago vacío.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo, etil parahidroxibenzoato sódico (E-215), propil parahidroxibenzoato sódico (E-217) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 - El uso concomitante de la vacuna contra la fiebre amarilla u otras vacunas con virus vivos está contraindicado en los pacientes inmunodeprimidos - Lactancia

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VEPESID 50 mg CAPSULAS BLANDAS , 20 cápsulas

Principio activo: ETOPOSIDO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CB-DERIVADOS DE LA PODOFILOTOXINA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas deben tomarse con el estómago vacío.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo, etil parahidroxibenzoato sódico (E-215), propil parahidroxibenzoato sódico (E-217) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 - El uso concomitante de la vacuna contra la fiebre amarilla u otras vacunas con virus vivos está contraindicado en los pacientes inmunodeprimidos - Lactancia

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

EVEROLIMUS

EVEROLIMUS ACCORD 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos

Principio activo: EVEROLIMUS

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EG-INHIBIDORES DE LA DIANA DE RAPAMICINA EN CÉLULAS DE MAMIFERO (mTOR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Everolimus debe administrarse por vía oral una vez al día, a la misma hora cada día, sistemáticamente con comida o bien sin comida. Los comprimidos se deben tragar enteros, con un vaso de agua. Los comprimidos no deben masticarse ni triturarse.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados de rapamicina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

EVEROLIMUS ACCORD 5 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos

Principio activo: EVEROLIMUS

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EG-INHIBIDORES DE LA DIANA DE RAPAMICINA EN CÉLULAS DE MAMIFERO (mTOR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Everolimus debe administrarse por vía oral una vez al día, a la misma hora cada día, con comida o bien sin comida. Los comprimidos se deben tragar enteros, con un vaso de agua. No deben masticarse ni triturarse.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados de rapamicina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

EVEROLIMUS ETHYPHARM 2.5 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos

Principio activo: EVEROLIMUS

Datos generales

Grupo terapéutico: L04AA-INMUNOSUPRESORES SELECTIVOS

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Everolimus debe administrarse por vía oral una vez al día, a la misma hora cada día, sistemáticamente con comida o bien sin comida. Los comprimidos de everolimus deben tragarse enteros, con un vaso de agua. Los comprimidos no deben masticarse ni triturarse.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados de rapamicina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VOTUBIA 10 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos

Principio activo: EVEROLIMUS

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EG-INHIBIDORES DE LA DIANA DE RAPAMICINA EN CÉLULAS DE MAMIFERO (mTOR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Everolimus debe administrarse por vía oral una vez al día, a la misma hora cada día, con comida o bien sin comida. Los comprimidos deben tragarse enteros, con un vaso de agua. No deben masticarse ni triturarse. Para pacientes que no pueden tragar los comprimidos, pueden dispersarse completamente en un vaso con aproximadamente 30 ml de agua removiendo suavemente hasta que estén completamente disgregados (aproximadamente 7 minutos). Después de haber tragado la dispersión, cualquier resto debe volver a dispersarse en el mismo volumen de agua y debe tragarse.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados de rapamicina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VOTUBIA 3 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES, 30 comprimidos

Principio activo: EVEROLIMUS

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EG-INHIBIDORES DE LA DIANA DE RAPAMICINA EN CÉLULAS DE MAMIFERO (mTOR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Everolimus debe administrarse por vía oral una vez al día, a la misma hora cada día, con comida o bien sin comida. Los comprimidos deben tragarse enteros, con un vaso de agua. No deben masticarse ni triturarse. Para pacientes que no pueden tragar los comprimidos, pueden dispersarse completamente en un vaso con aproximadamente 30 ml de agua removiendo suavemente hasta que estén

completamente disgregados (aproximadamente 7 minutos). Después de haber tragado la dispersión, cualquier resto debe volver a dispersarse en el mismo volumen de agua y debe tragarse.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados de rapamicina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VOTUBIA 5 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES, 30 comprimidos

Principio activo: EVEROLIMUS

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EG-INHIBIDORES DE LA DIANA DE RAPAMICINA EN CÉLULAS DE MAMIFERO (mTOR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Everolimus debe administrarse por vía oral una vez al día, a la misma hora cada día, con comida o bien sin comida. Los comprimidos deben tragarse enteros, con un vaso de agua. No deben masticarse ni triturarse. Para pacientes que no pueden tragar los comprimidos, pueden dispersarse completamente en un vaso con aproximadamente 30 ml de agua removiendo suavemente hasta que estén completamente disgregados (aproximadamente 7 minutos). Después de haber tragado la dispersión, cualquier resto debe volver a dispersarse en el mismo volumen de agua y debe tragarse.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados de rapamicina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FEDRATINIB

INREBIC 100 mg CAPSULAS DURAS, 120 capsulas

Principio activo: FEDRATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EJ-INHIBIDORES DE LA QUINASA ASOCIADA A JANUS (JAK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Fedratinib es para administración por vía oral. Las cápsulas no se deben abrir, romper ni masticar. Deben tragarse enteras, preferiblemente con agua, y se pueden tomar con o sin alimentos. La administración con una comida con un alto contenido en grasas puede reducir la incidencia de náuseas y vómitos; por lo tanto, se recomienda la toma con alimentos.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Embarazo.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FENILEFRINA

FENILEFRINA ALTAN 0,1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 10 bolsas de 100 ml (Bolsa PP + Sobrebolsa de AI)

Principio activo: FENILEFRINA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CA-ESTIMULANTES CARDÍACOS: ADRENÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La Fenilefrina en bolsa se administra en inyección en bolo intravenoso y en perfusión continua.

Contraindicaciones

- hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; - en pacientes con hipertensión severa o enfermedad vascular periférica debido al riesgo de gangrena isquémica o trombosis vascular; - en combinación con inhibidores no selectivos de la monoaminoxidasa (MAO) (o dentro de las 2 semanas posteriores a su retirada) debido al riesgo de hipertensión paroxística y posiblemente de hipertermia mortal (ver sección 4.5); - hipertiroidismo.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FENTANILO

ABSTRAL 100 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES , 30 comprimidos

Principio activo: FENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AB-OPIOIDES: DERIVADOS DE FENILPIPERIDINA

Forma farmacéutica: PELICULAS/COMP. BUCALES PARA CHUPAR

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos sublinguales se deben administrar directamente bajo la lengua en la parte más profunda. No se deben tragar sino dejar que se disuelvan completamente en la cavidad sublingual sin masticar ni chupar. Se debe advertir a los pacientes de que no coman ni beban nada hasta que el comprimido sublingual esté completamente disuelto.

En pacientes con sequedad de boca, se puede utilizar agua para humedecer la mucosa oral antes de administrar el comprimido.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides, por el mayor riesgo de depresión respiratoria. Depresión respiratoria grave o enfermedades pulmonares obstructivas graves. Tratamiento del dolor agudo distinto al dolor irruptivo. Pacientes que sean tratados con medicamentos que contienen oxibato de sodio.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ABSTRAL 200 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES , 30 comprimidos

Principio activo: FENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AB-OPIOIDES: DERIVADOS DE FENILPIPERIDINA

Forma farmacéutica: PELICULAS/COMP. BUCALES PARA CHUPAR

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos sublinguales se deben administrar directamente bajo la lengua en la parte más profunda. No se deben tragar sino dejar que se disuelvan completamente en la cavidad sublingual sin masticar ni chupar. Se debe advertir a los pacientes de que no coman ni beban nada hasta que el comprimido sublingual esté completamente disuelto.

En pacientes con sequedad de boca, se puede utilizar agua para humedecer la mucosa oral antes de administrar el comprimido.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides, por el mayor riesgo de depresión respiratoria. Depresión respiratoria grave o enfermedades pulmonares obstructivas graves. Tratamiento del dolor agudo distinto al dolor irruptivo. Pacientes que sean tratados con medicamentos que contienen oxibato de sodio.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

DUROGESIC MATRIX 12 microgramos/H PARCHES TRANSDERMICOS , 5 parches

Principio activo: FENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AB-OPIOIDES: DERIVADOS DE FENILPIPERIDINA

Forma farmacéutica: PARCHES

Vías de administración

TD: TRANSDERMICA

Los parches de Fentanilo son para uso transdérmico. Se deben aplicar en piel no irritada y no irradiada sobre una superficie plana en el torso o en la parte superior de los brazos. En niños pequeños, el lugar más adecuado para aplicar el parche es la parte superior de la espalda, con el fin de minimizar el riesgo de que el niño se quite el parche.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Dolor agudo o postoperatorio, ya que no se podría ajustar la dosis en un tiempo tan corto y se podría causar hipoventilación grave, la cual podría poner en peligro la vida del paciente. Depresión respiratoria grave.

Observaciones

No se deben usar en ninguna situación parches que estén cortados, divididos o dañados. Los parches pueden mostrar ocasionalmente cristalización (estructuras blancas en los bordes y/o en la superficie de la matriz). La presencia de cristales no afectará al funcionamiento del parche. No toque la cara adhesiva del parche ni los cristales.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FENTANEST 0,05 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 5 ampollas de 3 ml

Principio activo: FENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AH-ANESTÉSICOS GENERALES: ANESTÉSICOS OPIOIDES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

Sí

IV: INTRAVENOSA

Administrar lentamente en al menos 1 min.

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

450 mcg en 91 mL

Concentración total: 450 mcg en 100 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 0.3-3

SC: SUBCUTANEA

Sí

Contraindicaciones

Fentanilo está contraindicado en pacientes con Intolerancia conocida al fármaco o a otros morfínomiméticos. Traumatismo craneoencefálico, aumento de la presión intracraneal y/o coma. Niños menores de 2 años.

Observaciones

Conservación de la perfusión a temperatura ambiente. Estabilidad: 24 h. También puede administrarse vía epidural.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

**FENTANILO MATRIX SANDOZ 100 microgramos/HORA PARCHES
TRANSDERMICOS EFG, 5 parches**

Principio activo: FENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AB-OPIOIDES: DERIVADOS DE FENILPIPERIDINA

Forma farmacéutica: PARCHES

Vías de administración**TD: TRANSDERMICA**

Los parches de Fentanilo son para uso transdérmico. Se deben aplicar en piel no irritada y no irradiada sobre una superficie plana en el torso o en la parte superior de los brazos. En niños pequeños, el lugar más adecuado para aplicar el parche es la parte superior de la espalda, con el fin de minimizar el riesgo de que el niño se quite el parche.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, resina de colofonia (hidrogenada), soja, cacahuetes o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Dolor agudo o postoperatorio, porque no hay posibilidad de

ajustar la dosis durante el uso corto plazo y porque se podría causar hipoventilación grave, la cual podría poner en peligro la vida del paciente. Depresión respiratoria grave.

Observaciones

No se deben usar en ninguna situación parches que estén cortados, divididos o dañados. Los parches pueden mostrar ocasionalmente cristalización (estructuras blancas en los bordes y/o en la superficie de la matriz). La presencia de cristales no afectará al funcionamiento del parche. No toque la cara adhesiva del parche ni los cristales.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FENTANILO MATRIX SANDOZ 25 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 5 parches

Principio activo: FENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AB-OPIOIDES: DERIVADOS DE FENILPIPERIDINA

Forma farmacéutica: PARCHES

Vías de administración

TD: TRANSDERMICA

Los parches de Fentanilo son para uso transdérmico. Se deben aplicar en piel no irritada y no irradiada sobre una superficie plana en el torso o en la parte superior de los brazos. En niños pequeños, el lugar más adecuado para aplicar el parche es la parte superior de la espalda, con el fin de minimizar el riesgo de que el niño se quite el parche.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, resina de colofonia (hidrogenada), soja, cacahuetes o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Dolor agudo o postoperatorio, porque no hay posibilidad de ajustar la dosis durante el uso corto plazo y porque se podría causar hipoventilación grave, la cual podría poner en peligro la vida del paciente. Depresión respiratoria grave.

Observaciones

No se deben usar en ninguna situación parches que estén cortados, divididos o dañados.

Los parches pueden mostrar ocasionalmente cristalización (estructuras blancas en los bordes y/o en la superficie de la matriz). La presencia de cristales no afectará al funcionamiento del parche. No toque la cara adhesiva del parche ni los cristales.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FENTANILO MATRIX SANDOZ 50 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 5 parches

Principio activo: FENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AB-OPIOIDES: DERIVADOS DE FENILPIPERIDINA

Forma farmacéutica: PARCHES

Vías de administración

TD: TRANSDERMICA

Los parches de Fentanilo son para uso transdérmico. Se deben aplicar en piel no irritada y no irradiada sobre una superficie plana en el torso o en la parte superior de los brazos. En niños pequeños, el lugar más adecuado para aplicar el parche es la parte superior de la espalda, con el fin de minimizar el riesgo de que el niño se quite el parche.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, resina de colofonia (hidrogenada), soja, cacahuetes o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Dolor agudo o postoperatorio, porque no hay posibilidad de ajustar la dosis durante el uso corto plazo y porque se podría causar hipoventilación grave, la cual podría poner en peligro la vida del paciente. Depresión respiratoria grave.

Observaciones

No se deben usar en ninguna situación parches que estén cortados, divididos o dañados. Los parches pueden mostrar ocasionalmente cristalización (estructuras blancas en los bordes y/o en la superficie de la matriz). La presencia de cristales no afectará al funcionamiento del parche. No toque la cara adhesiva del parche ni los cristales.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FENTANILO MATRIX SANDOZ 75 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 5 parches

Principio activo: FENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AB-OPIOIDES: DERIVADOS DE FENILPIPERIDINA

Forma farmacéutica: PARCHES

Vías de administración

TD: TRANSDERMICA

Los parches de Fentanilo son para uso transdérmico. Se deben aplicar en piel no irritada y no irradiada sobre una superficie plana en el torso o en la parte superior de los brazos. En niños pequeños, el lugar más adecuado para aplicar el parche es la parte superior de la espalda, con el fin de minimizar el riesgo de que el niño se quite el parche.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, resina de colofonia (hidrogenada), soja, cacahuetes o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Dolor agudo o postoperatorio, porque no hay posibilidad de ajustar la dosis durante el uso corto plazo y porque se podría causar hipoventilación grave, la cual podría poner en peligro la vida del paciente. Depresión respiratoria grave.

Observaciones

No se deben usar en ninguna situación parches que estén cortados, divididos o dañados. Los parches pueden mostrar ocasionalmente cristalización (estructuras blancas en los bordes y/o en la superficie de la matriz). La presencia de cristales no afectará al funcionamiento del parche. No toque la cara adhesiva del parche ni los cristales.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FLUDARABINA,FOSFATO

FLUDARABINA TEVA 25 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION O INYECCION EFG, 1 vial de 2 ml

Principio activo: FLUDARABINA,FOSFATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BB-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PURINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Alteración de la función renal con aclaramiento de creatinina < 30 ml/min. Anemia hemolítica descompensada. Lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FLUOROURACILO

FLUOROURACILO ACCORD 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 100 ml

Principio activo: FLUOROURACILO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

El fluorouracilo está contraindicado en pacientes que: Tiene hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Padecen infecciones potencialmente graves (p. ej. herpes zóster, varicela) Están gravemente debilitados Padecen depresión de la médula ósea tras la radioterapia o el tratamiento con otros antineoplásicos Tratamiento de neoplasias no malignas Tienen insuficiencia hepática grave Se han tratado con con brivudina, sorivudina o sus análogos químicamente relacionados, que son potentes inhibidores de la enzima que metaboliza el 5-FU, la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) (ver sección 4.5). El fluorouracilo no se debe usar en las 4 semanas siguientes al tratamiento con brivudina, sorivudina o sus análogos químicamente relacionados. Fluorouracilo (5-FU) no debe administrarse a pacientes homocigotos para dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD). Están en periodo de lactancia (ver sección 4.6). Tienen deficiencia completa conocida de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FONDAPARINUX

ARIXTRA 2,5 MG/0,5 ML SOLUCION INYECTABLE, JERINGA PRECARGADA, 10 jeringas precargadas de 0,5 ml

Principio activo: FONDAPARINUX

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AX-OTROS ANTITROMBÓTICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Fondaparinux se administra por inyección subcutánea profunda mientras el paciente está recostado.

Contraindicaciones

hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
hemorragia significativa, clínicamente activa endocarditis bacteriana aguda - insuficiencia renal grave, definida por un aclaramiento de creatinina < 20 ml/min.

Observaciones

Fondaparinux sólo puede administrarse por vía subcutánea. No debe administrarse por vía intramuscular.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FOSTAMATINIB

TAVLESSE 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: FOSTAMATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XE-INHIBIDORES DIRECTOS DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos deben tomarse dos veces al día, enteros, con o sin alimentos. En caso de molestias gástricas, los comprimidos pueden tomarse con alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TAVLESSE 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: FOSTAMATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XE-INHIBIDORES DIRECTOS DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos deben tomarse dos veces al día, enteros, con o sin alimentos. En caso de molestias gástricas, los comprimidos pueden tomarse con alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FRUQUINTINIB

FRUZAQLA 1 MG CAPSULAS DURAS, 21 cápsulas

Principio activo: FRUQUINTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EK-INHIBIDORES DEL RECEPTOR DE LA TIROSINA QUINASA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas pueden tomarse con o sin alimentos y deben tragarse enteras.

No se debe masticar, disolver ni abrir las cápsulas, ya que se desconocen los posibles efectos de estas alteraciones.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FRUZAQLA 5 MG CAPSULAS DURAS, 21 cápsulas

Principio activo: FRUQUINTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EK-INHIBIDORES DEL RECEPTOR DE LA TIROSINA QUINASA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas pueden tomarse con o sin alimentos y deben tragarse enteras.

No se debe masticar, disolver ni abrir las cápsulas, ya que se desconocen los posibles efectos de estas alteraciones.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GEFITINIB

IRESSA 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: GEFITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EB-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El comprimido de Gefitinib se puede tomar vía oral con o sin alimentos, aproximadamente a la misma hora cada día. El comprimido puede ser tragado entero con agua o si la administración de los comprimidos enteros no es posible, pueden ser administrados como una dispersión en agua (no carbonatada). No deben usarse otros líquidos. Sin triturarlo, se debe echar el comprimido en medio vaso de agua. Se debe remover el vaso de vez en cuando, hasta que el comprimido se disperse (esto puede llevar hasta 20 minutos). Se debe beber inmediatamente después de que se haya completado la dispersión (es decir, en 60 minutos). El vaso se debe enjuagar con medio vaso de agua, que debe beberse también. La dispersión puede ser administrada también a través de sonda nasogástrica o de gastrostomía.

Si se olvida una dosis, debe tomarse tan pronto como el paciente se acuerde. Si hasta la siguiente dosis existe un periodo menor de 12 horas, el paciente no debe tomar la dosis olvidada. Los pacientes no deben tomar una dosis doble (dos dosis al mismo tiempo) para compensar la dosis olvidada.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GEMCITABINA

GEMCITABINA AUROVITAS SPAIN 1000 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 25 ml

Principio activo: GEMCITABINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de sus excipientes incluidos en la sección 6.1.
Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GEMCITABINA HOSPIRA 2000 mg CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 1 vial de 52,6 ml

Principio activo: GEMCITABINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GEMTUZUMAB

MYLOTARG 5 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: GEMTUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GILTERITINIB

XOSPATA 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 84 comprimidos

Principio activo: GILTERITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos se pueden tomar con o sin alimentos. Se deben tragar enteros con agua y no se deben partir ni triturar. Debe administrarse a la misma hora cada día. Si se olvida una dosis o no se toma a la hora habitual, se debe administrar lo antes posible el mismo día, y los pacientes deben volver al horario normal al día siguiente. Si el paciente vomita después de la administración de la dosis, no debe tomar otra dosis, sino continuar con el horario normal al día siguiente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GLIBENCLAMIDA

DAONIL 5 mg COMPRIMIDOS , 100 comprimidos

Principio activo: GLIBENCLAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: A10BB-ANTIDIABÉTICOS ORALES: SULFONILUREAS NO HETEROCÍCLICAS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos deben ingerirse con un vaso de agua, en una única toma por la mañana, con el desayuno o la primera comida abundante del día.

Se deben tener en cuenta los hábitos del paciente para recomendar la hora de toma del medicamento. El paciente debe seguir el horario de comidas establecido, una vez administrados los comprimidos. No se aconseja administrar más de 10 mg por toma, por lo que en pacientes que precisen mayor dosis se recomienda dividir la dosis en dos tomas, una toma con la primera comida abundante y la dosis restante, con la cena. El olvido de una dosis no se debe compensar incrementando la dosis siguiente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la glibenclamida, a otras sulfonilureas, a otros derivados de sulfonamida (sulfamidas, tiazidas) o alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Diabetes tipo 1. Cetoacidosis diabética. Precoma y coma diabético. Insuficiencia renal o hepática grave:

- en estos casos, se recomienda utilizar insulina.
- Porfiria asociada a otras sulfonilureas.
- Embarazo y Lactancia (ver sección 4.6).
- Tratamiento con bosentan (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GLICLAZIDA

DIAMICRON 30 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICADA, 100 comprimidos

Principio activo: GLICLAZIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: A10BB-ANTIDIABÉTICOS ORALES: SULFONILUREAS NO HETEROCÍCLICAS
Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis diaria puede variar de 1 a 4 comprimidos al día, es decir, de 30 a 120 mg por vía oral en una única toma con el desayuno. Se recomienda que el comprimido(s) se trague entero.

Si se olvida una dosis, no se debe aumentar la dosis del día siguiente.

Contraindicaciones

Este medicamento está contraindicado en caso de: Hipersensibilidad a gliclazida o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, o a otras sulfonilureas o a las sulfamidas; Diabetes tipo 1; Precoma y coma diabético, cetoacidosis diabética, Insuficiencia renal o hepática grave: en estos casos, se recomienda utilizar insulina, Tratamiento con miconazol (ver sección 4.5), Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

La dosis diaria máxima recomendada es de 120 mg.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

GLOFITAMAB

COLUMVI 10 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml

Principio activo: GLOFITAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a obinutuzumab, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Para obtener información sobre contraindicaciones específicas en obinutuzumab, consulte su ficha técnica.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

COLUMVI 2,5 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 2,5 ml

Principio activo: GLOFITAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a obinutuzumab, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Para obtener información sobre contraindicaciones específicas en obinutuzumab, consulte su ficha técnica.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HEPARINA

HEPARINA SODICA ROVI 1000 UI/ml SOLUCIÓN INYECTABLE , 100 viales de 5 ml

Principio activo: HEPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV-SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La Heparina Sódica puede ser administrada por vía intravenosa (infusión continua o inyección intermitente), intraarterial, o subcutánea. Debe evitarse la administración intramuscular, por el riesgo de hematomas locales.

SC: SUBCUTANEA

Administración subcutánea con inyección profunda.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la heparina, a sustancias de origen porcino, o alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (ver sección 4.4). Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Trastorno grave de la función hepática o pancreática. Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. Endocarditis bacteriana aguda. Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.:

- úlcera péptica activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales).
- En pacientes que reciban heparina con fines de tratamiento y no de profilaxis, está contraindicada la utilización de anestesia regional en las intervenciones quirúrgicas programadas.
- Prematuros y recién nacidos, por contener alcohol bencílico.

Observaciones

Cada vial de Heparina Sódica contiene Alcohol Bencílico. La heparina sódica no debe mezclarse con otras soluciones para inyección y/o infusión. En la prevención de la trombosis durante la hemodiálisis se administrará Heparina Sódica en bolus en el botón arterial del circuito de hemodiálisis. Administrar las infusiones intravenosas de Heparina utilizando una bomba de infusión inteligente con software de reducción de errores de dosis. Realizar un doble chequeo independiente de la programación.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HEPARINA SODICA SALA 5000 UI/ml , 100 viales de 5 ml

Principio activo: HEPARINA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AB-ANTITROMBÓTICOS: HEPARINA Y DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV-SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La Heparina Sódica puede ser administrada por vía intravenosa (infusión continua o inyección intermitente), intraarterial, o subcutánea. Debe evitarse la administración intramuscular, por el riesgo de hematomas locales.

SC: SUBCUTANEA

Administración subcutánea con inyección profunda.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a la heparina, a sustancias de origen porcino, o a cualquiera de los componentes de la especialidad. - Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. - Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. - Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (ver 4.4:
- Advertencias y precauciones especiales de empleo).
- - Trastorno grave de la función hepática o pancreática.
- - Endocarditis.
- - Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos u oídos.
- - Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.: úlcera péptica activa, aneurismas, accidente cerebrovascular hemorrágico o neoplasias cerebrales) - En pacientes que reciban heparina con fines de tratamiento y no de profilaxis, está contraindicada la utilización de anestesia regional en las intervenciones quirúrgicas programadas.

Observaciones

Cada vial de Heparina Sódica contiene Alcohol Bencílico. La Heparina Sódica no debe mezclarse con otras soluciones para inyección y/o infusión. En la prevención de la trombosis durante la hemodiálisis se administrará Heparina Sódica en bolus en el botón arterial del circuito de hemodiálisis. Administrar las infusiones intravenosas de Heparina utilizando una bomba de infusión inteligente con software de reducción de errores de dosis. Realizar un doble chequeo independiente de la programación.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HIDROXICARBAMIDA

HYDREA 500 mg CAPSULAS DURAS, 20 cápsulas

Principio activo: HIDROXICARBAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Si el paciente no está en condiciones de tragar la cápsula, o si así lo prefiere, el contenido de la misma puede dispersarse en un vaso de agua y tomarse inmediatamente. Es normal que algunos excipientes no solubles queden en la superficie.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hidroxicarbamida también está contraindicado durante el embarazo y el periodo de lactancia (ver sección 4.6). Hidroxicarbamida está contraindicado en pacientes con depresión de la médula ósea, como leucopenia (<2.500 leucocitos/mm³), trombocitopenia (<100.000 /mm³) o anemia grave. No deberá administrarse este medicamento a pacientes que hayan tenido historia previa o actualmente presenten úlceras cutáneas y/o úlceras vasculíticas asociadas con el uso de hidroxicarbamida o interferón alfa (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IBRUTINIB

IMBRUVICA 140 MG CAPSULAS DURAS, 90 cápsulas

Principio activo: IBRUTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EL-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DE BRUTON (BTK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Debe administrarse por vía oral una vez al día con un vaso de agua, aproximadamente a la misma hora cada día. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y no se deben abrir, romper ni masticar. No se debe tomar con zumo de pomelo o naranjas amargas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. En los pacientes tratados con IMBRUVICA está contraindicado el uso de preparados que contengan la Hierba de San Juan o hipérico.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IMBRUVICA 420 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: IBRUTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EL-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DE BRUTON (BTK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Debe administrarse por vía oral una vez al día con un vaso de agua, aproximadamente a la misma hora

cada día. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y no se deben abrir, romper ni masticar. No se debe tomar con zumo de pomelo o naranjas amargas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. En los pacientes tratados con IMBRUVICA está contraindicado el uso de preparados que contengan la Hierba de San Juan o hipérico.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IMBRUVICA 560 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: IBRUTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EL-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DE BRUTON (BTK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Debe administrarse por vía oral una vez al día con un vaso de agua, aproximadamente a la misma hora cada día. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y no se deben abrir, romper ni masticar. No se debe tomar con zumo de pomelo o naranjas amargas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. En los pacientes tratados con IMBRUVICA está contraindicado el uso de preparados que contengan la Hierba de San Juan o hipérico.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IDARUBICINA

IDARUBICINA SANDOZ 1 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN , 1 vial de 5 ml

Principio activo: IDARUBICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo, a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, , otras antraciclina s o antracenodionas. - Insuficiencia hepática grave. - Insuficiencia renal grave. - Infecciones no controladas. - Cardiomiopatía grave. - Enfermedad inflamatoria aguda de miocardio. - Insuficiencia miocárdica grave. - Infarto de miocardio reciente. - Arritmias graves. - Mielosupresión persistente. - Tratamiento previo con dosis acumulativas máximas de idarubicina hidroc loruro y/o otras antraciclina s y antracenodionas (ver sección 4.4). - Diátesis hemorrágica. - Estomatitis. - Lactancia (ver sección 4.6). - Combinación con la vacuna de la fiebre amarilla.

Observaciones

No se recomienda la administración por inyección directa debido al riesgo de extravasación que incluso puede tener lugar aunque haya un retorno adecuado de la sangre mediante la aspiración de la aguja. La esclerosis venosa puede originarse por inyecciones en venas pequeñas o por inyecciones repetidas en la misma vena.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ZAVEDOS 1MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml

Principio activo: IDARUBICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a cualquier otra antraciclina o antracenodiona o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Insuficiencia hepática y/o renal grave. Infecciones no controladas. Miocardiopatías graves, arritmias graves o si se ha padecido recientemente un infarto miocárdico. Mielosupresión persistente. Tratamiento previo con dosis acumulativas máximas de hidrocortisona de idarubicina y/o otras antraciclinas y antracenodionas (ver sección 4.4). Se debe suprimir la lactancia en madres que estén siendo tratadas con Zavedos (ver sección 4.6).

Observaciones

No se recomienda la administración por inyección directa debido al riesgo de extravasación que incluso puede tener lugar aunque haya un retorno adecuado de la sangre mediante la aspiración de la aguja. La esclerosis venosa puede originarse por inyecciones en venas pequeñas o por inyecciones repetidas en la misma vena.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IFOSFAMIDA

TRONOXAL 1.000 MG POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, 1 vial

Principio activo: IFOSFAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AA-AGENTES ALQUILANTES: MOSTAZAS NITROGENADAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Tronoxal está contraindicado en los casos siguientes: Hipersensibilidad al principio activo. función gravemente alterada de la médula ósea (especialmente en pacientes tratados previamente con radioterapia o agentes citotóxicos) inflamación de la vejiga urinaria (cistitis) insuficiencia renal y/u obstrucciones en el flujo urinario infecciones activas embarazo y lactancia (ver sección 4.6)

Observaciones

Ifosfamida a dosis altas se debe utilizar en combinación con Mesna, como medida profiláctica de la cistitis hemorrágica.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IMATINIB MESYLATO

IMATINIB SANDOZ 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos (Blister PVC/PE/PVDC/AL)

Principio activo: IMATINIB MESYLATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis prescrita debe ser administrada oralmente con alimentos y con un gran vaso de agua para minimizar el riesgo de irritaciones gastrointestinales. Dosis de 400 mg ó 600 mg se deben administrar una vez al día, mientras que una dosis diaria de 800 mg se debe administrar en dosis de 400 mg dos veces al día, por la mañana y por la noche.

Para los pacientes incapaces de tragar los comprimidos, éstos se pueden dispersar en un vaso de agua sin gas o de zumo de manzana. La cantidad requerida de comprimidos se debe colocar en un volumen adecuado de bebida (aproximadamente 50 ml para un comprimido de 100 mg) y removerse con una cuchara. Se debe administrar la suspensión inmediatamente después de la disgregación completa del comprimido.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IMATINIB SANDOZ 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos

Principio activo: IMATINIB MESYLATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis prescrita debe ser administrada oralmente con alimentos y con un gran vaso de agua para minimizar el riesgo de irritaciones gastrointestinales. Dosis de 400 mg ó 600 mg se deben administrar una vez al día, mientras que una dosis diaria de 800 mg se debe administrar en dosis de 400 mg dos veces al día, por la mañana y por la noche.

Para los pacientes incapaces de tragar los comprimidos, éstos se pueden dispersar en un vaso de agua sin gas o de zumo de manzana. La cantidad requerida de comprimidos se debe colocar en un volumen adecuado de bebida (aproximadamente 200 ml para un comprimido de 400 mg) y removerse con una cuchara. Se debe administrar la suspensión inmediatamente después de la disgregación completa del comprimido.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INOTUZUMAB OZOGAMICINA

BESPONSA 1 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: INOTUZUMAB OZOGAMICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FB-INHIBIDORES DE CD22 (GRUPOS DE DIFERENCIACIÓN 22)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con enfermedad venooclusiva hepática o síndrome de obstrucción sinusoidal (EVO/SOS) grave, de forma previa o en la actualidad. Pacientes con enfermedad hepática grave en curso (por ejemplo, cirrosis, hiperplasia nodular regenerativa, hepatitis activa).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA ASPART

NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ML SOLUCION INYECTABLE EN UNA PLUMA PRECARGADA, 5 plumas precargadas de 3 ml

Principio activo: INSULINA ASPART

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AB-ANTIDIABÉTICOS: INSULINA Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN RÁPIDA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Insulina Aspart (NovoRapid Flexpen) se administra por vía subcutánea mediante inyección en la pared abdominal, el muslo, la zona superior del brazo o la región deltoidea o glútea. Los puntos de inyección siempre deben rotarse dentro de la misma región para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea. Inicio a los 10–20 minutos de la inyección, efecto máximo entre 1 y 3 horas y duración de acción de 3 a 5 horas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes (ver sección 6.1).

Observaciones

NovoRapid FlexPen solo está indicado para inyecciones subcutáneas. Si es necesaria la administración con jeringa o inyección intravenosa, se debe utilizar un vial.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA ASPARTICA/ INSUL ASPAR PROTAMIN

NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 U/ML SUSPENSION INYECTABLE EN UNA PLUMA PRECARGADA, 5 plumas precargadas de 3 ml

Principio activo: INSULINA ASPARTICA/ INSUL ASPAR PROTAMIN

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AD-ASOC DE INSULINAS Y ANÁLOGOS ACCIÓN RÁPIDA E INTERMEDIA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

NovoMix 30 es una suspensión bifásica del análogo de la Insulina Aspart de acción rápida y de acción intermedia en la proporción 30/70. Sólo se debe administrar por vía subcutánea en el muslo o en la pared abdominal y también en la región deltoidea o glútea. Los lugares de inyección siempre deben rotarse dentro de la misma zona con el fin de reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

NovoMix 30 no debe administrarse por vía intravenosa, ya que puede provocar una hipoglucemia grave. Se debe evitar la administración intramuscular y no se puede utilizar en bombas de infusión de insulina.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA DEGLUDEC

TRESIBA 100 UNIDADES/ML FLEXTOUCH SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 5 plumas precargadas de 3 ml

Principio activo: INSULINA DEGLUDEC

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AE-ANTIDIABÉTICOS: INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN PROLONGADA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Insulina Degludec es un análogo de la Insulina de acción prolongada. Se administra sólo por vía subcutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

La Insulina Degludec no se debe administrar por vía intravenosa ni por vía intramuscular ya que puede cambiar la absorción. Este medicamento no debe utilizarse en bombas de perfusión de insulina.

Para evitar errores de dosificación y sobredosis potenciales, no se debe utilizar nunca una jeringa para extraer el contenido de la Insulina Degludec de la pluma precargada.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA GLARGINA

ABASAGLAR 100 UNIDADES/ML KWIKPEN SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA 5 plumas precargadas de 3 ml

Principio activo: INSULINA GLARGINA

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AE-ANTIDIABÉTICOS: INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN PROLONGADA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Insulina Glargina es un análogo de la insulina con una duración de acción prolongada. Se administra solo por vía subcutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

La Insulina Glargina no se debe administrar por vía intravenosa y no debe mezclarse con ninguna otra insulina ni debe diluirse. Su mezcla o dilución pueden modificar su perfil de acción/tiempo y la mezcla puede provocar su precipitación.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LANTUS 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE EN UN VIAL, 1 vial de 10 ml

Principio activo: INSULINA GLARGINA

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AE-ANTIDIABÉTICOS: INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN PROLONGADA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración**SC: SUBCUTANEA**

La Insulina Glargina es un análogo de la Insulina con una duración de acción prolongada. Se administra sólo por vía subcutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

La Insulina Glargina no se debe administrar por vía intravenosa y no debe mezclarse con ninguna otra insulina ni debe diluirse. Su mezcla o dilución pueden modificar su perfil de acción/tiempo y la mezcla puede provocar su precipitación.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA GLARGINA 300UI/ML CONCENTRADA

TOUJEO 300 UNIDADES/ML SOLOSTAR SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 3 plumas 1,5 ml

Principio activo: INSULINA GLARGINA 300UI/ML CONCENTRADA

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AE-ANTIDIABÉTICOS: INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN PROLONGADA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Insulina Glargina es un análogo de la insulina con una duración de acción prolongada. Se administra sólo por vía subcutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

La Insulina Glargina no se debe administrar por vía intravenosa y no debe mezclarse con ninguna otra insulina ni debe diluirse. Su mezcla o dilución pueden modificar su perfil de acción/tiempo y la mezcla puede provocar su precipitación.

Para evitar errores de dosificación y sobredosis potenciales, no se debe utilizar nunca una jeringa para extraer el contenido de la Insulina Glargina 300 Unidades/mL de la pluma precargada.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA GLULISINA

APIDRA 100 UNIDADES/ML, SOLOSTAR SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 5 plumas precargadas de 3 ml

Principio activo: INSULINA GLULISINA

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AB-ANTIDIABÉTICOS: INSULINA Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN RÁPIDA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Insulina Glulisina es un análogo de Insulina de acción rápida en pluma precargada (Apidra SoloStar) y sólo está indicada para inyecciones subcutáneas en la pared abdominal, muslo o deltoide. Deben alternarse de una inyección a otra para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipoglucemia.

Observaciones

La Insulina Glulisina se puede administración con jeringa, inyección intravenosa o bomba de perfusión continua subcutánea pero se debe utilizar un vial no la pluma precargada.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA ISOFANICA

INSULATARD 100 UI/ml SUSPENSION INYECTABLE EN VIAL 1 vial de 10 ml

Principio activo: INSULINA ISOFANICA

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AC-ANTIDIABÉTICOS: INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN INTERMEDIA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Insulina NPH Isofánica es un análogo de la Insulina de acción intermedia que se administra por vía subcutánea mediante una inyección en el muslo, la pared abdominal, la región glútea o la región deltoidea. Los puntos de inyección siempre deben rotarse dentro de la misma región para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Las suspensiones de Insulina NPH Isofánica no se deben administrar nunca por vía intravenosa ni en bombas de perfusión de Insulina.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULATARD FLEXPEN 100 UI/ml SUSPENSION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA 5 plumas precargadas de 3 ml

Principio activo: INSULINA ISOFANICA

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AC-ANTIDIABÉTICOS: INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN INTERMEDIA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Insulina NPH Isofánica es un análogo de la Insulina de acción intermedia en pluma precargada (Insulatard FlexPen) que se administra por vía subcutánea mediante una inyección en el muslo, la pared abdominal, la región glútea o la región deltoidea. Los puntos de inyección siempre deben rotarse dentro de la misma región para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Las suspensiones de Insulina NPH Isofánica no se deben administrar nunca por vía intravenosa ni en bombas de perfusión de Insulina.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA LISPRO

HUMALOG 100 U/ml, SOLUCION INYECTABLE EN VIALES, 1 vial de 10 ml

Principio activo: INSULINA LISPRO

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AB-ANTIDIABÉTICOS: INSULINA Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN RÁPIDA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La inyección intravenosa de Insulina Lispro en bolo intravenoso o mediante un sistema de perfusión.

SC: SUBCUTANEA

La Insulina Lispro es un análogo de Insulina de acción rápida en vial y se administra en inyecciones subcutáneas en la zona superior de los brazos, muslos, nalgas o abdomen. Deben alternarse de una inyección a otra para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea.

También se utiliza el vial en bomba de perfusión subcutánea continua.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipoglucemia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HUMALOG JUNIOR KWIKPEN 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 5 plumas precargadas de 3 ml

Principio activo: INSULINA LISPRO

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AB-ANTIDIABÉTICOS: INSULINA Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN RÁPIDA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Insulina Lispro es un análogo de Insulina de acción rápida en pluma precargada (Humalog Junior Kwikpen) y sólo está indicada para inyecciones subcutáneas en la zona superior de los brazos, muslos, nalgas o abdomen. Deben alternarse de una inyección a otra para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipoglucemia.

Observaciones

La Insulina Lispro se puede administración con jeringa, inyección intravenosa o bomba de perfusión subcutánea continua pero se debe utilizar un vial no la pluma precargada.

La Insulina Lispro (Humalog Junior KwikPen) administra de 0,5 a 30 unidades en incrementos de 0,5 unidades en una única inyección.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HUMALOG KWIKPEN 100 U/ml, SOLUCION INYECTABLE, 5 plumas precargadas de 3 ml

Principio activo: INSULINA LISPRO

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AB-ANTIDIABÉTICOS: INSULINA Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN RÁPIDA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La Insulina Lispro es un análogo de Insulina de acción rápida en pluma precargada (Humalog Kwikpen) y sólo está indicada para inyecciones subcutáneas en la zona superior de los brazos, muslos, nalgas o abdomen. Deben alternarse de una inyección a otra para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipoglucemia.

Observaciones

La Insulina Lispro se puede administración con jeringa, inyección intravenosa o bomba de perfusión subcutánea continua pero se debe utilizar un vial no la pluma precargada.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA REGULAR

ACTRAPID 100 UI/ML SOLUCION INYECTABLE EN UN VIAL, 1 vial de 10 ml

Principio activo: INSULINA REGULAR

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AB-ANTIDIABÉTICOS: INSULINA Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN RÁPIDA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

100 UI en 100 mL SF

Concentración total: 100 UI en 100 mL.

UNIDADES: mL/h

Conservación: 2-8 °C

SC: SUBCUTANEA

Se administra por vía subcutánea mediante una inyección en la pared abdominal, el muslo, la región glútea o la región deltoidea. Los puntos de inyección siempre deben rotarse dentro de la misma región para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea. La inyección en un pliegue de la piel minimiza el riesgo de inyección intramuscular no intencionada.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Conservación: 2-8 °C. En tratamiento de Hiperkalemia se diluye en SG 10%.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

INSULINA REGULAR/INSULINA ISOFANICA

MIXTARD 30 INNOLET 100 UI/ml SUSPENSION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 5 plumas precargadas de 3 ml

Principio activo: INSULINA REGULAR/INSULINA ISOFANICA

Datos generales

Grupo terapéutico: A10AD-ASOC DE INSULINAS Y ANÁLOGOS ACCIÓN RÁPIDA E INTERMEDIA

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Mixtard 30 Innolet es una suspensión bifásica de la Insulina Regular y Insulina Isofánica que es un análogo de acción intermedia en la proporción 30/70. Sólo se debe administrar por vía subcutánea en el muslo, la pared abdominal, la región glútea o la región deltoidea. Los puntos de inyección siempre deben rotarse dentro de la misma región para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Las suspensiones de Insulina Regular/Isofánica no se deben administrar nunca por vía intravenosa ni en bombas de perfusión de insulina.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IPILIMUMAB

YERVOY 5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION 1 vial de 10 ml

Principio activo: IPILIMUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS
INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

YERVOY 5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 40 ml

Principio activo: IPILIMUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IRINOTECAN

IRINOTECAN AUROVITAS 20 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 1 vial de 25 ml

Principio activo: IRINOTECAN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CE-INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA 1 (TOP1)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Enfermedad intestinal inflamatoria crónica y/u obstrucción intestinal (ver sección 4.4). - Lactancia (ver secciones 4.4 y 4.6). - Nivel de bilirrubina > 3 veces el límite superior del rango normal (ver sección 4.4). - Insuficiencia grave de la médula ósea. - Estado general de la OMS >2. - Uso concomitante con Hierba de San Juan (ver sección 4.5). - Vacunas vivas atenuadas (ver sección 4.5). Para contraindicaciones adicionales de cetuximab o bevacizumab o capecitabina, consultar las fichas técnicas de estos medicamentos.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 5 ml

Principio activo: IRINOTECAN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CE-INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA 1 (TOP1)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Enfermedad inflamatoria crónica del intestino y/o obstrucción intestinal (ver sección 4.4). Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver secciones 4.4 y 4.6). Nivel de bilirrubina > 3 veces el límite superior del rango normal (ver sección 4.4). Pacientes con insuficiencia grave de la médula ósea. Pacientes con estado general de la O.M.S. > 2. Uso concomitante con hierba de San Juan (ver sección 4.5) Vacunas vivas atenuadas (ver sección 4.5). En caso de contraindicaciones adicionales de cetuximab, bevacizumab o capecitabina consultar las fichas técnicas de estos medicamentos.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IRINOTECAN LIPOSOMAL**ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML CONCENTRADO PARA DISPERSION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml**

Principio activo: IRINOTECAN LIPOSOMAL

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CE-INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA 1 (TOP1)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración**IV: INTRAVENOSA**

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Antecedentes de hipersensibilidad grave al irinotecán o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ISATUXIMAB

SARCLISA 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION 1 vial de 25 ml

Principio activo: ISATUXIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FC-INHIBIDORES DE CD38 (GRUPOS DE DIFERENCIACIÓN 38)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ISOFLURANO

SEDACONDA 100 % LIQUIDO PARA INHALACION DEL VAPOR, 6 frascos de 250 ml

Principio activo: ISOFLURANO

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AB-ANESTÉSICOS GENERALES: HIDROCARBUROS HALOGENADOS

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN PARA INHALA

Vías de administración

IH: INHALATORIA

El Isoflurano es para vía inhalatoria y solo se debe administrar mediante el dispositivo de administración Sedaconda ACD y la jeringa Sedaconda, cargada utilizando el Adaptador de Llenado Sedaconda.

Contraindicaciones

Sedaconda está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al isoflurano o a otros agentes anestésicos halogenados volátiles. También está contraindicado en pacientes con susceptibilidad genética conocida o sospechada a la hipertermia maligna.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ISOPRENALINA

ALEUDRINA 0,2 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE, 6 ampollas de 1 ml

Principio activo: ISOPRENALINA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CA-ESTIMULANTES CARDÍACOS: ADRENÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

1,2 mg en 94 mL SG5%

Concentración total: 1,2 mg en 100 mL.

UNIDADES: mL/h

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a isoprenalina o a alguno de los excipientes de este medicamento. Hipertiroidismo. Angina de pecho. Arritmias cardíacas taquicardizantes. Cardiopatía descompensada. Estenosis aórtica. Infarto de miocardio reciente. Taquicardia o bloqueo cardíaco inducido por digitálicos. Debido al riesgo de arritmias, no debe usarse Aleudrina con otros agonistas beta-1 potentes como la adrenalina (ver sección 4.5).

Observaciones

Conservación: 2-8 °C. Ritmo de perfusión a demanda clínica.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IVOSIDENIB

TIBSOVO 250 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: IVOSIDENIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XM-INHIBIDORES DE LA ISOCITRATO DESHIDROGENASA (IDH)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos se toman una vez al día aproximadamente a la misma hora. Los pacientes no deben comer nada durante 2 horas antes y 1 hora después de tomar los comprimidos. Se deben tragar enteros con agua. Se debe aconsejar a los pacientes que eviten el pomelo y el zumo de pomelo durante el tratamiento.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Administración concomitante con inductores potentes del CYP3A4 o dabigatrán (ver sección 4.5).

Síndrome del QT largo congénito.

Antecedentes familiares de muerte súbita o arritmia ventricular polimórfica.

Intervalo QT/QTc > 500 ms, independientemente del método de corrección (ver secciones 4.2 y 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

KETAMINA

KETOLAR 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 1 vial de 10 ml

Principio activo: KETAMINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AX-OTROS ANESTÉSICOS GENERALES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

Según Protocolos de Anestesia.

IV: INTRAVENOSA

Según Protocolos de Anestesia.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes en los que la elevación de la presión sanguínea pueda constituir un serio peligro (ver sección 4.4). Pacientes con eclampsia o pre-eclampsia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LABETALOL

TRANDATE 5 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE, 5 ampollas de 20 ml

Principio activo: LABETALOL

Datos generales

Grupo terapéutico: C07AG-ALFA Y BETA-BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Inyección intravenosa directa: Si es esencial reducir la presión sanguínea rápidamente, deberá administrarse una dosis de 50 mg mediante inyección intravenosa durante al menos un minuto y repetir, si fuera necesario, a intervalos de 5 minutos hasta que se produzca una respuesta satisfactoria. La dosis total no debe exceder de 200 mg.

Perfusión Continua Hospitalaria:

500 mg en 400 mL

Concentración total: 500 mg en 500 mL.

UNIDADES: mL/h Rango: 20 - 160.

Perfusión Continua Hospitalaria:

300 mg en 40 mL

Concentración total: 300 mg en 100 mL.

UNIDADES: mL/h Rango: 20 - 160.

Contraindicaciones

Trandate está contraindicado en bloqueo A-V de segundo o tercer grado, shock cardiogénico y otros estados asociados a hipotensión prolongada y grave o a bradicardia grave. Los beta-bloqueantes, aun aquéllos con aparente cardioselectividad, no deberán utilizarse en pacientes con asma o historia de obstrucción de las vías respiratorias. El Labetalol está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco. Trandate inyectable está contraindicado para controlar episodios hipertensivos tras infarto agudo de miocardio, cuando existe vasoconstricción periférica que sugiere bajo gasto cardíaco.

Observaciones

Conservación a temperatura ambiente. Estabilidad: 24 h.

Los pacientes deben recibir el fármaco estando siempre en posición supina o lateral izquierda. Evitar levantar al paciente antes de que transcurran 3 horas ya que puede aparecer una hipotensión postural excesiva.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LANDIOLOL

RAPIBLOC 300 MG POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: LANDIOLOL

Datos generales

Grupo terapéutico: C07AB-BETA-BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS CARDIOSELECTIVOS, SOLOS.

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Landiolol debe administrarse por vía intravenosa a través de una vía central o periférica y no debe administrarse a través de la misma vía intravenosa que otros medicamentos (ver sección 6.6).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Bradicardia grave (menos de 50 latidos por minuto) Síndrome del seno enfermo sin marcapasos
Trastornos graves de la conductancia del nódulo auriculoventricular (AV) (sin marcapasos): Bloqueo AV de segundo o tercer grado Choque cardiogénico Hipotensión grave Insuficiencia cardíaca descompensada cuando se considera no relacionada con la arritmia Hipertensión pulmonar
Feocromocitoma no tratado Ataque de asma agudo Acidosis metabólica grave e incorregible.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LAPATINIB DITOSILATO MONOHIDRATO

TYVERB 250 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 140 comprimidos

Principio activo: LAPATINIB DITOSILATO MONOHIDRATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EH-INHIBIDORES DEL RECEPTOR 2 DE LA TIROSINA QUINASA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO HUMANO (HER2)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis diaria de Lapatinib no se debe dividir. Debe tomarse por lo menos una hora antes, o una hora después de las comidas. Para minimizar la variabilidad individual de los pacientes, se debe estandarizar la administración en relación a la ingesta de alimentos, por ejemplo, tomar siempre Lapatinib una hora antes de la comida.

Las dosis olvidadas no se deben reemplazar y se debe reanudar el tratamiento con la siguiente dosis diaria programada (ver sección 4.9).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LAROTRECTINIB

VITRAKVI 100 MG CAPSULAS DURAS, 56 cápsulas

Principio activo: LAROTRECTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

El Larotrectinib se presenta en forma de cápsula o solución oral con biodisponibilidad oral equivalente y puede ser utilizada de forma intercambiable. Se debe aconsejar al paciente que trague la cápsula entera con un vaso de agua. Debido a su sabor amargo, la cápsula no se debe abrir, masticar ni triturar.

Las cápsulas se pueden tomar acompañadas o no de alimentos, pero no se deben tomar con pomelo ni zumo de pomelo.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LAZERTINIB

LAZCLUZE 240 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos

Principio activo: LAZERTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EB-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Lazertinib se administra por vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros, con o sin alimentos. No se deben machacar, partir ni masticar.

Si se producen vómitos en cualquier momento después de tomar Lazertinib, la siguiente dosis se debe tomar al día siguiente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LENALIDOMIDA

LENALIDOMIDA AUROVITAS 10 MG CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas

Principio activo: LENALIDOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L04AX-OTROS INMUNOSUPRESORES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Lenalidomida se deben tomar por vía oral aproximadamente a la misma hora en los días programados. Las cápsulas no se deben abrir, romper ni masticar y se deben tomar enteras, preferiblemente con agua, con o sin alimentos.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Mujeres embarazadas.
- Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo (ver las secciones 4.4 y 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LENALIDOMIDA AUROVITAS 15 MG CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas

Principio activo: LENALIDOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L04AX-OTROS INMUNOSUPRESORES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Lenalidomida se deben tomar por vía oral aproximadamente a la misma hora en los días programados. Las cápsulas no se deben abrir, romper ni masticar y se deben tomar enteras, preferiblemente con agua, con o sin alimentos.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Mujeres embarazadas.
- Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo (ver las secciones 4.4 y 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LENALIDOMIDA AUROVITAS 25 MG CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas

Principio activo: LENALIDOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L04AX-OTROS INMUNOSUPRESORES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Lenalidomida se deben tomar por vía oral aproximadamente a la misma hora en los días programados. Las cápsulas no se deben abrir, romper ni masticar y se deben tomar enteras, preferiblemente con agua, con o sin alimentos.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Mujeres embarazadas.
- Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo (ver las secciones 4.4 y 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LENALIDOMIDA AUROVITAS 5 MG CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas

Principio activo: LENALIDOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L04AX-OTROS INMUNOSUPRESORES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Lenalidomida se deben tomar por vía oral aproximadamente a la misma hora en los días programados. Las cápsulas no se deben abrir, romper ni masticar y se deben tomar enteras, preferiblemente con agua, con o sin alimentos.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Mujeres embarazadas.
- Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo (ver las secciones 4.4 y 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LENVATINIB

LENVIMA 10 MG CAPSULAS DURAS 30 cápsulas

Principio activo: LENVATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas se deben tomar todos los días a la misma hora aproximadamente, con o sin alimentos. Los cuidadores no deben abrir la cápsula para evitar la exposición repetida al contenido de la cápsula. Las cápsulas de lenvatinib se pueden tragar enteras con agua o administrar en una suspensión preparada mediante la disolución de las cápsulas enteras en agua, zumo de manzana o leche. La

suspensión se puede administrar por vía oral o a través de una sonda de alimentación. Si se administra mediante una sonda de alimentación, la suspensión debe prepararse con agua.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Si la suspensión de lenvatinib no se utiliza en el momento de la preparación, se debe conservar en un recipiente tapado y refrigerado a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C durante un máximo de 24 horas. Una vez extraída del frigorífico, la suspensión debe agitarse durante 30 segundos aproximadamente antes de su uso. Si no se administra en un período de 24 horas, la suspensión debe desecharse.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LENVIMA 4 MG CAPSULAS DURAS 30 cápsulas

Principio activo: LENVATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas se deben tomar todos los días a la misma hora aproximadamente, con o sin alimentos. Los cuidadores no deben abrir la cápsula para evitar la exposición repetida al contenido de la cápsula. Las cápsulas de lenvatinib se pueden tragar enteras con agua o administrar en una suspensión preparada mediante la disolución de las cápsulas enteras en agua, zumo de manzana o leche. La suspensión se puede administrar por vía oral o a través de una sonda de alimentación. Si se administra mediante una sonda de alimentación, la suspensión debe prepararse con agua.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Si la suspensión de lenvatinib no se utiliza en el momento de la preparación, se debe conservar en un recipiente tapado y refrigerado a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C durante un máximo de 24 horas. Una vez extraída del frigorífico, la suspensión debe agitarse durante 30 segundos aproximadamente antes de su uso. Si no se administra en un período de 24 horas, la suspensión debe desecharse.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LEVOSIMENDAN

LEVOSIMENDAN EVER PHARMA 2,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 5 ml

Principio activo: LEVOSIMENDAN

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CX-OTROS ESTIMULANTES CARDÍACOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Perfusión Continua Hospitalaria:

12,5 mg en 495 mL SG5%

Concentración total: 12,5 mg en 500 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min

Rango: 0,05 - 0,2

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a levosimendán o a cualquiera de los excipientes. Hipotensión grave y taquicardia (ver secciones 4.4 y 5.1). Obstrucciones mecánicas significativas que afecten al llenado o al vaciado ventricular o a ambos. Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30ml/min) e insuficiencia hepática grave. Historia de Torsades de Pointes.

Observaciones

Conservación: 2-8 °C. Duración del tratamiento 24h. Recomendable por vía central pero puede administrarse por periférica.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LOMUSTINA

LOMUSTINA 40 mg caps.

Principio activo: LOMUSTINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AD-AGENTES ALQUILANTES: NITROSOUREAS

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Lomustina cápsulas debe administrarse preferiblemente con el estómago vacío. Se recomienda no ingerir alimentos ni beber líquidos desde una hora antes hasta dos horas después. No administrar con bebidas calientes. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlas. Si tiene dificultad para tragar, puede abrir la cápsula, dispersar el contenido en una pequeña cantidad de zumo de manzana, yogur o helado y administrar inmediatamente.

Mantenga siempre el mismo horario. Se recomienda administrar por la noche.

- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a lomustina, a otros derivados de la nitrosourea o a alguno de los excipientes.

Fuerte reducción de trombocitos y leucocitos.

Insuficiencia renal grave.

Observaciones

<https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682207-es.html>

LORLATINIB

LORVIQUA 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA, 30 comprimidos

Principio activo: LORLATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01ED-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEL LINFOMA ANAPLÁSICO (ALK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Lorlatinib deben tomarse aproximadamente a la misma hora cada día con o sin alimentos. Se deben tragar enteros (no se deben masticar, triturar ni partir antes de tragarlos). No se debe tomar ningún comprimido roto, agrietado o que no esté intacto.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a lorlatinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Uso concomitante de inductores potentes del CYP3A4/5 (ver las secciones 4.4 y 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LORVIQUA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA, 90 comprimidos recubiertos con película

Principio activo: LORLATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01ED-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEL LINFOMA ANAPLÁSICO (ALK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración**OR: ORAL**

Los comprimidos de Lorlatinib deben tomarse aproximadamente a la misma hora cada día con o sin alimentos. Se deben tragar enteros (no se deben masticar, triturar ni partir antes de tragarlos). No se debe tomar ningún comprimido roto, agrietado o que no esté intacto.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a lorlatinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Uso concomitante de inductores potentes del CYP3A4/5 (ver las secciones 4.4 y 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MAGNESIO,SULFATO

SULFATO DE MAGNESIO ALTAN 150 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG 100 ampollas de 10 ml

Principio activo: MAGNESIO,SULFATO

Datos generales

Grupo terapéutico: B05X-ADITIVOS DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Administración en inyección intravenosa lenta ó en perfusión venosa, diluido en una solución glucosada o salina a criterio facultativo según indicación terapéutica.

Unidades: mL/h.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1
Insuficiencia renal grave. Uso concomitante con derivados de la quinidina (ver sección 4.5).
Taquicardia Insuficiencia cardíaca Lesión miocárdica Infarto Insuficiencia hepática

Observaciones

Conservación a temperatura ambiente. Estabilidad: 24 h.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MELFALAN

ALKERAN 2 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 50 comprimidos

Principio activo: MELFALAN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AA-AGENTES ALQUILANTES: MOSTAZAS NITROGENADAS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

La absorción de Melfalan después de la administración oral es variable. Puede ser necesario aumentar la dosis con precaución hasta que se observe mielosupresión para asegurar que se alcanzan los niveles potencialmente terapéuticos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MELFALÁN ASPEN 50 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN, 1 vial + 1 vial de disolvente

Principio activo: MELFALAN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AA-AGENTES ALQUILANTES: MOSTAZAS NITROGENADAS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MELFALAN FLUFENAMIDA

PEPAXTI 20 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: MELFALAN FLUFENAMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AA-AGENTES ALQUILANTES: MOSTAZAS NITROGENADAS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MERCAPTOPURINA

MERCAPTOPURINA SILVER 50 MG COMPRIMIDOS , 24 comprimidos

Principio activo: MERCAPTOPURINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BB-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PURINA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Mercaptopurina debe ser administrada al menos 1 hora antes o 3 horas después de la toma de alimentos, incluyendo la leche.

La 6-mercaptopurina muestra variación diurna en su farmacocinética y eficacia. La administración nocturna, en comparación con la administración matutina, puede reducir el riesgo de recidiva. Por consiguiente, la dosis diaria de 6-mercaptopurina se debe tomar por la noche.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Uso concomitante con la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.5)

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

METOPROLOL

BELOKEN 1 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, 5 ampollas de 5 ml

Principio activo: METOPROLOL

Datos generales

Grupo terapéutico: C07AB-BETA-BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS CARDIOSELECTIVOS, SOLOS.

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Administrar en bolos a una velocidad de 1-2 mg por minuto con un intervalos de 2 a 5 minutos según indicación hasta obtener una respuesta satisfactoria.

Infarto de miocardio

Metoprolol debe administrarse por vía intravenosa lo antes posible tras los síntomas indicativos de infarto agudo de miocardio.

Este tratamiento se iniciará en una unidad de cuidados coronarios o similar inmediatamente después de la estabilización del estado hemodinámico del paciente. Se deben administrar tres inyecciones de 5 mg en bolus, a intervalos de 2 minutos, dependiendo del estado hemodinámico del paciente (ver secciones 4.3 "Contraindicaciones" y 4.4 "Advertencias y precauciones especiales de empleo").

En pacientes que toleran la dosis intravenosa completa (15 mg), se debe iniciar el tratamiento con 50 mg de metoprolol tartrato

PF: PERFUSIÓN

La solución para inyección de 1 mg/ml de Metoprolol no debe diluirse. Sin embargo, se pueden añadir 40 ml de la solución (8 ampollas), correspondientes a 40 mg de Metoprolol, a 1000 ml de las siguientes soluciones para infusión: SF, SG5%, S. Ringer.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a otros betabloqueantes o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Bloqueo aurículo-ventricular de segundo o tercer grado; pacientes con insuficiencia cardíaca inestable descompensada (edema pulmonar, hipoperfusión o hipotensión) y pacientes con tratamiento inotrópico continuo o intermitente que actúe por estimulación de los receptores beta; bradicardia sinusal clínicamente relevante, síndrome del seno enfermo (a menos que tenga implantado un marcapasos permanente), shock cardiogénico; Metoprolol no debe ser administrado a pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio mientras la frecuencia cardíaca sea 0,24 segundos o la presión arterial sistólica <100 mm Hg. Trastorno circulatorio arterial periférico grave.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

METOTREXATO

METOTREXATO ACCORD 25 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG, 1 vial de 20 ml

Principio activo: METOTREXATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BA-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DEL ÁCIDO FÓLICO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración

II: IM e IV

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

En el tratamiento de Metotrexato con dosis convencionales bajas se administra por vía intravenosa en bolo o intramuscular. Con dosis medias y altas en perfusión con rescate de Folinato de calcio.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Insuficiencia hepática grave (ver sección 4.2). Alcoholismo. Insuficiencia renal grave (aclaramiento de la creatinina inferior a 20 ml/min, ver sección 4.2). Discrasias sanguíneas preexistentes, como hipoplasia de la médula ósea, leucopenia, trombocitopenia o anemia importante. Infecciones graves, agudas o crónicas, como la tuberculosis y el sida. Úlceras de la cavidad bucal y enfermedad ulcerosa digestiva activa conocida. Embarazo, lactancia (ver sección 4.6). Vacunación concomitante con vacunas vivas.

Observaciones

El Metotrexato puede administrarse también por vía intraarterial o intratecal sin conservantes.

La dosis deberá ajustarse cuidadosamente dependiendo de la superficie corporal en caso de que se utilice Metotrexato para el tratamiento de enfermedades tumorales. Se han descrito casos mortales de intoxicación después de la administración de dosis mal calculadas.

Los pacientes con artritis reumatoide, artritis juvenil, psoriasis y artritis psoriásica deben recibir instrucciones claras de que el tratamiento con Metotrexato se debe administrar una vez por semana, y no cada día, su uso incorrecto puede producir reacciones adversas graves, incluso mortales.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

METOTREXATO PFIZER 25 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG, 1 vial de 2 ml

Principio activo: METOTREXATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BA-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DEL ÁCIDO FÓLICO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

En el tratamiento de Metotrexato con dosis convencionales bajas se administra por vía intravenosa en bolo o intramuscular. Con dosis medias y altas en perfusión con rescate de Folinato de calcio.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1
Insuficiencia hepática (bilirrubina sérica > 5 mg/dl [85,5 µmol/l], ver sección 4.2). Alcoholismo.
Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min, ver sección 4.2). Discrasias sanguíneas preexistentes, como hipoplasia de la médula ósea, leucopenia, trombocitopenia o anemia significativa. Inmunodeficiencia. Infecciones graves, agudas o crónicas como tuberculosis y VIH.
Estomatitis, úlceras de la cavidad oral y enfermedad de ulceración gastrointestinal activa conocida.
Lactancia (ver sección 4.6). Vacunación concomitante de vacuna de microorganismos vivos atenuados. Además, en el caso de indicaciones no oncológicas Embarazo (ver sección 4.6)

Observaciones

El Metotrexato puede administrarse también por vía intraarterial o intratecal sin conservantes.

La dosis deberá ajustarse cuidadosamente dependiendo de la superficie corporal en caso de que se utilice Metotrexato para el tratamiento de enfermedades tumorales.

Se han descrito casos mortales de intoxicación después de la administración de dosis mal calculadas. Los pacientes con artritis reumatoide, artritis juvenil, psoriasis y artritis psoriásica deben recibir instrucciones claras de que el tratamiento con Metotrexato se debe administrar una vez por semana, y no cada día, su uso incorrecto puede producir reacciones adversas graves, incluso mortales.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

METOTREXATO SEMANAL WYETH 2,5 MG COMPRIMIDOS, 24 comprimidos

Principio activo: METOTREXATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BA-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DEL ÁCIDO FÓLICO

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

La biodisponibilidad de metotrexato no se ve reducida con los alimentos por lo que se puede administrar con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1
Insuficiencia hepática (bilirrubina sérica > 5 mg/dl [85,5 µmol/l], ver sección 4.2). Alcoholismo.
Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min, ver sección 4.2). Discrasias sanguíneas preexistentes, como hipoplasia de la médula ósea, leucopenia, trombocitopenia o anemia significativa. Inmunodeficiencia. Infecciones graves, agudas o crónicas como tuberculosis y VIH. Estomatitis, úlceras de la cavidad oral y enfermedad de ulceración gastrointestinal activa conocida. Lactancia (ver sección 4.6). Vacunación concomitante de vacuna de microorganismos vivos atenuados. Además, en el caso de indicaciones no oncológicas: Embarazo (ver sección 4.6)

Observaciones

Advertencia importante sobre la dosificación de Metotrexato semanal Wyeth 2,5 mg comprimidos En el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, la psoriasis, artritis psoriásica, artritis reactiva, leucemia aguda linfoblástica y linfomas, Metotrexato semanal Wyeth solo se debe tomar una vez por semana. Los errores de dosificación en el uso de Metotrexato semanal Wyeth pueden producir efectos adversos graves, incluida la muerte. Lea esta sección de la ficha técnica con mucha atención. Este medicamento se debe tomar una vez por semana. El médico debe especificar el día de la administración en la receta. El médico prescriptor se debe asegurar de que los pacientes o sus cuidadores pueden cumplir con el régimen posológico de una dosis semanal. Es posible la administración por vía oral de metotrexato en dosis de hasta 30 mg/m², pero dosis más altas se deben administrar por vía parenteral.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

METOTREXATO WYETH 25 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE, 10 viales de 40 ml

Principio activo: METOTREXATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BA-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DEL ÁCIDO FÓLICO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

En el tratamiento de Metotrexato con dosis convencionales bajas se administra por vía intravenosa en bolo o intramuscular. Con dosis medias y altas en perfusión con rescate de Folinato de calcio.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1
Insuficiencia hepática (bilirrubina sérica > 5 mg/dl [85,5 µmol/l], ver sección 4.2). Alcoholismo.
Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min, ver sección 4.2). Discrasias sanguíneas preexistentes, como hipoplasia de la médula ósea, leucopenia, trombocitopenia o anemia significativa. Inmunodeficiencia. Infecciones graves, agudas o crónicas como tuberculosis y VIH.
Estomatitis, úlceras de la cavidad oral y enfermedad de ulceración gastrointestinal activa conocida.
Lactancia (ver sección 4.6). Vacunación concomitante de vacuna de microorganismos vivos atenuados. Además, en el caso de indicaciones no oncológicas Embarazo (ver sección 4.6)

Observaciones

El Metotrexato puede administrarse también por vía intraarterial o intratecal sin conservantes.

La dosis deberá ajustarse cuidadosamente dependiendo de la superficie corporal en caso de que se utilice Metotrexato para el tratamiento de enfermedades tumorales.

Se han descrito casos mortales de intoxicación después de la administración de dosis mal calculadas.

Los pacientes con artritis reumatoide, artritis juvenil, psoriasis y artritis psoriásica deben recibir instrucciones claras de que el tratamiento con Metotrexato se debe administrar una vez por semana, y no cada día, su uso incorrecto puede producir reacciones adversas graves, incluso mortales.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MIDAZOLAM

MIDAZOLAM NORMON 1 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG, 10 ampollas de 5 ml

Principio activo: MIDAZOLAM

Datos generales

Grupo terapéutico: N05CD-HIPNÓTICOS Y SEDANTES: BENZODIAZEPINAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

Utilizada como premedicación de la anestesia en adultos (en niños se prefiere la vía rectal), mediante una inyección IM profunda en una gran masa muscular.

IV: INTRAVENOSA

La inyección IV directa de Midazolam debe administrarse con lentitud y también se puede administrar en perfusión continua.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a benzodiazepinas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Para la sedación consciente de pacientes con insuficiencia respiratoria grave o depresión respiratoria aguda.

Observaciones

En población pediátrica mayor 6 meses se puede administrar vía rectal.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MIDAZOLAM NORMON 5 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG, 50 ampollas de 10 ml

Principio activo: MIDAZOLAM

Datos generales

Grupo terapéutico: N05CD-HIPNÓTICOS Y SEDANTES: BENZODIAZEPINAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria:

100 mg en 80 mL SF, SG5%, R. Lactato

Concentración total: 100 mg en 100 mL.

UNIDADES: mg/h

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a benzodiazepinas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Para la sedación consciente de pacientes con insuficiencia respiratoria grave o depresión respiratoria aguda.

Observaciones

Estabilidad: 24 h (15-25°).

No administrar junto a Furosemida por la misma luz del catéter.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MIDAZOLAM SALA 15mg/3ml SOLUCION INYECTABLE EFG, 50 ampollas de 3 ml

Principio activo: MIDAZOLAM

Datos generales

Grupo terapéutico: N05CD-HIPNÓTICOS Y SEDANTES: BENZODIAZEPINAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración**IM: INTRAMUSCULAR**

Utilizada como premedicación de la anestesia en adultos (en niños se prefiere la vía rectal), mediante una inyección IM profunda en una gran masa muscular.

IV: INTRAVENOSA

La inyección IV directa de Midazolam debe administrarse con lentitud y también se puede administrar en perfusión continua.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a las benzodiazepinas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Uso de este medicamento para la sedación consciente de los pacientes con insuficiencia respiratoria grave o depresión respiratoria aguda.

Observaciones

En población pediátrica mayor 6 meses se puede administrar vía rectal.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OROXELAM 5 MG SOLUCION BUCAL, 4 jeringas precargadas para uso oral de 1 ml

Principio activo: MIDAZOLAM

Datos generales

Grupo terapéutico: N05CD-HIPNÓTICOS Y SEDANTES: BENZODIAZEPINAS

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN

Vías de administración

OR: ORAL

La jeringa precargada de Midazolam 5 mg se administra por vía bucal. Se debe introducir lentamente toda la solución en el espacio entre la encía y la mejilla. Se debe evitar la inserción laringotraqueal para evitar la aspiración accidental. En caso necesario (para volúmenes mayores y/o pacientes más pequeños), se debe administrar lentamente alrededor de la mitad de la dosis en un lado de la boca y, a continuación, se administrará lentamente la otra mitad en el otro lado.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a las benzodiazepinas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Miastenia grave Insuficiencia respiratoria grave Síndrome de apnea del sueño Insuficiencia hepática grave

Observaciones

No se deben acoplar a la jeringa para uso oral agujas, cánulas intravenosas o cualquier otro dispositivo para administración parenteral. No se debe administrar por vía intravenosa. Se debe retirar la cápsula de cierre de la jeringa para uso oral antes del uso para evitar el riesgo de ahogamiento.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OROXELAM 7,5 MG SOLUCION BUCAL, 4 jeringas precargadas para uso oral de 1,5 ml

Principio activo: MIDAZOLAM

Datos generales

Grupo terapéutico: N05CD-HIPNÓTICOS Y SEDANTES: BENZODIAZEPINAS

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN

Vías de administración

OR: ORAL

La jeringa precargada de Midazolam 7,5 mg se administra por vía bucal. Se debe introducir lentamente toda la solución en el espacio entre la encía y la mejilla. Se debe evitar la inserción laringotraqueal para evitar la aspiración accidental. En caso necesario (para volúmenes mayores y/o pacientes más pequeños), se debe administrar lentamente alrededor de la mitad de la dosis en un lado de la boca y, a continuación, se administrará lentamente la otra mitad en el otro lado.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a las benzodiazepinas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Miastenia grave Insuficiencia respiratoria grave Síndrome de apnea del sueño Insuficiencia hepática grave

Observaciones

No se deben acoplar a la jeringa para uso oral agujas, cánulas intravenosas o cualquier otro dispositivo para administración parenteral. No se debe administrar por vía intravenosa. Se debe retirar la cápsula de cierre de la jeringa para uso oral antes del uso para evitar el riesgo de ahogamiento.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MIDOSTAURIN

RYDAPT 25 MG CAPSULAS BLANDAS, 56 cápsulas

Principio activo: MIDOSTAURIN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XE-INHIBIDORES DIRECTOS DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua. No deben abrirse, romperse o masticarse para asegurar una correcta dosificación y evitar un sabor desagradable del contenido de la cápsula.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. La administración concomitante de inductores CYP3A4, como rifampicina, hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*), carbamazepina, enzalutamida, fenitoína (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MILRINONA

COROTROPE 1 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE , 10 ampollas de 10 ml

Principio activo: MILRINONA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CE-ESTIMULANTES CARDÍACOS: INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Administrar lentamente a lo largo de 10 minutos (Dosis de carga: 50 microgramos/kg)

PF: PERFUSIÓN

Diluir la dosis prescrita en 100-250 mL de SF ó SG5% y administrar a una velocidad de 0,375 a 0,75 mcg/kg/min (Dosis de mantenimiento). La tasa de perfusión se ajustará de acuerdo con la respuesta clínica y hemodinámica del paciente. No exceder la dosis máxima de 1,13 mg/kg/día.

La duración del tratamiento dependerá de la respuesta del paciente. Se dispone de datos de estabilidad superiores a 24 h en SF ó SG5% a temperatura ambiente o en nevera, pero por razones microbiológicas, solo deben considerarse cuando el producto se haya preparado en condiciones estrictas de asepsia.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipovolemia grave.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MIRVETUXIMAB

MIRVETUXIMAB 100 MG / 20 mL INY

Principio activo: MIRVETUXIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/elahere-epar-product-information_es.pdf

MITAPIVAT

MITAPIVAT 20 MG COMP

Principio activo: MITAPIVAT

Datos generales

Grupo terapéutico: B-SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Mitapivat se puede tomar con o sin alimentos. Los comprimidos se deben tragar enteros. Los comprimidos no se deben partir, triturar, masticar ni disolver, ya que actualmente no se dispone de datos que respalden otras formas de administración.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/pyrukynd-epar-product-information_es.pdf

MITAPIVAT 5 MG COMP

Principio activo: MITAPIVAT

Datos generales

Grupo terapéutico: B-SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Mitapivat se puede tomar con o sin alimentos. Los comprimidos se deben tragar enteros. Los comprimidos no se deben partir, triturar, masticar ni disolver, ya que actualmente no se dispone de datos que respalden otras formas de administración.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/pyrukynd-epar-product-information_es.pdf

MITOMICINA

MITOMICINA 40 MG INY

Principio activo: MITOMICINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DC-OTROS ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS

Forma farmacéutica: INTRAVESICAL

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

VI: INTRAVESICAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Lactancia.

Tratamiento sistémico

La presencia de pancitopenia, leucopenia/trombocitopenia aislada, diátesis hemorrágica e infecciones agudas constituyen contraindicaciones absolutas.

Las alteraciones restrictivas u obstructivas a la ventilación pulmonar, la disfunción renal y la disfunción hepática, así como un mal estado general de salud, son contraindicaciones relativas. La coincidencia temporal con la administración de radioterapia u otro citostático puede ser otra contraindicación.

Tratamiento intravesical

La perforación de la pared vesical es una contraindicación absoluta.

La presencia de cistitis es una contraindicación relativa.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

MITOTANO

LYSODREN 500 mg COMPRIMIDOS, 100 comprimidos

Principio activo: MITOTANO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

La dosis diaria total puede dividirse en dos o tres dosis según sea más conveniente para el paciente. Los comprimidos se tomarán con un vaso de agua durante comidas con alto contenido en grasa. Debe recomendarse a los pacientes que no tomen los comprimidos que presenten signos de deterioro, y a las personas a cargo del cuidado de los pacientes que utilicen guantes desechables cuando manipulen los comprimidos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6). No se debe utilizar de forma concomitante con espironolactona (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MITOXANTRONA

MITOXANTRONA 10 MG INY

Principio activo: MITOXANTRONA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos los sulfitos que pueden producirse durante la fabricación de mitoxantrona.

Mitoxantrona está contraindicada en mujeres en periodo de lactancia.

Mitoxantrona no se debe utilizar en el tratamiento de la esclerosis múltiple en mujeres embarazadas.

Observaciones

<https://www.vademecum.es/reino-unido/medicamento/31003173/onkotrone-concentrate-for-solution-for-infusion-2-mg-ml>

NOVANTRONE 2 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 1 vial de 10 ml

Principio activo: MITOXANTRONA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01DB-ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, incluidos los sulfitos que pueden producirse durante la fabricación de mitoxantrona. Mitoxantrona está contraindicada en mujeres en periodo de lactancia (ver secciones 4.4 y 4.6). Mitoxantrona no se debe utilizar en el tratamiento de la esclerosis múltiple en mujeres embarazadas (ver secciones 4.4 y 4.6).

Observaciones

El concentrado de Mitoxantrona no se debe administrar por vía subcutánea, intramuscular ni intraarterial. Se puede producir daño tisular local grave si se produce extravasación durante la administración. Tampoco se debe administrar mediante inyección intratecal.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MOGAMULIZUMAB

POTELIGEO 4 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 5 ml

Principio activo: MOGAMULIZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS
INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MOMELOTINIB

OMJJARA 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: MOMELOTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EJ-INHIBIDORES DE LA QUINASA ASOCIADA A JANUS (JAK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Mometinib se puede tomar con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OMJJARA 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: MOMELOTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EJ-INHIBIDORES DE LA QUINASA ASOCIADA A JANUS (JAK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Mometinib se puede tomar con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OMJJARA 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: MOMELOTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EJ-INHIBIDORES DE LA QUINASA ASOCIADA A JANUS (JAK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Mometotinib se puede tomar con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MORFINA

MORFINA B. BRAUN 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 ampollas de 1 ml

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV-SC

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

IV: INTRAVENOSA

Intravenosa directa lentamente durante 4-5 minutos.

Perfusión continua diluyendo la dosis prescrita en S.F 0.9% o S.G 5%.

SC: SUBCUTANEA**Contraindicaciones**

Este medicamento está contraindicado en: Pacientes con alergia a la morfina u otros opiáceos. Pacientes con depresión respiratoria o enfermedad respiratoria obstructiva grave. En caso de infección en el lugar de la inyección y en pacientes con alteraciones graves de la coagulación, la administración por vía epidural o intratecal está contraindicada.

Observaciones

Se puede administrar por vía intratecal y epidural.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MORFINA B. BRAUN 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EN VIAL, 1 vial de 20 ml

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

PA: PARENTERAL

Intravenosa directa lentamente durante 4-5 minutos.

Perfusión continua diluyendo la dosis prescrita en S.F 0.9% o S.G 5%.

SC: SUBCUTANEA

Contraindicaciones

Este medicamento está contraindicado en: - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Pacientes con depresión respiratoria o enfermedad respiratoria obstructiva grave. - Pacientes con asma bronquial agudo. - Pacientes tratados con inhibidores de la mono-amino-oxidasa o durante los 14 días siguientes a la suspensión del tal tratamiento. - Pacientes con enfermedad hepática aguda y/o grave. - Pacientes con lesión craneal; aumento de la presión intracraneal. - Pacientes en coma. - Pacientes con espasmos del tracto renal y biliar. - Pacientes con alcoholismo agudo. - Pacientes en riesgo de íleo paralítico. - Pacientes con colitis ulcerosa. - Pacientes en estados de shock. - En caso de infección en el lugar de inyección y en pacientes con alteraciones graves de la coagulación, la administración por vía epidural o intratecal está contraindicada.

Observaciones

Se puede administrar por vía intratecal y epidural.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MORFINA B. BRAUN 40 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 10 ampollas de 10 ml

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE OTRAS VIA

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

PA: PARENTERAL

Intravenosa directa lentamente durante 4-5 minutos.

Perfusión continua diluyendo la dosis prescrita en S.F 0.9% o S.G 5%.

SC: SUBCUTANEA

Contraindicaciones

Este medicamento está contraindicado en: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con depresión respiratoria o enfermedad respiratoria obstructiva grave. Pacientes con asma bronquial agudo. Pacientes tratados con inhibidores de la mono-amino-oxidasa o durante los 14 días siguientes a la suspensión del tal tratamiento. Pacientes con enfermedad hepática aguda y/o grave. Pacientes con lesión craneal; aumento de la presión intracraneal. Pacientes en coma. Pacientes con espasmos del tracto renal y biliar. Pacientes con alcoholismo agudo. Pacientes en riesgo de íleo paralítico. Pacientes con colitis ulcerosa. Pacientes en estados de shock. En caso de infección en el lugar de inyección y en pacientes con alteraciones graves de la coagulación, la administración por vía epidural o intratecal está contraindicada.

Observaciones

Se puede administrar por vía intratecal y epidural.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MST CONTINUS 10 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: COMP LIBER RETARDADA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de liberación prolongada deben ser tragados enteros, y no deben romperse, masticarse o triturarse. La administración de comprimidos rotos, masticados o triturados puede conducir a una rápida liberación y absorción de una dosis potencialmente letal de morfina.

Contraindicaciones

Los medicamentos a base de morfina están contraindicados en pacientes con: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Depresión respiratoria grave con hipoxia y/o hipercapnia Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave Asma bronquial agudo y/o grave Ileo paralítico Cianosis Vaciado gástrico tardío Síntomas de íleo paralítico (ver sección 4.4) Abdomen agudo Enfermedad hepática aguda. No está indicado su uso en pacientes con traumatismo craneal o cuando la presión intracraneal esté aumentada. Contraindicado en la administración concomitante de IMAOs o dentro de las dos semanas posteriores a la suspensión de su uso. No indicado en niños menores de un año; ni en uso preoperatorio o dentro de las 24 horas posteriores a una intervención quirúrgica.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MST CONTINUS 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: COMP LIBER RETARDADA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de liberación prolongada deben ser tragados enteros, y no deben romperse, masticarse o triturarse. La administración de comprimidos rotos, masticados o triturados puede conducir a una rápida liberación y absorción de una dosis potencialmente letal de morfina.

Contraindicaciones

Los medicamentos a base de morfina están contraindicados en pacientes con: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Depresión respiratoria grave con hipoxia y/o hipercapnia Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave Asma bronquial agudo y/o grave Ileo paralítico Cianosis Vaciado gástrico tardío Síntomas de íleo paralítico (ver sección 4.4) Abdomen agudo Enfermedad hepática aguda. No está indicado su uso en pacientes con traumatismo craneal o cuando la presión intracraneal esté aumentada. Contraindicado en la administración concomitante de IMAOs o dentro de las dos semanas posteriores a la suspensión de su uso. No indicado en niños menores de un año; ni en uso preoperatorio o dentro de las 24 horas posteriores a una intervención quirúrgica.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MST CONTINUS 30 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: COMP LIBER RETARDADA

Vías de administración**OR:** ORAL

Los comprimidos de liberación prolongada deben ser tragados enteros, y no deben romperse, masticarse o triturarse. La administración de comprimidos rotos, masticados o triturados puede conducir a una rápida liberación y absorción de una dosis potencialmente letal de morfina.

Contraindicaciones

Los medicamentos a base de morfina están contraindicados en pacientes con: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Depresión respiratoria grave con hipoxia y/o hipercapnia Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave Asma bronquial agudo y/o grave Ileo paralítico Cianosis Vaciado gástrico tardío Síntomas de íleo paralítico (ver sección 4.4) Abdomen agudo Enfermedad hepática aguda. No está indicado su uso en pacientes con traumatismo craneal o cuando la presión intracraneal esté aumentada. Contraindicado en la administración

concomitante de IMAOs o dentro de las dos semanas posteriores a la suspensión de su uso. No indicado en niños menores de un año; ni en uso preoperatorio o dentro de las 24 horas posteriores a una intervención quirúrgica.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MST CONTINUS 5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: COMP LIBER RETARDADA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de liberación prolongada deben ser tragados enteros, y no deben romperse, masticarse o triturarse. La administración de comprimidos rotos, masticados o triturados puede conducir a una rápida liberación y absorción de una dosis potencialmente letal de morfina.

Contraindicaciones

Los medicamentos a base de morfina están contraindicados en pacientes con: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Depresión respiratoria grave con hipoxia y/o hipercapnia Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave Asma bronquial agudo y/o grave Ileo paralítico Cianosis Vaciado gástrico tardío Síntomas de íleo paralítico (ver sección 4.4) Abdomen agudo Enfermedad hepática aguda. No está indicado su uso en pacientes con traumatismo craneal o cuando la presión intracraneal esté aumentada. Contraindicado en la administración concomitante de IMAOs o dentro de las dos semanas posteriores a la suspensión de su uso. No indicado en niños menores de un año; ni en uso preoperatorio o dentro de las 24 horas posteriores a una intervención quirúrgica.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MST CONTINUS 60 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: COMP LIBER RETARDADA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de liberación prolongada deben ser tragados enteros, y no deben romperse, masticarse o triturarse. La administración de comprimidos rotos, masticados o triturados puede conducir a una rápida liberación y absorción de una dosis potencialmente letal de morfina.

Contraindicaciones

Los medicamentos a base de morfina están contraindicados en pacientes con: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Depresión respiratoria grave con hipoxia y/o hipercapnia Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave Asma bronquial agudo y/o grave Ileo paralítico Cianosis Vaciado gástrico tardío Síntomas de íleo paralítico (ver sección 4.4) Abdomen agudo Enfermedad hepática aguda. No está indicado su uso en pacientes con traumatismo craneal o cuando la presión intracraneal esté aumentada. Contraindicado en la administración concomitante de IMAOs o dentro de las dos semanas posteriores a la suspensión de su uso. No indicado en niños menores de un año; ni en uso preoperatorio o dentro de las 24 horas posteriores a una intervención quirúrgica.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ORAMORPH 2 MG/ML SOLUCION ORAL , 1 frasco de 100 ml

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN

Vías de administración

OR: ORAL

La solución oral de Morfina 2 mg/mL se puede ingerir directamente sin dilución con otro líquido oral y se debe dosificar en mililitros utilizando la jeringa graduada (presentación de 100 ml).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Insuficiencia o depresión respiratoria sin respiración asistida Enfermedades obstructivas de las vías aéreas como por ejemplo asma bronquial agudo Estados de presión intracraneal aumentada Íleo paralítico, dolor abdominal agudo de etiología desconocida o enlentecimiento del vaciado gástrico Enfermedad hepática grave Trastornos convulsivos Traumatismo craneal o cuando la presión intracraneal esté aumentada En asociación con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), buprenorfina, nalbufina o pentazocina (ver apartado 4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción) Niños menores de 1 año Embarazo Lactancia La administración pre-operatoria o durante las primeras 24 horas del post-operatorio

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ORAMORPH 20 MG/ML SOLUCION ORAL, 1 frasco de 20 ml

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN

Vías de administración

OR: ORAL

La solución oral 20 mg/mL debe añadirse a una bebida ligera inmediatamente antes de su administración. Se debe dosificar con el obturador cuentagotas incorporado, que permite dosificar en gotas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Insuficiencia o depresión respiratoria sin respiración asistida Enfermedades obstructivas de las vías aéreas como por ejemplo asma bronquial agudo Estados de presión intracraneal aumentada Íleo paralítico, dolor abdominal agudo de etiología desconocida o enlentecimiento del vaciado gástrico Enfermedad hepática grave Trastornos convulsivos Traumatismo craneal o cuando la presión intracraneal esté aumentada En asociación con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), buprenorfina, nalbufina o pentazocina (ver apartado 4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción) Niños menores de 1 año Embarazo Lactancia La administración pre-operatoria o durante las primeras 24 horas del post-operatorio

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SEVREDOL 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 12 comprimidos

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Contraindicaciones

Los medicamentos a base de morfina están contraindicados en pacientes con: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Depresión respiratoria grave o hipoxia y/o hipercapnia Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave Asma bronquial agudo y/o grave Íleo paralítico Cianosis Vaciado gástrico tardío Síntomas de íleo paralítico (ver sección 4.4) Abdomen agudo Enfermedad hepática aguda. No está indicado su uso en pacientes con traumatismo craneal o cuando la presión intracraneal esté aumentada. Contraindicado en la administración concomitante de IMAOs o dentro de las dos semanas posteriores a la suspensión de su uso. No indicado en niños menores de cinco años.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SEVREDOL 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 12 comprimidos

Principio activo: MORFINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AA-OPIOIDES: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Contraindicaciones

Los medicamentos a base de morfina están contraindicados en pacientes con: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Depresión respiratoria grave o hipoxia y/o hipercapnia Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave Asma bronquial agudo y/o grave Íleo paralítico Cianosis Vaciado gástrico tardío Síntomas de íleo paralítico (ver sección 4.4) Abdomen agudo Enfermedad hepática aguda. No está indicado su uso en pacientes con traumatismo craneal o cuando la presión intracraneal esté aumentada. Contraindicado en la administración concomitante de IMAOs o dentro de las dos semanas posteriores a la suspensión de su uso. No indicado en niños menores de cinco años.

Observaciones

Antes de iniciar el tratamiento con este medicamento, se debe acordar con el paciente una estrategia de tratamiento que incluya su duración y objetivos, así como un plan para la finalización del mismo, de acuerdo a las guías para el manejo del dolor.

La interrupción brusca de la administración de opioides puede provocar un síndrome de abstinencia. Por consiguiente, la dosis se debe reducir de manera gradual antes de la interrupción del tratamiento.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MOSUNETUZUMAB

LUNSUMIO 1 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 1 ml

Principio activo: MOSUNETUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS

INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV**Vías de administración****IV:** INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LUNSUMIO 30 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: MOSUNETUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS
INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración**IV:** INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MYCOBACTERIUM BOVIS

ONCOTICE 2-8 X 10(8) UFC POLVO PARA SUSPENSION INTRAVESICAL, 3 viales

Principio activo: MYCOBACTERIUM BOVIS

Datos generales

Grupo terapéutico: L03AX-OTROS CITOQUINAS E INMUNOMODULADORES

Forma farmacéutica: INTRAVESICAL

Vías de administración

VI: INTRAVESICAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Infecciones del tracto urinario. En caso de desarrollarse durante el tratamiento, se debe suspender la terapia con OncoTICE, hasta que el urocultivo sea negativo y la terapia con antibióticos y/o antisépticos urinarios finalice. Hematuria activa. La instilación en caso de hematuria activa puede facilitar una infección sistémica por BCG, por lo que se debe posponer el tratamiento de 7 a 14 días hasta que la causa se haya resuelto. Particularmente pacientes que han sido sometidos a una resección transuretral, biopsia o a una cateterización traumática (asociada con hematuria) de la vejiga en la semana precedente. Evidencia clínica de la existencia de tuberculosis activa. Se debe descartar la presencia de tuberculosis activa en individuos que hayan dado positivo en la prueba de la tuberculina/PPD antes de empezar el tratamiento con OncoTICE. Tratamiento con fármacos antituberculosos como estreptomycin, ácido para-aminosalicílico (PAS), isoniacida (INH), rifampicina y etambutol. Deficiencia de la respuesta inmunitaria ya sea de origen congénito, adquirido, yatrogénico, por fármacos u otra terapia. Serología VIH positiva. Embarazo y lactancia. Fiebre, a no ser que la causa de la fiebre sea de origen conocido.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

NERATINIB

NERLYNX 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 180 comprimidos

Principio activo: NERATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EH-INHIBIDORES DEL RECEPTOR 2 DE LA TIROSINA QUINASA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO HUMANO (HER2)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos se deben tragar enteros, preferiblemente con agua, sin triturarlos ni disolverlos. Los comprimidos se tomarán con alimentos, preferiblemente por la mañana.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Administración conjunta de los siguientes medicamentos que son inductores potentes de la isoforma CYP3A4 del citocromo P450 o de la glucoproteína P (gp-P), como (ver secciones 4.5 y 5.2): Carbamazepina, fenitoína (antiepilépticos). Hipérico (*Hypericum perforatum*) (medicamento a base de plantas). Rifampicina (antimicobacteriano). Insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh) (ver sección 5.2).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

NILOTINIB CLORHIDRATO MONOHIDRATO

TASIGNA 150 MG CAPSULAS DURAS, 112 cápsulas

Principio activo: NILOTINIB CLORHIDRATO MONOHIDRATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Nilotinib debe tomarse dos veces al día con aproximadamente unas 12 horas entre las dos administraciones y no debe tomarse junto con la comida. Las cápsulas duras deben tragarse enteras, con agua. No se debe ingerir alimentos durante las dos horas previas a la administración de la dosis ni durante, al menos, una hora después.

Para pacientes que no puedan tragar las cápsulas duras, el contenido de cada cápsula dura puede dispersarse en una cucharadita de compota de manzana (puré de manzana) y debe tomarse inmediatamente. No debe utilizarse más de una cucharadita de compota de manzana ni ningún otro alimento aparte de compota de manzana.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TASIGNA 200 MG CAPSULAS DURAS, 112 cápsulas (4 estuches)

Principio activo: NILOTINIB CLORHIDRATO MONOHIDRATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Nilotinib debe tomarse dos veces al día con aproximadamente unas 12 horas entre las dos

administraciones y no debe tomarse junto con la comida. Las cápsulas duras deben tragarse enteras, con agua. No se debe ingerir alimentos durante las dos horas previas a la administración de la dosis ni durante, al menos, una hora después.

Para pacientes que no puedan tragar las cápsulas duras, el contenido de cada cápsula dura puede dispersarse en una cucharadita de compota de manzana (puré de manzana) y debe tomarse inmediatamente. No debe utilizarse más de una cucharadita de compota de manzana ni ningún otro alimento aparte de compota de manzana.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

NINTEDANIB

OFEV 100 MG CAPSULAS BLANDAS 60 cápsulas

Principio activo: NINTEDANIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Nintedanib se deben tomar con alimentos, y tragarse enteras con agua, sin masticarlas. La cápsula no se debe abrir ni partir. Se pueden tomar con una pequeña cantidad (una cucharadita) de un alimento blando frío o a temperatura ambiente, como compota de manzana o pudín de chocolate, y se deben tragar inmediatamente sin masticarlas para garantizar que las cápsulas permanezcan intactas.

Contraindicaciones

Embarazo (ver sección 4.6). Hipersensibilidad a nintedanib, a los cacahuetes, a la soja o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OFEV 150 MG CAPSULAS BLANDAS 60 cápsulas

Principio activo: NINTEDANIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Nintedanib se deben tomar con alimentos, y tragarse enteras con agua, sin masticarlas. La cápsula no se debe abrir ni partir. Se pueden tomar con una pequeña cantidad (una cucharadita) de un alimento blando frío o a temperatura ambiente, como compota de manzana o pudín de chocolate, y se deben tragar inmediatamente sin masticarlas para garantizar que las cápsulas permanezcan intactas.

Contraindicaciones

Embarazo (ver sección 4.6). Hipersensibilidad a nintedanib, a los cacahuetes, a la soja o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

NIRAPARIB

ZEJULA 100 MG CAPSULAS DURAS, 84 (84 x1) cápsulas

Principio activo: NIRAPARIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XK-INHIBIDORES DE LA POLI (ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Niraparib se deben tragar enteras, con agua. No se debe masticar ni triturar. Las cápsulas de Niraparib pueden tomarse con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia materna (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

NITROPRUSIATO SODICO**NITROPRUSIAT FIDES 50 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial**

Principio activo: NITROPRUSIATO SODICO

Datos generales

Grupo terapéutico: C02DD-ANTIHIPERTENSIVOS: NITROFERRICIANURO, DERIVADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración**IV:** INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria:

10 mg en 100 mL SG5% ~ (1 ml en 100 mL)

Concentración total: 10 mg en 100 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 0.5-10.

Contraindicaciones

Hipertensiones compensatorias, como pueden ser las derivaciones arteriovenosas o la coartación de la aorta. Riesgo ASA grado 5, equivalente a pacientes moribundos que no se espera que sobrevivan sin ser intervenidos quirúrgicamente. Anemia o hipovolemia no corregidas. Circulación cerebral inadecuada (insuficiencia cerebrovascular). La hipotensión inducida con nitroprusiato de sodio durante la anestesia está contraindicada en pacientes con hepatopatía, enfermedad renal grave, atrofia óptica de Leber, ambliopía tabáquica y enfermedades asociadas con un déficit de vitamina B12. Durante el tratamiento con nitratos o donadores de óxido nítrico, no se debe de utilizar riociguat, el estimulador de guanilato ciclase soluble (ver sección 4.5) Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Fotosensible (protegido de la luz).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

NIVOLUMAB**OPDIVO 10 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml**

Principio activo: NIVOLUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

NOREPINEFRINA

NORADRENALINA NORMON 0,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 100 ampollas de 10 ml

Principio activo: NOREPINEFRINA

Datos generales

Grupo terapéutico: C01CA-ESTIMULANTES CARDÍACOS: ADRENÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

40 mg en 60 mL SF o SG5%

Concentración total: 40 mg en 100 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min. Rango: 0,05 - 2.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hipotensión por déficit de volumen sanguíneo (hipovolemia) (ver sección 4.4). No utilizar con los anestésicos ciclopropano y halotano. Para consultar las interacciones, ver sección 4.5. Se debe evitar su administración en las venas de los miembros inferiores de ancianos y pacientes con enfermedades oclusivas debido a una posible vasoconstricción (ver sección 4.4).

Observaciones

Estabilidad: 24 h. Administrar por catéter central. No con soluciones alcalinas.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OBINUTUZUMAB

GAZYVARO 1000 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 40 ml

Principio activo: OBINUTUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FA-INHIBIDORES DE CD20 (GRUPO DE DIFERENCIACIÓN 20)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OLAPARIB

LYNPARZA 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 (7 x 8) comprimidos

Principio activo: OLAPARIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XK-INHIBIDORES DE LA POLI (ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Olaparib se deben tragar enteros y no deben masticarse, triturarse, disolverse ni dividirse. Se pueden tomar con independencia de las comidas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia durante el tratamiento y 1 mes después de la última dosis (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LYNPARZA 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 (7 x 8) comprimidos

Principio activo: OLAPARIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XK-INHIBIDORES DE LA POLI (ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Olaparib se deben tragar enteros y no deben masticarse, triturarse, disolverse ni dividirse. Se pueden tomar con independencia de las comidas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia durante el tratamiento y 1 mes después de la última dosis (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OSIMERTINIB

TAGRISSO 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos recubiertos

Principio activo: OSIMERTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EB-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El comprimido se debe tragar entero con agua y no se debe machacar, dividir ni masticar.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. La hierba de San Juan no se debe emplear junto con TAGRISSO (ver sección 4.5).

Observaciones

Si el paciente no es capaz de tragar el comprimido, este se puede dispersar primero en 50 ml de agua sin gas. Se debe poner el comprimido en el agua, sin machacar, se debe agitar hasta que esté dispersado y tragar inmediatamente. Se debe añadir otro medio vaso de agua para asegurar que no quedan residuos y luego, tragar inmediatamente. No se deben añadir otros líquidos.

Si es necesaria la administración mediante sonda nasogástrica, se debe seguir el mismo proceso indicado anteriormente, pero utilizando volúmenes de 15 ml para la dispersión inicial y 15 ml para los enjuagues de residuos. Los 30 ml de líquido resultantes se deben administrar según las instrucciones del fabricante de la sonda nasogástrica, con irrigaciones de agua adecuadas. Tanto la dispersión como los residuos se deben administrar en un plazo de 30 minutos después de añadir los comprimidos al agua.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TAGRISSO 80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos recubiertos

Principio activo: OSIMERTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EB-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El comprimido se debe tragar entero con agua y no se debe machacar, dividir ni masticar.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. La hierba de San Juan no se debe emplear junto con TAGRISSO (ver sección 4.5).

Observaciones

Si el paciente no es capaz de tragar el comprimido, este se puede dispersar primero en 50 ml de agua sin gas. Se debe poner el comprimido en el agua, sin machacar, se debe agitar hasta que esté dispersado y tragar inmediatamente. Se debe añadir otro medio vaso de agua para asegurar que no quedan residuos y luego, tragar inmediatamente. No se deben añadir otros líquidos.

Si es necesaria la administración mediante sonda nasogástrica, se debe seguir el mismo proceso indicado anteriormente, pero utilizando volúmenes de 15 ml para la dispersión inicial y 15 ml para los enjuagues de residuos. Los 30 ml de líquido resultantes se deben administrar según las instrucciones del fabricante de la sonda nasogástrica, con irrigaciones de agua adecuadas. Tanto la dispersión como los residuos se deben administrar en un plazo de 30 minutos después de añadir los comprimidos al agua.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OXALIPLATINO

OXALIPLATINO ACCORD 5 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 40 ml

Principio activo: OXALIPLATINO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XA-OTROS CITOSTÁTICOS: DERIVADOS DE PLATINO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Oxaliplatino está contraindicado en pacientes: con antecedentes conocidos de hipersensibilidad al oxaliplatino o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. que están en período de lactancia. que presentan mielosupresión antes del comienzo del primer ciclo, según un recuento de neutrófilos $< 2 \times 10^9/l$ y/o un recuento de plaquetas $< 100 \times 10^9/l$ inicialmente. que padecen neuropatía sensorial periférica con deterioro funcional antes del primer ciclo. con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml/min) (ver sección 5.2).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OXALIPLATINO TEVA 5 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 10 ml

Principio activo: OXALIPLATINO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XA-OTROS CITOSTÁTICOS: DERIVADOS DE PLATINO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Oxaliplatino está contraindicado en pacientes que: - Tienen antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes listados en la sección 6.1. - son mujeres en período de lactancia. - tienen mielosupresión antes de empezar el primer ciclo de tratamiento, evidenciada por neutrófilos a nivel basal $<2 \times 10^9 / l$ y/o recuento de plaquetas $<100 \times 10^9 / l$. - tienen neuropatía periférica sensitiva con deterioro funcional antes del primer ciclo de tratamiento. - tienen insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min) (ver sección 5.2).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OXALIPLATINO TEVA 5 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 20 ml

Principio activo: OXALIPLATINO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XA-OTROS CITOSTÁTICOS: DERIVADOS DE PLATINO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Oxaliplatino está contraindicado en pacientes que: - Tienen antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes listados en la sección 6.1. - son mujeres en período de lactancia. - tienen mielosupresión antes de empezar el primer ciclo de tratamiento, evidenciada por neutrófilos a nivel basal $<2 \times 10^9 / l$ y/o recuento de plaquetas $<100 \times 10^9 / l$. - tienen neuropatía periférica sensitiva con deterioro funcional antes del primer ciclo de tratamiento. - tienen insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min) (ver sección 5.2).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

OXITOCINA

SYNTOCINON 10UI/ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN, 50 ampollas de 1 ml

Principio activo: OXITOCINA

Datos generales

Grupo terapéutico: H01BB-OXITOCINA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

Tras la expulsión de la placenta. No es recomendable en la inducción del parto.

IV: INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria:

10 UI en 500 mL SF.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la oxitocina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Contracciones uterinas hipertónicas, peligro del feto si el parto no es inminente. Cualquier condición, a causa del feto o de la madre, debido a la cual este desaconsejado un parto espontáneo y/o el parto vaginal este contraindicado, por ejemplo: Desproporción cefalopélvica significativa Mala presentación fetal Placenta previa y vasa previa Desprendimiento placentario Prolapso del cordón umbilical Sobredistensión o resistencia a la rotura uterina como en embarazos múltiples. Polihidramnios Parto múltiple Presencia de una cicatriz uterina resultante de cirugía mayor, incluyendo una cesárea clásica. Syntocinon no debe ser nunca administrado de manera conjunta con prostaglandinas u otros estimulantes de las contracciones uterinas y en cualquier caso, deben haber transcurrido al menos más de seis horas desde la administración de aquéllas (ver sección 4.5.).

Observaciones

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PACLITAXEL

PACLITAXEL ACCORD 6 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 16,7 ml

Principio activo: PACLITAXEL

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CD-TAXANOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad grave al paclitaxel o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, en particular al aceite de ricino polioxietilado (ver sección 4.4). El paclitaxel no debe utilizarse en pacientes con un recuento inicial de neutrófilos $< 1500/\text{mm}^3$ ($< 1000/\text{mm}^3$ para los pacientes con SK) al inicio del tratamiento. Paclitaxel está contraindicado durante la lactancia (ver sección 4.6). En los casos de SK, el paclitaxel también está contraindicado en pacientes con infecciones concomitantes graves y no controladas.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PACLITAXEL ACCORD 6 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 50 ml

Principio activo: PACLITAXEL

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CD-TAXANOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad grave al paclitaxel o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, en particular al aceite de ricino polioxetilado (ver sección 4.4). El paclitaxel no debe utilizarse en pacientes con un recuento inicial de neutrófilos $< 1500/\text{mm}^3$ ($< 1000/\text{mm}^3$ para los pacientes con SK) al inicio del tratamiento. Paclitaxel está contraindicado durante la lactancia (ver sección 4.6). En los casos de SK, el paclitaxel también está contraindicado en pacientes con infecciones concomitantes graves y no controladas.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PACLITAXEL ALBÚMINA

NAVERUCLIF 5 MG/ML POLVO PARA DISPERSION PARA PERFUSION EFG, 1 vial

Principio activo: PACLITAXEL ALBÚMINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CD-TAXANOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6). Pacientes con un recuento basal de neutrófilos < 1500 células/ mm^3 .

Observaciones

Paclitaxel Albúmina es una formulación de nanopartículas de Paclitaxel unido a albúmina, que puede tener propiedades considerablemente diferentes en comparación con otras formulaciones de Paclitaxel. No deberá sustituirse por otras formulaciones.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PALBOCICLIB

IBRANCE 100 MG CAPSULAS DURAS, 21 cápsulas

Principio activo: PALBOCICLIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EF-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEPENDIENTE DE CICLINA (CDK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Palbociclib se debe tomar con alimentos, preferiblemente en una comida para asegurar una exposición uniforme. No se debe tomar con pomelo o zumo de pomelo.

Las cápsulas se deben tragar enteras (no se deben masticar, triturar o abrir antes de tragarlas). No se debe tomar ninguna cápsula rota, agrietada o que no esté intacta.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. El uso de preparados que contengan hierba de San Juan (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IBRANCE 125 MG CAPSULAS DURAS, 21 cápsulas

Principio activo: PALBOCICLIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EF-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEPENDIENTE DE CICLINA (CDK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Palbociclib se debe tomar con alimentos, preferiblemente en una comida para asegurar una exposición uniforme. No se debe tomar con pomelo o zumo de pomelo.

Las cápsulas se deben tragar enteras (no se deben masticar, triturar o abrir antes de tragarlas). No se debe tomar ninguna cápsula rota, agrietada o que no esté intacta.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. El uso de preparados que contengan hierba de San Juan (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

IBRANCE 75 MG CAPSULAS DURAS, 21 cápsulas

Principio activo: PALBOCICLIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EF-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEPENDIENTE DE CICLINA (CDK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Palbociclib se debe tomar con alimentos, preferiblemente en una comida para asegurar una exposición uniforme. No se debe tomar con pomelo o zumo de pomelo.

Las cápsulas se deben tragar enteras (no se deben masticar, triturar o abrir antes de tragarlas). No se debe tomar ninguna cápsula rota, agrietada o que no esté intacta.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. El uso de preparados que contengan hierba de San Juan (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PANITUMUMAB

VECTIBIX 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 20 ml

Principio activo: PANITUMUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FE-INHIBIDORES DEL EGFR (RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO)

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad graves o que puedan resultar potencialmente mortales al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 (ver sección 4.4). Pacientes con neumonitis intersticial o fibrosis pulmonar (ver sección 4.4). La combinación de Vectibix con quimioterapia que contenga oxaliplatino está contraindicada en pacientes con CCRm con RAS mutado o en los que el estado de RAS en el CCRm se desconoce (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PAZOPANIB

VOTRIENT 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: PAZOPANIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Se debe tomar sin alimentos, al menos una hora antes o dos horas después de las comidas. Los comprimidos recubiertos con película se deben tomar enteros con agua y no se deben romper o machacar.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VOTRIENT 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: PAZOPANIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Se debe tomar sin alimentos, al menos una hora antes o dos horas después de las comidas. Los comprimidos recubiertos con película se deben tomar enteros con agua y no se deben romper o machacar.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PEMBROLIZUMAB**KEYTRUDA 25 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 4 ml**

Principio activo: PEMBROLIZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PEMETREXED

PEMETREXED AUROVIT 25 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION 1 vial de 40 ml

Principio activo: PEMETREXED

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BA-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DEL ÁCIDO FÓLICO

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6). Administración concomitante de la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PEMIGATINIB

PEMAZYRE 13,5 mg COMPRIMIDOS, 14 comprimidos

Principio activo: PEMIGATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EN-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS (FGFR)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos se deben tomar aproximadamente a la misma hora cada día. Los pacientes no deben machacar, masticar, romper ni disolver los comprimidos.

Pemigatinib se puede tomar con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Uso concomitante con hierba de San Juan (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PENTOSTATINA

NIPENT 10 mg POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 1 vial

Principio activo: PENTOSTATINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Pentostatina está contraindicada en pacientes que hayan mostrado hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes. Pentostatina está contraindicada en pacientes con deterioro de la función renal (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min). Pentostatina está contraindicada en pacientes con infección activa.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PERTUZUMAB

PERJETA 420 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 14 ml

Principio activo: PERTUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FD-INHIBIDORES DEL HER2 (RECEPTOR 2 DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PERTUZUMAB/TRASTUZUMAB

PHESGO 1200 MG/600 MG SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 15 ml

Principio activo: PERTUZUMAB/TRASTUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FY-COMBINACIONES DE ANTICUERPOS MONOCLONALES CON ANTICUERPOS CONJUGADOS CON MEDICAMENTOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Se debe administrar sólo mediante inyección subcutánea. No está destinado a la administración intravenosa.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PHESGO 600 MG/600 MG SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 10 ml

Principio activo: PERTUZUMAB/TRASTUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FY-COMBINACIONES DE ANTICUERPOS MONOCLONALES CON ANTICUERPOS CONJUGADOS CON MEDICAMENTOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Se debe administrar sólo mediante inyección subcutánea. No está destinado a la administración intravenosa.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PETIDINA

DOLANTINA 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 1 ampolla de 2 ml

Principio activo: PETIDINA

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AB-OPIOIDES: DERIVADOS DE FENILPIPERIDINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV-SC

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

En la administración intramuscular no se precisa dilución.

IV: INTRAVENOSA

En la administración intravenosa lenta (1-2 minutos), se diluirá el contenido de la ampolla en 10 ml de S. F 0.9% o S. G al 10%.

SC: SUBCUTANEA

En la administración subcutánea no se precisa dilución.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la petidina o a alguno de los excipientes Niños menores de 6 meses. Insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática grave. Feocromocitoma. Depresión respiratoria aguda. Coma. Aumento de la presión intracraneal o daño cerebral, ya que hay aumento del riesgo de depresión respiratoria que puede provocar una elevación de la presión del líquido cefalorraquídeo. La sedación y cambios en las pupilas producidos pueden interferir con la correcta monitorización del paciente. Intoxicación etílica aguda y delirium tremens. Estados convulsivos. Uso concurrente de inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs) no selectivos (iproniazida, nialamida y fenelzina), selectivos A (moclobemida, toloxatona), selectivos B (selegilina), agonistas-antagonistas morfínicos (buprenorfina, nalbufina, pentazocina) (Ver sección 4.5). El uso de petidina está contraindicado dentro de las dos semanas posteriores a la última toma del inhibidor de la monoaminoxidasa, debido a que puede producirse excitación o depresión aguda del SNC (hipertensión o hipotensión). Uso concurrente de ritonavir por el riesgo de toxicidad derivado del metabolito norpetidina. Cuando existe riesgo de íleo paralítico o en situaciones de diarrea aguda, colitis pseudomembranosa inducida por antibióticos, o diarrea provocada por intoxicaciones (hasta que el material tóxico haya sido eliminado), ya que la administración de hidrocloreuro de petidina puede dificultar el diagnóstico y curso de la enfermedad.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PIRTOBRUTINIB

JAYPIRCA 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: PIRTOBRUTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EL-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DE BRUTON (BTK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El comprimido de Pirtobrutinib se debe tragar entero con un vaso de agua para asegurar un efecto uniforme (los comprimidos no se deben masticar, triturar ni partir antes de tragar) y se puede tomar con o sin alimentos. Los pacientes deben tomar la dosis aproximadamente a la misma hora todos los días.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

POLATUZUMAB

POLIVY 140 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: POLATUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Infecciones graves activas (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

POLIVY 30 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: POLATUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración**IV: INTRAVENOSA**

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Infecciones graves activas (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

POMALIDOMIDA

IMNOVID 3 MG CAPSULAS DURAS 21 cápsulas

Principio activo: POMALIDOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L04AX-OTROS INMUNOSUPRESORES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas duras de Pomalidomida deben tomarse por vía oral a la misma hora cada día. No deben abrirse, romperse ni masticarse y deben tomarse enteras, preferiblemente con agua, con o sin alimentos. Los pacientes no deben ajustar la dosis para compensar una dosis olvidada en días anteriores.

Contraindicaciones

Embarazo. Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo (ver las secciones 4.4 y 4.6). Pacientes varones incapaces de seguir o cumplir las medidas anticonceptivas requeridas (ver sección 4.4). Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

POMALIDOMIDA VIATRIS 4 MG CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas

Principio activo: POMALIDOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L04AX-OTROS INMUNOSUPRESORES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas duras de Pomalidomida deben tomarse por vía oral a la misma hora cada día. No deben abrirse, romperse ni masticarse y deben tomarse enteras, preferiblemente con agua, con o sin

alimentos. Los pacientes no deben ajustar la dosis para compensar una dosis olvidada en días anteriores.

Contraindicaciones

Embarazo. Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo (ver las secciones 4.4 y 4.6). Pacientes varones incapaces de seguir o cumplir las medidas anticonceptivas requeridas (ver sección 4.4). Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PONATINIB

ICLUSIG 15 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: PONATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Ponatinib deben tragarse enteros. Los pacientes no deben aplastar ni disolverlos. Pueden tomarse con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ICLUSIG 30 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 Comprimidos

Principio activo: PONATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Ponatinib deben tragarse enteros. Los pacientes no deben aplastar ni disolverlos. Pueden tomarse con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ICLUSIG 45 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos

Principio activo: PONATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EA-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA BCR-ABL

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Ponatinib deben tragarse enteros. Los pacientes no deben aplastar ni disolverlos. Pueden tomarse con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

POTASIO, ACETATO

ACETATO DE POTASIO B.BRAUN 1 mEq/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 10 ampollas de 10 ml

Principio activo: POTASIO, ACETATO

Datos generales

Grupo terapéutico: A12BA-SUPLEMENTOS MINERALES: POTASIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE OTRAS VIA

Vías de administración

PA: PARENTERAL

El Potasio Acetato se administra por vía intravenosa SOLAMENTE TRAS LA DILUCIÓN. Debe ser añadida a un volumen de solución para perfusión no inferior a 250 ml.

Contraindicaciones

Acetato de Potasio B.Braun 1 mEq/ml no debe utilizarse cuando exista hiperpotasemia, ya que posteriores aumentos de potasio sérico pueden producir parada cardíaca; por otro lado no debe administrarse cuando existen los siguientes problemas médicos: Acidosis metabólica (con oliguria) Enfermedad de Addison no tratada Insuficiencia renal crónica (especialmente en pacientes ancianos. Bloqueo cardíaco severo o completo. Problemas médicos relacionados con traumatismos: quemaduras graves, lesiones traumáticas, infecciones externas, cirugía mayor en las 24 horas previas, o hemodiálisis masiva). Hipoadrenalismo, asociado al síndrome adrenogenital y con deficiencia de mineralcorticoides. Pacientes que están siendo tratados con inhibidores de la aldosterona (espironolactona), diuréticos ahorradores de potasio (triamtereno, amilorida) o en las hiperkaliemias de cualquier etiología.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

POTASIO,CLORURO

CLORURO DE POTASIO BRAUN 2 mEq/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 20 x 20 ml (MP Connect)

Principio activo: POTASIO,CLORURO

Datos generales

Grupo terapéutico: A12BA-SUPLEMENTOS MINERALES: POTASIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

SU: EN SUERO

El Potasio Cloruro se administra por vía intravenosa SOLAMENTE TRAS LA DILUCIÓN.

Contraindicaciones

La administración está contraindicada en las siguientes situaciones: Hipersensibilidad al potasio Insuficiencia adrenal Hipercaliemia Función renal disminuida (insuficiencia renal) Pacientes en tratamiento con digitálicos, con bloqueo cardíaco severo o completo Oliguria postoperatoria Shock con reacciones hemolíticas y/o deshidratación Acidosis metabólica Pacientes tratados con diuréticos ahorradores de potasio

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CLORURO DE POTASIO BRAUN 2 mEq/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 20 x 5 ml (MP Connect)

Principio activo: POTASIO,CLORURO

Datos generales

Grupo terapéutico: A12BA-SUPLEMENTOS MINERALES: POTASIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

SU: EN SUERO

El Potasio Cloruro se administra por vía intravenosa SOLAMENTE TRAS LA DILUCIÓN.

Contraindicaciones

La administración está contraindicada en las siguientes situaciones: Hipersensibilidad al potasio Insuficiencia adrenal Hipercalemia Función renal disminuida (insuficiencia renal) Pacientes en tratamiento con digitálicos, con bloqueo cardíaco severo o completo Oliguria postoperatoria Shock con reacciones hemolíticas y/o deshidratación Acidosis metabólica Pacientes tratados con diuréticos ahorradores de potasio

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

POTASIO,FOSFATO MONOBASICO

POTASIO FOSFATO 1 M MONOBASICO 10mL

Principio activo: POTASIO,FOSFATO MONOBASICO

Datos generales

Grupo terapéutico: A12BA-SUPLEMENTOS MINERALES: POTASIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

El Potasio Fosfato se administra por vía intravenosa SOLAMENTE TRAS LA DILUCIÓN.

Contraindicaciones

Sin contraindicaciones específicas.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

PROCARBAZINA

NATULAN 50 MG CÁPULAS DURAS, 50 cápsulas

Principio activo: PROCARBAZINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XB-OTROS CITOSTÁTICOS: METILHIDRAZINAS

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Procarbazina no se deben abrir, romper ni masticar. Las cápsulas se deben tomar enteras, con un vaso de agua, con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes mencionados en la sección 6.1. Leucopenia y trombocitopenia graves preexistente, por cualquier causa. Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática grave. Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PROPOFOL

PROPOFOL BAXTER 10MG/ML EMULSION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG 5 viales de 20 ml

Principio activo: PROPOFOL

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AX-OTROS ANESTÉSICOS GENERALES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria: Sin diluir.

UNIDADES: mg/kg/h.

Contraindicaciones

Propofol Baxter no se debe usar En pacientes con hipersensibilidad conocida al principio activo, a la soja, al cacahuete, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. para la sedación en cuidados intensivos de pacientes de 16 años o menores (ver sección 4.4).

Observaciones

Cambiar sistemas de gotero c/12 h o máximo 24 h. Puede teñir de verde la orina. Cada ml de emulsión de Propofol contiene 50 mg de aceite de soja refinado.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PROPOFOL LIPOVEN FRESENIUS 10 mg/ml EMULSION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 10 viales de 50 ml

Principio activo: PROPOFOL

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AX-OTROS ANESTÉSICOS GENERALES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria: Sin diluir.

UNIDADES: mg/kg/h.

Contraindicaciones

Propofol está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al propofol o a alguno de los excipientes, incluidos en la sección 6.1. Propofol Lipoven Fresenius contiene aceite de soja. No debe utilizarse en caso de alergia al cacahuete o a la soja Propofol no debe utilizarse en pacientes de 16 años y menores para la sedación de cuidados intensivos (ver sección 4.4).

Observaciones

Cambiar sistemas de gotero c/12 h o máximo 24 h. Puede teñir de verde la orina. Cada ml de emulsión de Propofol contiene 50 mg de aceite de soja refinado.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PROPOFOL LIPOVEN FRESENIUS 20 mg/ml EMULSION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 10 viales de 50 ml

Principio activo: PROPOFOL

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AX-OTROS ANESTÉSICOS GENERALES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria: Sin diluir.

UNIDADES: mg/kg/h.

Contraindicaciones

Propofol está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al propofol o a alguno de los excipientes, incluidos en la sección 6.1. Propofol Lipoven Fresenius contiene aceite de soja. No debe utilizarse en caso de alergia al cacahuete o a la soja. Propofol no debe utilizarse en pacientes de 16 años y menores para la sedación de cuidados intensivos (ver sección 4.4).

Observaciones

Cambiar sistemas de gotero c/12 h o máximo 24 h. Puede teñir de verde la orina. Cada ml de emulsión de Propofol contiene 50 mg de aceite de soja refinado.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PROPOFOL LIPURO 10 mg/ml EMULSIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN , 1 vial de 100 ml

Principio activo: PROPOFOL

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AX-OTROS ANESTÉSICOS GENERALES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Perfusión Continua Hospitalaria: Sin diluir.

UNIDADES: mg/kg/h.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, soja, cacahuete o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Propofol Lipuro no debe usarse en pacientes de 16 años o menores para la sedación para cuidados intensivos. No se ha demostrado la seguridad y la eficacia en estos grupos de edad (sección 4.4).

Observaciones

Cambiar sistemas de gotero c/12 h o máximo 24 h. Puede teñir de verde la orina. Cada ml de emulsión de Propofol contiene 50 mg de aceite de soja refinado.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

PROTEINA C

CEPROTIN 500 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial + 1 vial de disolvente

Principio activo: PROTEINA C

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AD-ANTITROMBÓTICOS: ENZIMAS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La Proteína C Purificada se administra por inyección intravenosa después de la reconstitución del polvo para solución inyectable con agua esterilizada para preparaciones inyectables.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, a la proteína de ratón o a la heparina, excepto en el control de complicaciones trombóticas con riesgo vital.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RALTITREXED

TOMUDEX 2 MG POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 1 vial

Principio activo: RALTITREXED

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BA-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DEL ÁCIDO FÓLICO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 no debe utilizarse durante el embarazo, en mujeres que se puedan quedar embarazadas durante el tratamiento, o durante el período de lactancia. Se deberá descartar la existencia de embarazo antes de iniciar el tratamiento con raltitrexed (ver sección 4.6). pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 25ml/min). La administración concomitante con leucovorina (ácido folínico), ácido fólico o preparados vitamínicos que contengan estos compuestos (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RAMUCIRUMAB

CYRAMZA 10 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION 1 vial de 50 ml

Principio activo: RAMUCIRUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FG-INHIBIDORES DEL VEGF/VEGFR

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Para pacientes con CPNM, ramucirumab está contraindicado donde haya cavitación del tumor o afectación tumoral de los grandes vasos sanguíneos (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

CYRAMZA 10 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml

Principio activo: RAMUCIRUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FG-INHIBIDORES DEL VEGF/VEGFR

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Para pacientes con CPNM, ramucirumab está contraindicado donde haya cavitación del tumor o afectación tumoral de los grandes vasos sanguíneos (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

REGORAFENIB

STIVARGA 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 3x28 comprimidos

Principio activo: REGORAFENIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Regorafenib se debe tomar todos los días a la misma hora. Los comprimidos se deben tomar enteros con agua después de una comida ligera con un contenido menor del 30% en grasa.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

REMIFENTANILO

REMIFENTANILO SALA 1 mg POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION INYECTABLE O PERFUSION EFG, 5 viales

Principio activo: REMIFENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AH-ANESTÉSICOS GENERALES: ANESTÉSICOS OPIOIDES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Puede administrarse inyecciones complementarias en bolo lento en no menos de 30 segundos cada 2 a 5 minutos.

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

5 mg en 100 mL SF, SG5%

Concentración total: 5 mg en 100 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 0.025-1

Contraindicaciones

Como en la composición de Remifentanilo Sala hay glicina, está contraindicada la administración mediante inyección epidural e intratecal. La administración de Remifentanilo Sala está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al principio activo, a otros análogos de fentanilo o a alguno de los excipientes listados en la sección 6.1. Está contraindicada la utilización de Remifentanilo Sala como único medicamento para la inducción en anestesia.

Observaciones

No se debe administrar por inyección epidural o intratecal. Debido a la rápida neutralización de acción de Remifentanilo, no quedará actividad opioide residual en los 5-10 minutos siguientes a la interrupción de la administración. La conservación de la perfusión es a temperatura ambiente y la estabilidad es 24 h.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

REMIFENTANILO SALA 2 mg POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION INYECTABLE O PERFUSION EFG, 5 viales

Principio activo: REMIFENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AH-ANESTÉSICOS GENERALES: ANESTÉSICOS OPIOIDES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración**IV: INTRAVENOSA**

Puede administrarse inyecciones complementarias en bolo lento en no menos de 30 segundos cada 2 a 5 minutos.

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

5 mg en 100 mL SF, SG5%

Concentración total: 5 mg en 100 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 0.025-1

Contraindicaciones

Como en la composición de Remifentanilo Sala hay glicina, está contraindicada la administración mediante inyección epidural e intratecal. La administración de Remifentanilo Sala está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al principio activo, a otros análogos de fentanilo o a alguno de los excipientes listados en la sección 6.1. Está contraindicada la utilización de Remifentanilo Sala como único medicamento para la inducción en anestesia.

Observaciones

No se debe administrar por inyección epidural o intratecal. Debido a la rápida neutralización de acción de Remifentanilo, no quedará actividad opioide residual en los 5-10 minutos siguientes a la interrupción de la administración. La conservación de la perfusión es a temperatura ambiente y la estabilidad es 24 h.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ULTIVA 5 mg POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 5 viales

Principio activo: REMIFENTANILO

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AH-ANESTÉSICOS GENERALES: ANESTÉSICOS OPIOIDES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Puede administrarse inyecciones complementarias en bolo lento en no menos de 30 segundos cada 2 a 5 minutos.

PF: PERFUSIÓN

Perfusión Continua Hospitalaria:

5 mg en 100 mL SF, SG5%

Concentración total: 5 mg en 100 mL.

UNIDADES: mcg/kg/min Rango: 0.025-1

Contraindicaciones

Como en la composición de Ultiva hay glicina, está contraindicada la administración mediante inyección epidural e intratecal (ver sección 5.3). Ultiva está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo, a otros análogos de fentanilo o a alguno de los excipientes

listados en la sección 6.1. Está contraindicada la utilización de Ultiva como único medicamento para la inducción en anestesia.

Observaciones

No se debe administrar por inyección epidural o intratecal. Debido a la rápida neutralización de acción de Remifentanilo, no quedará actividad opioide residual en los 5-10 minutos siguientes a la interrupción de la administración. La conservación de la perfusión es a temperatura ambiente y la estabilidad es 24 h.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RIBOCICLIB

KISQALI 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 63 comprimidos (PVC/PCTFE)

Principio activo: RIBOCICLIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EF-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEPENDIENTE DE CICLINA (CDK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Ribociclib se debe tomar por vía oral una vez al día con o sin comida (ver sección 4.5). Se debe recomendar a los pacientes que tomen su dosis aproximadamente a la misma hora cada día, preferiblemente por la mañana. Si el paciente vomita después de tomar la dosis o bien si se olvida de tomar una dosis, no debe tomar una dosis adicional aquel día. Se debe tomar la siguiente dosis prescrita a la hora habitual. Los comprimidos se deben tragar enteros y no se deben masticar, triturar o partir antes de tragar. No se debe ingerir ningún comprimido si está roto, agrietado o que no esté intacto.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a cacahuetes, soja o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RITUXIMAB

MABTHERA 100 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 2 viales de 10 ml

Principio activo: RITUXIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FA-INHIBIDORES DE CD20 (GRUPO DE DIFERENCIACIÓN 20)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

La solución preparada de Rituximab se debe administrar como perfusión intravenosa empleando una vía específica. No se debe administrar como inyección intravenosa o bolo.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a proteínas murinas, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Infecciones graves y activas (ver sección 4.4). Pacientes en un estado inmunocomprometido grave Insuficiencia cardíaca grave (clase IV de la New York Heart Association) o enfermedades cardíacas graves no controladas para el uso en artritis reumatoide, granulomatosis con poliangeítis, poliangeítis microscópica y pénfigo vulgar únicamente (ver sección 4.4 sobre otros trastornos cardiovasculares).

Observaciones

Es importante comprobar los etiquetados del medicamento para asegurar que se administra al paciente la formulación adecuada (formulación intravenosa o subcutánea), como se haya prescrito.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RUXIENCE 500 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 50 ml

Principio activo: RITUXIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FA-INHIBIDORES DE CD20 (GRUPO DE DIFERENCIACIÓN 20)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

La solución preparada de Rituximab se debe administrar como perfusión intravenosa empleando una vía específica. No se debe administrar como inyección intravenosa o bolo.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a las proteínas de ratón, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Infecciones graves y activas (ver sección 4.4). Pacientes gravemente inmunodeprimidos. Insuficiencia cardíaca grave (clase IV de la Asociación de Cardiología de Nueva York) o enfermedad cardíaca grave no controlada para el uso en artritis reumatoide, granulomatosis con poliangéitis, poliangéitis microscópica y pénfigo vulgar únicamente (ver sección 4.4 sobre otras enfermedades cardiovasculares).

Observaciones

Es importante comprobar los etiquetados del medicamento para asegurar que se administra al paciente la formulación adecuada (formulación intravenosa o subcutánea), como se haya prescrito.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RITUXIMAB SC

MABTHERA 1400 MG SOLUCION PARA INYECCION SUBCUTANEA, 1 vial de 11,7 ml (120 mg/ml)

Principio activo: RITUXIMAB SC

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FA-INHIBIDORES DE CD20 (GRUPO DE DIFERENCIACIÓN 20)

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

La formulación de Rituximab 1400 mg subcutáneo sólo se debe administrar como inyección subcutánea, aproximadamente en 5 minutos en el abdomen, y nunca en zonas donde la piel está enrojecida, amoratada, blanda, dura o en zonas donde haya lunares o cicatrices.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a proteínas murinas, hialuronidasa, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Infecciones graves y activas (ver sección 4.4). Pacientes en un estado inmunocomprometido grave.

Observaciones

Es importante comprobar los etiquetados del medicamento para asegurar que se administra al paciente la formulación adecuada (formulación intravenosa o subcutánea), como se haya prescrito.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RIVAROXABAN

XARELTO 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 comprimidos

Principio activo: RIVAROXABAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AF-INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTO XA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos. Para aquellos pacientes que no puedan tragar el comprimido entero, el comprimido de Rivaroxaban puede triturarse y mezclarse con agua o con puré de manzana inmediatamente antes de su uso y administrarse por vía oral. El comprimido triturado también se puede administrar a través de sonda gástrica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hemorragia activa, clínicamente significativa. Lesión o enfermedad, si se considera que tiene un riesgo significativo de hemorragia mayor. Esto puede incluir úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de hemorragia, traumatismo cerebral o espinal

reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores. Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, p. ej. heparina no fraccionada (HNF), heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, dabigatran etexilato, apixaban, etc.) excepto bajo las circunstancias concretas de cambio de tratamiento anticoagulante (ver sección 4.2) o cuando se administre HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central abierto (ver sección 4.5). Hepatopatía, asociada a coagulopatía y a riesgo clínicamente relevante de hemorragia incluidos los pacientes cirróticos con Child Pugh B y C (ver sección 5.2). Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

XARELTO 15 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (100 COMPRIMIDOS), 100 comprimidos

Principio activo: RIVAROXABAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AF-INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTO XA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos deben administrarse con alimentos.

Para aquellos pacientes que no puedan tragar el comprimido entero, el comprimido de Rivaroxaban puede triturarse y mezclarse con agua o con puré de manzana inmediatamente antes de su uso y administrarse por vía oral. Inmediatamente después de la administración del comprimido triturado se debe administrar el alimento. El comprimido triturado también se puede administrar a través de sonda gástrica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hemorragia activa clínicamente significativa. Lesión o enfermedad, si se considera que tiene un riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, traumatismo cerebral o espinal reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores. Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, p. ej. heparina no fraccionada (HNF), heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina,

etc.), derivados de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, dabigatran etexilato, apixaban, etc.) excepto bajo las circunstancias concretas de cambio de tratamiento anticoagulante (ver sección 4.2) o cuando se administre HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central abierto (ver sección 4.5). Hepatopatía asociada a coagulopatía y con riesgo clínicamente relevante de hemorragia, incluidos los pacientes cirróticos con Child Pugh B y C (ver sección 5.2). Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

XARELTO 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (100 COMPRIMIDOS), 100 comprimidos

Principio activo: RIVAROXABAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AF-INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTO XA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos deben administrarse con alimentos.

Para aquellos pacientes que no puedan tragar el comprimido entero, el comprimido de Rivaroxaban puede triturarse y mezclarse con agua o con puré de manzana inmediatamente antes de su uso y administrarse por vía oral. Inmediatamente después de la administración del comprimido triturado se debe administrar el alimento. El comprimido triturado también se puede administrar a través de sonda gástrica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hemorragia activa clínicamente significativa. Lesión o enfermedad, si se considera que tiene un riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, traumatismo cerebral o espinal reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores. Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, p. ej. heparina no fraccionada (HNF), heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, dabigatran etexilato, apixaban, etc.) excepto bajo las circunstancias concretas de cambio de tratamiento anticoagulante (ver sección 4.2) o cuando se administre HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central abierto (ver sección 4.5). Hepatopatía asociada a coagulopatía y con

riesgo clínicamente relevante de hemorragia, incluidos los pacientes cirróticos con Child Pugh B y C (ver sección 5.2). Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ROCURONIO BROMURO

ESMERON 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 10 viales de 5 ml

Principio activo: ROCURONIO BROMURO

Datos generales

Grupo terapéutico: M03AC-OTROS COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

El Rocuronio se administra por vía intravenosa, tanto mediante inyección en bolo como mediante perfusión continua según los protocolos anestésicos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo (rocuronio o al ión bromuro) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ROCURONIO B. BRAUN 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG, 20 ampolla de 5 ml

Principio activo: ROCURONIO BROMURO

Datos generales

Grupo terapéutico: M03AC-OTROS COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

El Rocuronio se administra por vía intravenosa, tanto mediante inyección en bolo como mediante perfusión continua según protocolos anestésicos.

Contraindicaciones

Bromuro de rocuronio está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al rocuronio o al ion bromuro o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RUCAPARIB

RUBRACA 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: RUCAPARIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XK-INHIBIDORES DE LA POLI (ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Rucaparib se debe usar por vía oral y se puede tomar con o sin alimentos. Las dosis deben tomarse aproximadamente con una separación de 12 horas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RUBRACA 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: RUCAPARIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XK-INHIBIDORES DE LA POLI (ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El Rucaparib se debe usar por vía oral y se puede tomar con o sin alimentos. Las dosis deben tomarse aproximadamente con una separación de 12 horas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RUXOLITINIB

JAKAVI 10 MG COMPRIMIDOS, 56 comprimidos

Principio activo: RUXOLITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EJ-INHIBIDORES DE LA QUINASA ASOCIADA A JANUS (JAK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Ruxolitinib se administra por vía oral, con o sin comida.

Si se olvida una dosis, el paciente no debe tomar una dosis adicional, sino que debe tomar la próxima dosis según la pauta prescrita.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

JAKAVI 15 MG COMPRIMIDOS, 56 comprimidos

Principio activo: RUXOLITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EJ-INHIBIDORES DE LA QUINASA ASOCIADA A JANUS (JAK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Ruxolitinib se administra por vía oral, con o sin comida.

Si se olvida una dosis, el paciente no debe tomar una dosis adicional, sino que debe tomar la próxima dosis según la pauta prescrita.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

JAKAVI 20 MG COMPRIMIDOS, 56 comprimidos

Principio activo: RUXOLITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EJ-INHIBIDORES DE LA QUINASA ASOCIADA A JANUS (JAK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Ruxolitinib se administra por vía oral, con o sin comida.

Si se olvida una dosis, el paciente no debe tomar una dosis adicional, sino que debe tomar la próxima dosis según la pauta prescrita.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

JAKAVI 5 MG COMPRIMIDOS, 56 comprimidos

Principio activo: RUXOLITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EJ-INHIBIDORES DE LA QUINASA ASOCIADA A JANUS (JAK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Ruxolitinib se administra por vía oral, con o sin comida.

Si se olvida una dosis, el paciente no debe tomar una dosis adicional, sino que debe tomar la próxima dosis según la pauta prescrita.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

JAKAVI 5 MG/ML SOLUCION ORAL, 1 frasco de 60 ml

Principio activo: RUXOLITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EJ-INHIBIDORES DE LA QUINASA ASOCIADA A JANUS (JAK)

Forma farmacéutica: JARABE

Vías de administración**OR: ORAL**

Ruxolitinib se administra por vía oral, con o sin comida.

Si se olvida una dosis, el paciente no debe tomar una dosis adicional, sino que debe tomar la próxima dosis según la pauta prescrita.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SACITUZUMAB GOVITECAN

TRODELVY 200 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: SACITUZUMAB GOVITECAN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SELINEXOR

NEXPOVIO 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos

Principio activo: SELINEXOR

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

El comprimido se debe tragar entero acompañado de agua. No se debe aplastar, masticar, romper ni dividir para evitar el riesgo de que el principio activo produzca irritación de la piel. Se puede tomar con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SELPERCATINIB**RETSEVMO 40 mg CAPSULAS DURAS, 56 cápsulas**

Principio activo: SELPERCATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración**OR:** ORAL

Las cápsulas se deben tragar enteras (los pacientes no deben abrir, aplastar o masticar la cápsula antes de tragarla) y se pueden tomar con o sin alimentos. Los pacientes deben tomar las dosis aproximadamente a la misma hora todos los días.

Debe ir acompañado de una comida si se utiliza de forma concomitante con un Inhibidor de la bomba de protones y se debe administrar 2 horas antes o 10 horas después que los Antagonistas de los receptores H2.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

RETSEVMO 80 mg CAPSULAS DURAS, 112 cápsulas

Principio activo: SELPERCATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas se deben tragar enteras (los pacientes no deben abrir, aplastar o masticar la cápsula antes de tragarla) y se pueden tomar con o sin alimentos. Los pacientes deben tomar las dosis aproximadamente a la misma hora todos los días.

Debe ir acompañado de una comida si se utiliza de forma concomitante con un Inhibidor de la bomba de protones y se debe administrar 2 horas antes o 10 horas después que los Antagonistas de los receptores H2.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SELUMETINIB

KOSELUGO 10 mg CAPSULAS DURAS, 60 capsulas

Principio activo: SELUMETINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EE-INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA ACTIVADA POR MITÓGENOS (MEK)

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN

Vías de administración

OR: ORAL

Se puede tomar con o sin alimentos. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua. Las cápsulas no se deben masticar, disolver ni abrir, ya que esto podría alterar la liberación del fármaco y afectar a la

absorción de Selumetinib. No se debe administrar a pacientes que no puedan o no quieran tragar la cápsula entera.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Insuficiencia hepática grave (ver las secciones 4.2 y 5.2).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

KOSELUGO 25 mg CAPSULAS DURAS, 60 capsulas

Principio activo: SELUMETINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EE-INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA ACTIVADA POR MITÓGENOS (MEK)

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN

Vías de administración

OR: ORAL

Se puede tomar con o sin alimentos. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua. Las cápsulas no se deben masticar, disolver ni abrir, ya que esto podría alterar la liberación del fármaco y afectar a la absorción de Selumetinib. No se debe administrar a pacientes que no puedan o no quieran tragar la cápsula entera.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Insuficiencia hepática grave (ver las secciones 4.2 y 5.2).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SEVOFLURANO

SEVOFLURANO BAXTER 100% LIQUIDO PARA INHALACION DEL VAPOR EFG, 6 frascos de 250 ml

Principio activo: SEVOFLURANO

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AB-ANESTÉSICOS GENERALES: HIDROCARBUROS HALOGENADOS

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN PARA INHALA

Vías de administración

IH: INHALATORIA

Líquido para inhalación del vapor mediante el uso de un vaporizador calibrado específicamente para Sevoflurano.

Contraindicaciones

Sevoflurano no debe ser utilizado en pacientes con hipersensibilidad, conocida o sospechada, al sevoflurano o a otros anestésicos halogenados (por ejemplo, historial de trastorno de la función hepática, fiebre o leucocitosis de origen desconocido después de la anestesia con uno de estos agentes). Sevoflurano no debe ser utilizado en pacientes con historial confirmado de hepatitis debido al uso de anestésicos halogenados de inhalación o con historial de disfunción hepática de moderada a grave sin explicación con ictericia, fiebre y eosinofilia tras la anestesia con sevoflurano. Sevoflurano no debe ser utilizado en pacientes con susceptibilidad genética, conocida o sospechada, a hipertermia maligna. Sevoflurano está contraindicado en pacientes que tengan contraindicada la anestesia general.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SODIO,CITRATO

CIFOBAN 136 MMOL/L SOLUCION PARA PERFUSION, 8 bolsas de 1.500 ml (PP/elastómero + sistema conector Safe-Lock)

Principio activo: SODIO,CITRATO

Datos generales

Grupo terapéutico: B05ZB-HEMOFILTRADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Uso extracorporal. Sólo para perfusión en el circuito extracorporal sanguíneo.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Metabolismo gravemente alterado del citrato (ver sección 4.4. Acumulación de citrato debido a alteraciones del metabolismo).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SODIO,CLORURO (ELECTROLITO)

BIPHOZYL SOLUCION PARA HEMODIALISIS/HEMOFILTRACION, 2 bolsas de 5000 ml

Principio activo: SODIO,CLORURO (ELECTROLITO)

Datos generales

Grupo terapéutico: B05ZB-HEMOFILTRADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Uso intravenoso y uso en hemodiálisis.

Cuando se utiliza como solución de sustitución se administra en el circuito extracorpóreo antes (pre dilución) o después (post dilución) del hemofiltro o hemodiafiltro.

Cuando se utiliza como dializado, se administra en el compartimento del líquido de diálisis del filtro extracorpóreo, separado del flujo sanguíneo por una membrana semipermeable.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hipocalcemia salvo que se administre calcio al paciente por otras fuentes. Hiperpotasemia. Hiperfosfatemia.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

COLORURO DE SODIO B. BRAUN 20% CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 20 ampollas de 10 ml (Connect)

Principio activo: SODIO,COLORURO (ELECTROLITO)

Datos generales

Grupo terapéutico: B05X-ADITIVOS DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Uso por vía intravenosa exclusivamente tras dilución o adición a soluciones parenterales adecuadas.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 - Hipernatremia - Hipercloremia

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HEMOSOL B0 SOLUCION PARA HEMOFILTRACION Y HEMODIALISIS , 2 bolsas de 5.000 ml

Principio activo: SODIO,CLORURO (ELECTROLITO)

Datos generales

Grupo terapéutico: B05ZB-HEMOFILTRADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Vía intravenosa y para hemodiálisis.

Cuando se utilice como solución de sustitución, éste se administra en el circuito extracorpóreo antes (predilución) o después (posdilución) del hemofiltro o hemodiafiltro.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

REGIOCIT SOLUCION PARA HEMOFILTRACION , 2 bolsas de 5000 ml

Principio activo: SODIO,CLORURO (ELECTROLITO)

Datos generales

Grupo terapéutico: B05ZB-HEMOFILTRADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Para uso intravenoso debe utilizarse con un equipo de reemplazo renal extracorpóreo adecuado indicado para la TRRC solo en modalidad de predilución, utilizando una bomba específica para anticoagulación con citrato en la que el flujo de solución se adapta automáticamente basándose en una dosis objetivo fijada por el operador (mmol citrato/l sangre).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Insuficiencia hepática grave Shock con hipoperfusión muscular

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SODIO CLORURO SODICO 20% 100 mL(QUISTE HIDATIDICO)

Principio activo: SODIO,CLORURO (ELECTROLITO)

Datos generales

Grupo terapéutico: P02DX-OTROS ANTICESTODOS

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN TÓPICA

Vías de administración

SD: SIN DEFINIR

El Cloruro Sódico 20% es una solución de elevada osmolaridad (6838 mOsm/L) utilizado por vía percutánea como escolicida en la extirpación quirúrgica de los quistes hidatídicos.

TO: TÓPICA

Contraindicaciones

Sin contraindicaciones específicas.

Observaciones

Dispensar solamente para el quirófano o unidad específica autorizada. Almacenar en lugares separados de las soluciones de fluidoterapia y de otras soluciones intravenosas.

Incluir una etiqueta adicional bien visible que indique "No administrar por vía intravenosa".

SONIDEGIB

ODOMZO 200 MG CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas

Principio activo: SONIDEGIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XJ-INHIBIDORES DE LA RUTA HEDGEHOG

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Sonidegib deben tragarse enteras. No se deben masticar ni triturar. No se deben abrir las cápsulas debido al riesgo de teratogenicidad. Se debe tomar como mínimo dos horas después de una comida y al menos una hora antes de la siguiente comida para prevenir el aumento del riesgo de aparición de reacciones adversas debidas a una mayor exposición de Sonidegib cuando se toma con comidas. Si se producen vómitos durante el curso del tratamiento, no se permite una redosificación del paciente antes de la siguiente dosis prescrita.

Si se olvida una dosis, se la debe tomar tan pronto como se dé cuenta, a no ser que hayan transcurrido más de seis horas desde la hora establecida; en este caso, el paciente se debe esperar y tomar la siguiente dosis prescrita.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Embarazo y lactancia (ver las secciones 4.4 y 4.6). Mujeres en edad fértil que no cumplen con el Programa de Prevención del Embarazo de Odomzo (ver las secciones 4.4 y 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SORAFENIB**SORAFENIB ACCORD 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 112 comprimidos**

Principio activo: SORAFENIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración**OR:** ORAL

Se recomienda administrar Sorafenib fuera de las comidas o con una comida moderada o baja en grasas. Si el paciente tiene intención de tomar una comida rica en grasas, deben administrarse los comprimidos de Sorafenib al menos 1 hora antes o 2 horas después de la comida. Los comprimidos deben tomarse con un vaso de agua.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SOTORASIB

LUMYKRAS 240 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 120 comprimidos

Principio activo: SOTORASIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Sotorasib se administran por vía oral una vez al día, a la misma hora con o sin alimentos. Se deben tragar enteros pero en pacientes con dificultades para tragar alimentos sólidos sí se pueden dispersar en agua. Se puede administrar a través de una sonda nasogástrica (NG) o una sonda de gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) dispersos en agua.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SUNITINIB

SUNITINIB VIATRIS 12,5 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 cápsulas

Principio activo: SUNITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Puede tomarse con o sin alimentos.

Si el paciente olvida tomar una dosis, no se le debe administrar una dosis adicional. El paciente debe tomar la dosis prescrita habitual al día siguiente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SUNITINIB VIATRIS 25 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 cápsulas

Principio activo: SUNITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Puede tomarse con o sin alimentos.

Si el paciente olvida tomar una dosis, no se le debe administrar una dosis adicional. El paciente debe tomar la dosis prescrita habitual al día siguiente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SUNITINIB VIATRIS 50 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 càpsulas

Principio activo: SUNITINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EX-OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEIN-QUINASA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Puede tomarse con o sin alimentos.

Si el paciente olvida tomar una dosis, no se le debe administrar una dosis adicional. El paciente debe tomar la dosis prescrita habitual al día siguiente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SUXAMETONIO,CLORURO

SUXAMETONIO ETHYPHARM 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG, 10 ampollas de 2 ml

Principio activo: SUXAMETONIO,CLORURO

Datos generales

Grupo terapéutico: M03AB-MIORRELAJANTES: DERIVADOS DE LA COLINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

El Cloruro de Suxametonio puede administrarse mediante inyección en bolus o perfusión intravenosa como solución al 0,1% o al 0,2%, diluida en SF o SG5%. La velocidad de perfusión debe ajustarse en función de la respuesta de cada paciente y no se debe superar la dosis total de Cloruro de Suxametonio de 500 mg.

Contraindicaciones

Suxametonio no tiene efecto alguno sobre el nivel de consciencia y, por lo tanto, no debe ser administrado a un paciente que no esté completamente anestesiado. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes personales o familiares de hipertermia maligna (ver sección 4.4). Actividad de la colinesterasa plasmática atípica hereditaria (ver sección 4.4). Actividad de la pseudocolinesterasa plasmática anormal. Hiperpotasemia por cualquier causa (ver sección 4.4). Distrofia muscular y otras miopatías, p. ej., distrofia muscular de Duchenne. Antecedentes personales o familiares de enfermedades miotónicas congénitas, tales como miotonía congénita y distrofia miotónica.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

ZENNUX 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 10 jeringas precargadas de 10 ml

Principio activo: SUXAMETONIO,CLORURO

Datos generales

Grupo terapéutico: M03AB-MIORRELAJANTES: DERIVADOS DE LA COLINA

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La jeringa precargada de Suxametonio se debe administrar por vía intravenosa y no es apropiada para uso en una bomba de jeringa.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Suxametonio no tiene ningún efecto sobre el nivel de consciencia y no debe ser administrado en pacientes que no estén bajo anestesia general (ver sección 4.2). Antecedentes personales o familiares de hipertermia maligna. Suxametonio puede provocar contracciones miofibrilares sostenidas en individuos susceptibles (ver sección 4.4). Los pacientes con una actividad de la colinesterasa

(butirilcolinesterasa) plasmática atípica hereditaria conocida (antecedentes de respuesta prolongada y/o intensificada previa - ver sección 4.4). Pacientes con o propensos a la hiperpotasemia (ver sección 4.4). Suxametonio está contraindicado en pacientes: con hiperpotasemia pre-existente. En ausencia de hiperpotasemia y neuropatía, la insuficiencia renal no es una contraindicación para la administración de una dosis única normal de inyección de suxametonio, pero dosis múltiples o más altas pueden causar aumentos clínicamente significativos en el potasio sérico, y no se deben utilizar. que se estén recuperando de un traumatismo grave o quemaduras graves. El periodo de mayor riesgo de hiperpotasemia puede prolongarse más, si existe una infección persistente que retrasa la cicatrización. con déficits neurológicos y pérdida muscular aguda importante (p. ej. lesiones de neuronas motoras superiores y/o inferiores); el potencial para la liberación de potasio se produce dentro de los primeros 6 meses después del comienzo agudo del déficit neurológico y está correlacionado con el grado y extensión de la parálisis muscular. Los pacientes que hayan estado inmovilizados durante períodos de tiempo prolongados pueden tener un riesgo similar. Pacientes con miopatías musculares esqueléticas (p.ej. distrofia muscular de Duchenne), ya que la administración de suxametonio puede estar asociada con hipertermia maligna, arritmia ventricular y parada cardíaca secundaria a rabdomiólisis aguda con hiperpotasemia. Antecedentes personales o familiares de enfermedades miotónicas congénitas, tales como miotonía congénita y distrofia miotónica (riesgo de espasmos miotónicos graves y rigidez). Suxametonio produce un aumento transitorio significativo de la presión intraocular y, por lo tanto, no debe ser utilizado cuando existen lesiones oculares abiertas o cuando el aumento de la presión intraocular sea indeseable, a menos que el beneficio esperado de su uso supere el riesgo potencial para el ojo.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TAFASITAMAB

MINJUVI 200 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: TAFASITAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TALIDOMIDA

TALIDOMIDA 100 MG CAPS

Principio activo: TALIDOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L04AX-OTROS INMUNOSUPRESORES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

La Talidomida se debe tomar en una sola dosis al acostarse para reducir así el impacto de la somnolencia. Las cápsulas no se deben abrir o triturar.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a talidomida o a alguno de los excipientes.
- Mujeres que estén embarazadas.
- Mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan todas las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo.
- Pacientes varones que no puedan seguir o cumplir las medidas anticonceptivas necesarias.

Observaciones

Talidomida es un potente teratógeno en humanos, que provoca muy frecuentemente defectos congénitos graves y con peligro para la vida. No debe utilizarse nunca en mujeres embarazadas o en mujeres que puedan quedarse embarazadas.

TALQUETAMAB

TALVEY 2 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 1,5 ml

Principio activo: TALQUETAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TALVEY 40 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 1 ml

Principio activo: TALQUETAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TECLISTAMAB

TECVAYLI 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 3 ml

Principio activo: TECLISTAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TECVAYLI 90 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 1,7 ml

Principio activo: TECLISTAMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TEGAFUR

UTEFOS 400 mg CAPSULAS DURAS , 60 cápsulas

Principio activo: TEGAFUR

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas deben tomarse al menos una hora antes o una hora después de las comidas.

Se recomienda no administrar Tegafur con zumo de pomelo.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a tegafur a 5-fluorouracilo (5-FU) o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Mujeres embarazadas o durante periodo de lactancia. Adolescentes, niños y lactantes. Pacientes con depresión de la médula ósea (leucopenia, neutropenia o trombocitopenia graves). Pacientes con insuficiencia hepática grave Pacientes con déficit conocido de CYP2A6 hepático. Deficiencia completa conocida de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) (ver sección 4.4). Pacientes que son tratados en la actualidad o han sido tratados reciente o concomitante con brivudina (ver secciones 4.4 y 4.5 para interacción medicamentosa).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TEMOZOLOMIDA

TEMODAL 100 MG CAPSULAS DURAS, 5 cápsulas

Principio activo: TEMOZOLOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AX-OTROS AGENTES ALQUILANTES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración**OR:** ORAL

Temozolomida cápsulas duras debe administrarse en estado de ayuno. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua y no deben abrirse o masticarse.

Si después de la administración de la dosis se produce vómito, no debe administrarse una segunda dosis ese día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hipersensibilidad a la dacarbazina (DTIC). Mielosupresión severa (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TEMODAL 140 MG CAPSULAS DURAS, 20 cápsulas

Principio activo: TEMOZOLOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AX-OTROS AGENTES ALQUILANTES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Temozolomida cápsulas duras debe administrarse en estado de ayuno. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua y no deben abrirse o masticarse.

Si después de la administración de la dosis se produce vómito, no debe administrarse una segunda dosis ese día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Hipersensibilidad a la dacarbazina (DTIC). Mielosupresión severa (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TEMODAL 180 MG CAPSULAS DURAS, 5 cápsulas

Principio activo: TEMOZOLOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AX-OTROS AGENTES ALQUILANTES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Temozolomida cápsulas duras debe administrarse en estado de ayuno. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua y no deben abrirse o masticarse.

Si después de la administración de la dosis se produce vómito, no debe administrarse una segunda dosis ese día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a la dacarbazina (DTIC). Mielosupresión severa (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TEMODAL 20 MG CAPSULAS DURAS, 5 cápsulas

Principio activo: TEMOZOLOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AX-OTROS AGENTES ALQUILANTES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Temozolomida cápsulas duras debe administrarse en estado de ayuno. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua y no deben abrirse o masticarse.

Si después de la administración de la dosis se produce vómito, no debe administrarse una segunda dosis ese día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipersensibilidad a la dacarbazina (DTIC). Mielosupresión severa (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TEMOZOLOMIDA SUN 250 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas

Principio activo: TEMOZOLOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AX-OTROS AGENTES ALQUILANTES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Temozolomida cápsulas duras debe administrarse en estado de ayuno. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua y no deben abrirse o masticarse.

Si después de la administración de la dosis se produce vómito, no debe administrarse una segunda dosis ese día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a algunos de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Hipersensibilidad a la dacarbazina (DTIC). Mielosupresión grave (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

Temozolomida SUN 5 mg capsulas duras EFG, 5 cápsulas

Principio activo: TEMOZOLOMIDA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AX-OTROS AGENTES ALQUILANTES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Temozolomida cápsulas duras debe administrarse en estado de ayuno. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua y no deben abrirse o masticarse.

Si después de la administración de la dosis se produce vómito, no debe administrarse una segunda dosis ese día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a algunos de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Hipersensibilidad a la dacarbazina (DTIC). Mielosupresión grave (ver sección 4.4).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TENECTEPLASA

METALYSE 10.000 UNIDADES (50 MG) POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial + 1 jeringa precargada de disolvente

Principio activo: TENECTEPLASA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AD-ANTITROMBÓTICOS: ENZIMAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La solución reconstituida debe administrarse por vía intravenosa y es para uso inmediato. La solución reconstituida es una solución transparente y entre incolora y amarillenta. La dosis requerida debe administrarse como bolo intravenoso único en aproximadamente 10 segundos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo, a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 o a gentamicina (una sustancia residual del proceso de fabricación). Si de todos modos el tratamiento con Metalyse se considera necesario, los recursos de reanimación deben estar inmediatamente disponibles para su uso en caso de necesidad. Además, como el tratamiento trombolítico se asocia a un mayor riesgo de hemorragia, Metalyse está contraindicado en las siguientes situaciones: Trastorno hemorrágico significativo actual o durante los últimos 6 meses Pacientes que reciben tratamiento efectivo con anticoagulantes orales, p. ej., warfarina sódica (INR > 1,3) (ver sección 4.4, subsección "Hemorragia") Antecedentes de lesión del sistema nervioso central (es decir, neoplasia, aneurisma, cirugía intracraneal o espinal) Diátesis hemorrágica conocida Hipertensión no controlada grave Cirugía mayor, biopsia de un órgano parenquimatoso o traumatismo significativo durante los últimos 2 meses (incluyendo cualquier traumatismo asociado con el IAM actual) Traumatismo reciente de la cabeza o el cráneo Reanimación cardiopulmonar prolongada (> 2 minutos) durante las últimas 2 semanas Pericarditis aguda y/o endocarditis bacteriana subaguda Pancreatitis aguda Disfunción hepática grave, incluyendo insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal (varices esofágicas) y hepatitis activa Úlcera péptica activa Aneurisma arterial y malformación arterial/venosa conocida Neoplasia con riesgo aumentado de hemorragia Cualquier antecedente conocido de ictus hemorrágico o ictus de origen

desconocido Antecedentes conocidos de ictus isquémico o accidente isquémico transitorio (AIT) en los 6 meses anteriores Demencia

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TEPOTINIB

TEPMETKO 225 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos

Principio activo: TEPOTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EP-INHIBIDORES DE LA QUINASA DEL FACTOR DE TRANSICIÓN CELULAR-MESENQUIMATOSO-EPITELIAL (c-met)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Tepotinib se deben tomar con alimentos y se deben tragar enteros para garantizar que se administre la dosis completa. Si el paciente no puede tragar, los comprimidos se pueden dispersar en 30 ml de agua sin gas. No se deben usar ni añadir otros líquidos. Si se requiere la administración a través de una sonda nasogástrica (con un calibre de al menos 8 French), los comprimidos se deben dispersar en 30 ml de agua sin gas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TIOGUANINA

TIOGUANINA ASPEN 40 MG COMPRIMIDOS , 25 comprimidos

Principio activo: TIOGUANINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BB-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PURINA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Tioguanina se absorbe de forma variable tras su administración oral y pueden reducirse los niveles plasmáticos del fármaco tras la émesis o ingesta de alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Tioguanina Aspen no debe ser utilizada en pacientes que hayan demostrado resistencia previa a tioguanina. Dada la gravedad de las indicaciones, no existen otras contraindicaciones absolutas.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TIOPENTAL SODICO

TIOBARBITAL B. BRAUN 1 G POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 50 viales

Principio activo: TIOPENTAL SODICO

Datos generales

Grupo terapéutico: N01AF-ANESTÉSICOS GENERALES: BARBITÚRICOS, SOLOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

El Tiopental se administra por infusión intravenosa lenta o en perfusión continua. Se recomienda una inyección lenta para minimizar la depresión respiratoria y la posibilidad de sobredosis.

Contraindicaciones

El tiopental está contraindicado en pacientes con: - hipersensibilidad a los barbitúricos - obstrucción respiratoria - asma agudo - shock grave - distrofia miotónica - porfiria

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TIOTEPA

TEPADINA 100 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 1 vial

Principio activo: TIOTEPA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AC-AGENTES ALQUILANTES: ETILENOIMINAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo. Embarazo y lactancia (ver sección 4.6). Uso simultáneo con la vacuna contra la fiebre amarilla y con vacunas de virus vivos y bacterianas (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TEPADINA 15 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: TIOTEPA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01AC-AGENTES ALQUILANTES: ETILENOIMINAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo. Embarazo y lactancia (ver sección 4.6). Uso simultáneo con la vacuna contra la fiebre amarilla y con vacunas de virus vivos y bacterianas (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TIROFIBAN

AGRASTAT 0,25 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION , 1 vial de 50 ml

Principio activo: TIROFIBAN

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AC-ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (EXCL. HEPARINA)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Tirofiban sólo debe administrarse por vía intravenosa diluido y puede administrarse con heparina no fraccionada a través del mismo tubo de perfusión.

Contraindicaciones

AGRASTAT está contraindicado en pacientes que sean hipersensibles al principio activo o a cualquiera de los excipientes del preparado detallados en la sección 6.1, o que hayan desarrollado trombocitopenia durante la administración anterior de antagonistas de los receptores GP IIb/IIIa. Dado que la inhibición de la agregación plaquetaria aumenta el riesgo de hemorragia, AGRASTAT está contraindicado en los pacientes con: • Antecedente de ictus en los 30 días previos o cualquier antecedente de ictus hemorrágico. • Enfermedad intracraneal conocida (p. ej., neoplasias, malformaciones arteriovenosas, aneurismas). • Hemorragia activa o reciente (dentro de los 30 días previos al tratamiento) clínicamente relevante (p. ej., hemorragia gastrointestinal). • Hipertensión maligna. • Traumatismo importante o intervención de cirugía mayor en las últimas seis semanas. • Trombocitopenia (recuento plaquetario 1,3 veces de lo normal, o CIN (Cociente Internacional Normalizado) > 1,5). • Insuficiencia hepática grave.

Observaciones

Debe tenerse cuidado de no prolongar la perfusión de la dosis inicial y de evitar errores de cálculo de las velocidades de perfusión para la dosis de mantenimiento basándose en el peso del paciente.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TISLELIZUMAB

TEVIMBRA 100 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml

Principio activo: TISLELIZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TIVOZANIB

FOTIVDA 1340 MICROGRAMOS CAPSULAS DURAS 21 cápsulas

Principio activo: TIVOZANIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EK-INHIBIDORES DEL RECEPTOR DE LA TIROSINA QUINASA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Tivozanib puede tomarse con o sin alimentos. Las cápsulas se deben tragar enteras con un vaso de agua y no se deben abrir.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. La administración conjunta con medicamentos a base de plantas que contengan hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*) (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

FOTIVDA 890 MICROGRAMOS CAPSULAS DURAS, 21 cápsulas

Principio activo: TIVOZANIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EK-INHIBIDORES DEL RECEPTOR DE LA TIROSINA QUINASA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Tivozanib puede tomarse con o sin alimentos. Las cápsulas se deben tragar enteras con un vaso de agua y no se deben abrir.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. La administración conjunta con medicamentos a base de plantas que contengan hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*) (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TOPOTECAN

HYCAMTIN 0,25 mg CAPSULAS DURAS, 10 capsulas

Principio activo: TOPOTECAN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CE-INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA 1 (TOP1)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Topotecan deben tragarse enteras, y no deben masticarse, machacarse o dividirse. Pueden tomarse con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad grave al principio activo o a alguno de los excipientes Lactancia (ver sección 4.6)
Supresión de médula ósea grave antes del comienzo del primer ciclo, que se manifiesta con un recuento basal de neutrófilos $< 1,5 \times 10^9/l$ y/o un recuento de plaquetas $< 100 \times 10^9/l$.

Observaciones

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

HYCAMTIN 1 mg CAPSULAS DURAS, 10 cápsulas

Principio activo: TOPOTECAN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CE-INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA 1 (TOP1)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Topotecan deben tragarse enteras, y no deben masticarse, machacarse o dividirse. Pueden tomarse con o sin alimentos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad grave al principio activo o a alguno de los excipientes Lactancia (ver sección 4.6)
Supresión de médula ósea grave antes del comienzo del primer ciclo, que se manifiesta con un recuento basal de neutrófilos $< 1,5 \times 10^9/l$ y/o un recuento de plaquetas $< 100 \times 10^9/l$.

Observaciones

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TOPOTECAN ACCORD 1 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 4 ml

Principio activo: TOPOTECAN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CE-INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA 1 (TOP1)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

– Hipersensibilidad grave al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. – Lactancia materna (ver sección 4.6) – Supresión grave de la médula ósea antes de iniciar el primer

ciclo, como se manifiesta por un recuento inicial de neutrófilos $< 1,5 \times 10^9/l$ y/o un recuento de plaquetas de $< 100 \times 10^9/l$.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TORIPALIMAB

LOQTORZI 240 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 6 ml

Principio activo: TORIPALIMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FF-INHIBIDORES DE LA PD-1/PD-L1

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRABECTEDINA

YONDELIS 0,25 mg POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: TRABECTEDINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CX-OTROS ALCALOIDES DE PLANTAS Y PRODUCTOS NATURALES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la trabectedina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Infección concurrente grave o no controlada Lactancia (ver sección 4.6) Tratamiento combinado con la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.4)

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

YONDELIS 1 mg POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: TRABECTEDINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CX-OTROS ALCALOIDES DE PLANTAS Y PRODUCTOS NATURALES

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la trabectedina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Infección concurrente grave o no controlada Lactancia (ver sección 4.6) Tratamiento combinado con la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.4)

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRAMADOL

ADOLONTA 100 mg/ ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 30 ml

Principio activo: TRAMADOL

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AX-OTROS OPIOIDES

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN

Vías de administración

OR: ORAL

La solución de Tramadol debe tomarse con un poco de líquido o de azúcar, con o sin comidas.

Antes de usar la bomba dosificadora por primera vez, púlsela varias veces hasta que la solución aparezca.

Contraindicaciones

Este medicamento no debe administrarse: con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, en caso de intoxicaciones agudas originadas por alcohol, hipnóticos, analgésicos, opioides u otros psicótropos, en pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO o que los hayan tomado durante los últimos 14 días (ver sección 4.5), en pacientes que presentan epilepsia que no esté controlada adecuadamente con tratamiento, para el tratamiento del síndrome de abstinencia a opiáceos, a niños menores de 3 años.

Observaciones

Antes de iniciar el tratamiento con Tramadol , debe acordarse con el paciente una estrategia de tratamiento que incluya su duración y objetivos, así como un plan para el final del tratamiento, de conformidad con las pautas de tratamiento del dolor.

Cuando un paciente ya no requiere terapia con Tramadol, puede ser aconsejable disminuir la dosis gradualmente para prevenir los síntomas de abstinencia.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRAMADOL NORMON 100 MG/ 2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG , 100 ampollas de 2 ml

Principio activo: TRAMADOL

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AX-OTROS OPIOIDES

Forma farmacéutica: INYECTABLE IM-IV-SC

Vías de administración

IM: INTRAMUSCULAR

IV: INTRAVENOSA

Se puede administrar por vía intravenosa (inyección lenta, 2-3 minutos) o bien diluido por perfusión o mediante un dispositivo de analgesia controlado por el paciente.

SC: SUBCUTANEA

Contraindicaciones

Este medicamento no debe administrarse: con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, en caso de intoxicaciones agudas originadas por alcohol, hipnóticos, analgésicos, opioides u otros psicótrópos, en pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO o que los hayan tomado durante los últimos 14 días (ver sección 4.5), en pacientes que presentan epilepsia que no esté controlada adecuadamente con tratamiento, para el tratamiento del síndrome de abstinencia a opiáceos a niños menores de 3 años.

Observaciones

Antes de iniciar el tratamiento con Tramadol , debe acordarse con el paciente una estrategia de tratamiento que incluya su duración y objetivos, así como un plan para el final del tratamiento, de conformidad con las pautas de tratamiento del dolor.

Cuando un paciente ya no requiere terapia con Tramadol, puede ser aconsejable disminuir la dosis gradualmente para prevenir los síntomas de abstinencia.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRAMADOL NORMON 50 MG CÁPSULAS DURAS EFG , 500 cápsulas

Principio activo: TRAMADOL

Datos generales

Grupo terapéutico: N02AX-OTROS OPIOIDES

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Tramadol se deben tomar enteras, sin dividir ni masticar, con suficiente líquido y con o sin comidas.

Contraindicaciones

Este medicamento no debe administrarse: con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, en caso de intoxicaciones agudas originadas por alcohol, hipnóticos, analgésicos, opioides u otros psicótropos, en pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO o que los hayan tomado durante los últimos 14 días (ver sección 4.5), en pacientes que presentan epilepsia que no esté controlada con tratamiento, para el tratamiento del síndrome de abstinencia a opiáceos.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRAMETINIB

MEKINIST 0,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 COMPRIMIDOS

Principio activo: TRAMETINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EE-INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA ACTIVADA POR MITÓGENOS (MEK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Trametinib se deben tomar por vía oral con un vaso lleno de agua. No se deben masticar ni machacar y se deben de tomar sin alimentos, al menos 1 hora antes o 2 horas después de una comida.

Se recomienda que se tome a la misma hora del día, todos los días. Cuando se tome Trametinib en combinación con Dabrafenib, la dosis diaria de Trametinib se debe tomar a la vez que la dosis matutina o la dosis vespertina de Dabrafenib.

Si el paciente vomita después de tomar Trametinib, no debe volver a tomar la dosis, y debe esperar a la siguiente toma.

Por favor, consulte la Ficha Técnica de Dabrafenib para información sobre la forma de administración cuando se toma en combinación con Trametinib.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

MEKINIST 2 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 COMPRIMIDOS

Principio activo: TRAMETINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EE-INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA ACTIVADA POR MITÓGENOS (MEK)

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Trametinib se deben tomar por vía oral con un vaso lleno de agua. No se deben masticar ni machacar y se deben de tomar sin alimentos, al menos 1 hora antes o 2 horas después de una comida.

Se recomienda que se tome a la misma hora del día, todos los días. Cuando se tome Trametinib en combinación con Dabrafenib, la dosis diaria de Trametinib se debe tomar a la vez que la dosis matutina o la dosis vespertina de Dabrafenib.

Si el paciente vomita después de tomar Trametinib, no debe volver a tomar la dosis, y debe esperar a la siguiente toma.

Por favor, consulte la Ficha Técnica de Dabrafenib para información sobre la forma de administración cuando se toma en combinación con Trametinib.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

SPEXOTRAS 0,05 MG/ML POLVO PARA SOLUCION ORAL, 1 frasco

Principio activo: TRAMETINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EE-INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA ACTIVADA POR MITÓGENOS (MEK)

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN

Vías de administración

OR: ORAL

La solución de Trametinib se debe tomar al mismo tiempo que Dabrafenib comprimidos dispersables, que tiene una exposición reducida con los alimentos, por lo que se debe tomar sin alimentos, al menos una hora antes o dos horas después de una comida. Se recomienda que la dosis de Trametinib se tome a la misma hora del día, todos los días a la vez que la dosis matutina o la dosis vespertina de Dabrafenib, utilizando la jeringa oral reutilizable.

Si el paciente no es capaz de tragar y tiene una sonda nasogástrica colocada, se puede administrar a través de la sonda.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

El Trametinib polvo debe ser reconstituido como solución oral por un farmacéutico antes de administrarlo al paciente.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRASTUZUMAB

ONTRUZANT 420 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: TRASTUZUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FD-INHIBIDORES DEL HER2 (RECEPTOR 2 DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a trastuzumab, a las proteínas murinas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Disnea grave en reposo debido a las complicaciones de la neoplasia avanzada o que requiere tratamiento con oxígeno complementario.

Observaciones

Para evitar errores de medicación, es importante comprobar las etiquetas de los viales para asegurarse de que el medicamento que se está preparando y administrando es Trastuzumab solo y no otro producto que contenga Trastuzumab (p. ej. Trastuzumab Emtansina o Trastuzumab Deruxtecan).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRASTUZUMAB DERUXTECAN

ENHERTU 100 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: TRASTUZUMAB DERUXTECAN

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FD-INHIBIDORES DEL HER2 (RECEPTOR 2 DEL FACTOR DE CRECIMIENTO

EPIDERMICO HUMANO)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV**Vías de administración****IV:** INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Trastuzumab Deruxtecán es un conjugado anticuerpo-fármaco que contiene un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado dirigido a HER2 unido covalentemente a DXd, un derivado de exatecán, inhibidor de la topoisomerasa I. Para evitar errores de medicación, es importante comprobar las etiquetas de los viales para asegurarse de que el medicamento que se está preparando y administrando es Trastuzumab Deruxtecán y no otro producto que contenga Trastuzumab (p. ej. Trastuzumab o Trastuzumab Emtansina).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRASTUZUMAB EMTAMSINA**KADCYLA 100 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial**

Principio activo: TRASTUZUMAB EMTAMSINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FD-INHIBIDORES DEL HER2 (RECEPTOR 2 DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración**IV:** INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Trastuzumab Emtansina es un conjugado anticuerpo-fármaco que contiene Trastuzumab, un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado unido covalentemente a DM1, un inhibidor microtubular. Para evitar errores de medicación, es importante comprobar las etiquetas de los viales para asegurarse de que el medicamento que se está preparando y administrando es Trastuzumab Emtansina y no otro producto que contenga Trastuzumab (p. ej. Trastuzumab o Trastuzumab Deruxtecan).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

KADCYLA 160 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial

Principio activo: TRASTUZUMAB EMTAMSINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FD-INHIBIDORES DEL HER2 (RECEPTOR 2 DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO)

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Trastuzumab Emtansina es un conjugado anticuerpo-fármaco que contiene Trastuzumab, un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado unido covalentemente a DM1, un inhibidor microtubular. Para evitar errores de medicación, es importante comprobar las etiquetas de los viales para asegurarse de que el medicamento que se está preparando y administrando es Trastuzumab Emtansina y no otro producto que contenga Trastuzumab (p. ej. Trastuzumab o Trastuzumab Deruxtecan).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRASTUZUMAB SC

HERCEPTIN 600 MG SOLUCION INYECTABLE EN VIAL 1 vial de 5 ml

Principio activo: TRASTUZUMAB SC

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FD-INHIBIDORES DEL HER2 (RECEPTOR 2 DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO)

Forma farmacéutica: INYECTABLE SC

Vías de administración

SC: SUBCUTANEA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al trastuzumab, a las proteínas murinas, hialuronidasa o a alguno de los otros excipientes incluidos en la sección 6.1. Disnea grave en reposo debida a complicaciones de su enfermedad maligna avanzada o que requieran terapia suplementaria con oxígeno.

Observaciones

Para evitar errores de medicación, es importante comprobar las etiquetas de los viales para asegurarse de que el medicamento que se está preparando y administrando es Trastuzumab solo y no otro producto que contenga Trastuzumab (p. ej. Trastuzumab Emtansina o Trastuzumab Deruxtecan).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TREMELIMUMAB

IMJUDO 20 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 15 ml

Principio activo: TREMELIMUMAB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01FX-OTROS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y FARMACOS INMUNOCONJUGADOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TREPROSTINIL

TREPROSTINILO FERRER 1 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 20 ml

Principio activo: TREPROSTINIL

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AC-ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (EXCL. HEPARINA)

Forma farmacéutica: INYECTABLE OTRAS VIA

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Treprostinilo se administra mediante perfusión intravenosa continua con un catéter venoso central con ayuda de una bomba de perfusión ambulatoria. Debe diluirse en agua estéril para inyectables o en una solución de cloruro sódico al 0,9% para inyectables.

SC: SUBCUTANEA

Treprostinilo se administra mediante perfusión subcutánea continua con un catéter subcutáneo, empleando una bomba de perfusión ambulatoria. Se administra no diluido según la velocidad de perfusión subcutánea calculada (ml/h) en función de la dosis prescrita (nanogramos/kg/min), del peso corporal del paciente (kg), y de la concentración del vial utilizado (mg/ml).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
Hipertensión arterial pulmonar asociada a una enfermedad venooclusiva. Insuficiencia cardíaca congestiva debida a disfunción grave del ventrículo izquierdo. Insuficiencia hepática grave (estadio C

de Child-Pugh). Úlcera gastrointestinal en evolución, hemorragia intracraneal, traumatismo reciente u otro estado clínico que pueda conllevar sangrado. Anomalías valvulares congénitas o adquiridas con repercusión cardíaca, no relacionada con la hipertensión arterial pulmonar en sí. Cardiopatía isquémica grave o angina inestable; infarto de miocardio sufrido en los seis últimos meses; insuficiencia cardíaca descompensada si no se encuentra bajo estrecha supervisión médica; arritmias graves; lesiones cerebrovasculares (como accidente isquémico transitorio, accidente cerebrovascular) sufridas en los tres últimos meses.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TREPROSTINILO FERRER 10 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 20 ml

Principio activo: TREPROSTINIL

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AC-ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (EXCL. HEPARINA)

Forma farmacéutica: INYECTABLE OTRAS VIA

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Treprostinilo se administra mediante perfusión intravenosa continua con un catéter venoso central con ayuda de una bomba de perfusión ambulatoria. Debe diluirse en agua estéril para inyectables o en una solución de cloruro sódico al 0,9% para inyectables.

SC: SUBCUTANEA

Treprostinilo se administra mediante perfusión subcutánea continua con un catéter subcutáneo, empleando una bomba de perfusión ambulatoria. Se administra no diluido según la velocidad de perfusión subcutánea calculada (ml/h) en función de la dosis prescrita (nanogramos/kg/min), del peso corporal del paciente (kg), y de la concentración del vial utilizado (mg/ml).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hipertensión arterial pulmonar asociada a una enfermedad venooclusiva. Insuficiencia cardíaca congestiva debida a disfunción grave del ventrículo izquierdo. Insuficiencia hepática grave (estadio C de Child-Pugh). Úlcera gastrointestinal en evolución, hemorragia intracraneal, traumatismo reciente u otro estado clínico que pueda conllevar sangrado. Anomalías valvulares congénitas o adquiridas con repercusión cardíaca, no relacionada con la hipertensión arterial pulmonar en sí. Cardiopatía isquémica grave o angina inestable; infarto de miocardio sufrido en los seis últimos meses; insuficiencia cardíaca descompensada si no se encuentra bajo estrecha supervisión médica; arritmias graves; lesiones

cerebrovasculares (como accidente isquémico transitorio, accidente cerebrovascular) sufridas en los tres últimos meses.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TREPROSTINILO FERRER 2,5 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 20 ml

Principio activo: TREPROSTINIL

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AC-ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (EXCL. HEPARINA)

Forma farmacéutica: INYECTABLE OTRAS VIA

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Treprostinilo se administra mediante perfusión intravenosa continua con un catéter venoso central con ayuda de una bomba de perfusión ambulatoria. Debe diluirse en agua estéril para inyectables o en una solución de cloruro sódico al 0,9% para inyectables.

SC: SUBCUTANEA

Treprostinilo se administra mediante perfusión subcutánea continua con un catéter subcutáneo, empleando una bomba de perfusión ambulatoria. Se administra no diluido según la velocidad de perfusión subcutánea calculada (ml/h) en función de la dosis prescrita (nanogramos/kg/min), del peso corporal del paciente (kg), y de la concentración del vial utilizado (mg/ml).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hipertensión arterial pulmonar asociada a una enfermedad venooclusiva. Insuficiencia cardíaca congestiva debida a disfunción grave del ventrículo izquierdo. Insuficiencia hepática grave (estadio C de Child-Pugh). Úlcera gastrointestinal en evolución, hemorragia intracraneal, traumatismo reciente u otro estado clínico que pueda conllevar sangrado. Anomalías valvulares congénitas o adquiridas con repercusión cardíaca, no relacionada con la hipertensión arterial pulmonar en sí. Cardiopatía isquémica grave o angina inestable; infarto de miocardio sufrido en los seis últimos meses; insuficiencia cardíaca descompensada si no se encuentra bajo estrecha supervisión médica; arritmias graves; lesiones cerebrovasculares (como accidente isquémico transitorio, accidente cerebrovascular) sufridas en los tres últimos meses.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TREPROSTINILO FERRER 5 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 20 ml

Principio activo: TREPROSTINIL

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AC-ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS (EXCL. HEPARINA)

Forma farmacéutica: INYECTABLE OTRAS VIA

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Treprostinilo se administra mediante perfusión intravenosa continua con un catéter venoso central con ayuda de una bomba de perfusión ambulatoria. Debe diluirse en agua estéril para inyectables o en una solución de cloruro sódico al 0,9% para inyectables.

SC: SUBCUTANEA

Treprostinilo se administra mediante perfusión subcutánea continua con un catéter subcutáneo, empleando una bomba de perfusión ambulatoria. Se administra no diluido según la velocidad de perfusión subcutánea calculada (ml/h) en función de la dosis prescrita (nanogramos/kg/min), del peso corporal del paciente (kg), y de la concentración del vial utilizado (mg/ml).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Hipertensión arterial pulmonar asociada a una enfermedad venooclusiva. Insuficiencia cardíaca congestiva debida a disfunción grave del ventrículo izquierdo. Insuficiencia hepática grave (estadio C de Child-Pugh). Úlcera gastrointestinal en evolución, hemorragia intracraneal, traumatismo reciente u otro estado clínico que pueda conllevar sangrado. Anomalías valvulares congénitas o adquiridas con repercusión cardíaca, no relacionada con la hipertensión arterial pulmonar en sí. Cardiopatía isquémica grave o angina inestable; infarto de miocardio sufrido en los seis últimos meses; insuficiencia cardíaca descompensada si no se encuentra bajo estrecha supervisión médica; arritmias graves; lesiones cerebrovasculares (como accidente isquémico transitorio, accidente cerebrovascular) sufridas en los tres últimos meses.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRETINOINA

VESANOID 10 mg CAPSULAS BLANDAS , 100 cápsulas

Principio activo: TRETINOINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XF-RETINOIDES PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Tretinoína deben tragarse con agua. No se debe masticar. Se recomienda tomar las cápsulas durante las comidas o inmediatamente después.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a tretinoína, otros retinoides, soja, cacahuete o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. La tretinoína es teratogénica. Está contraindicada durante la lactancia (ver sección 4.6). Combinación con vitamina A, tetraciclinas y retinoides (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TRIFLURIDINA/TIPIRACILO

LONSURF 15 MG/6,14 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 comprimidos

Principio activo: TRIFLURIDINA/TIPIRACILO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos se deben tomar con un vaso de agua en el transcurso de 1 hora después de la finalización del desayuno y de la cena.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

LONSURF 20 MG/8,19 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 comprimidos

Principio activo: TRIFLURIDINA/TIPIRACILO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01BC-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos se deben tomar con un vaso de agua en el transcurso de 1 hora después de la finalización del desayuno y de la cena.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

TUCATINIB

TUKYSA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 84 comprimidos

Principio activo: TUCATINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EH-INHIBIDORES DEL RECEPTOR 2 DE LA TIROSINA QUINASA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO HUMANO (HER2)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos deben tragarse enteros y no deben masticarse, triturarse ni dividirse antes de tragarlos. Debe tomarse aproximadamente con 12 horas de diferencia, a la misma hora todos los días, con o sin comida. Tucatinib puede tomarse al mismo tiempo con Capecitabina.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

URAPIDILO

URAPIDIL KALCEKS 5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG, 5 ampollas de 10 ml

Principio activo: URAPIDILO

Datos generales

Grupo terapéutico: C02CA-ANTIHIPERTENSIVOS: BLOQUEANTES ALFA-ADRENÉRGICOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

El Urapidilo se puede administrar tanto una única inyección directa como inyecciones múltiples, así como perfusiones prolongadas en pacientes en posición supina.

Contraindicaciones

Urapidil Kalceks no debe usarse en casos de: hipersensibilidad (alergia) al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; pacientes con estenosis del istmo de la aorta o shunt arteriovenoso (con excepción del shunt arteriovenoso para hemodiálisis inactiva hemodinámicamente); lactancia;

Observaciones

Como medida preventiva de los efectos toxicológicos, no debe sobrepasarse un periodo de tratamiento de 7 días, que también suele ser el caso con los tratamientos antihipertensores parenterales. El tratamiento parenteral puede repetirse si la hipertensión reaparece.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

UROQUINASA

UROKINASE TEOFARMA 100.000 UI. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 25 viales + 25 ampollas de disolvente

Principio activo: UROQUINASA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AD-ANTITROMBÓTICOS: ENZIMAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La forma usual de administración es por perfusión intravenosa continua, disuelta en suero salino isotónico. Se ajustará a las características del cuadro clínico de cada paciente.

Contraindicaciones

Trastorno hemorrágico significativo actual o durante los últimos 6 meses. Pacientes en tratamiento anticoagulante oral simultáneo (INR > 1,3). Historia de lesión del sistema nervioso central (por ej., neoplasia, aneurisma, cirugía intracraneal o espinal). Diátesis hemorrágica conocida. Hipertensión no controlada grave. Cirugía mayor, biopsia de un órgano parenquimatoso o traumatismo significativo durante los últimos 2 meses (incluyendo cualquier traumatismo asociado con el infarto agudo de miocardio actual). Traumatismo reciente de la cabeza o el cráneo. Reanimación cardiopulmonar prolongada (> 2 minutos) durante las últimas 2 semanas. Pericarditis aguda y/o endocarditis bacteriana subaguda. Pancreatitis aguda. Disfunción hepática grave, incluyendo fallo hepático, cirrosis, hipertensión portal (varices esofágicas) y hepatitis activa. Úlcera péptica activa. Aneurisma arterial y malformación arterial/venosa conocida. Neoplasia con riesgo aumentado de hemorragia. Historia conocida de ictus, ataque isquémico transitorio o demencia. - Hipersensibilidad al principio activo uroquinasa o a alguno de los excipientes.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

UROKINASE TEOFARMA 250.000 UI. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 10 viales + 10 ampollas de disolvente

Principio activo: UROQUINASA

Datos generales

Grupo terapéutico: B01AD-ANTITROMBÓTICOS: ENZIMAS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

La forma usual de administración es por perfusión intravenosa continua, disuelta en suero salino isotónico. Se ajustará a las características del cuadro clínico de cada paciente.

Contraindicaciones

Trastorno hemorrágico significativo actual o durante los últimos 6 meses. Pacientes en tratamiento anticoagulante oral simultáneo (INR > 1,3). Historia de lesión del sistema nervioso central (por ej., neoplasia, aneurisma, cirugía intracraneal o espinal). Diátesis hemorrágica conocida. Hipertensión no controlada grave. Cirugía mayor, biopsia de un órgano parenquimatoso o traumatismo significativo durante los últimos 2 meses (incluyendo cualquier traumatismo asociado con el infarto agudo de miocardio actual). Traumatismo reciente de la cabeza o el cráneo. Reanimación cardiopulmonar prolongada (> 2 minutos) durante las últimas 2 semanas. Pericarditis aguda y/o endocarditis bacteriana subaguda. Pancreatitis aguda. Disfunción hepática grave, incluyendo fallo hepático, cirrosis, hipertensión portal (varices esofágicas) y hepatitis activa. Úlcera péptica activa. Aneurisma arterial y malformación arterial/venosa conocida. Neoplasia con riesgo aumentado de hemorragia. Historia conocida de ictus, ataque isquémico transitorio o demencia. - Hipersensibilidad al principio activo uroquinasa o a alguno de los excipientes.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VEMURAFENIB

ZELBORAF 240 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos

Principio activo: VEMURAFENIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EC-INHIBIDORES DE LA SERINA-TREONINA QUINASA BRAF

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS CUBIERTA

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Vemurafenib se puede tomar con o sin alimentos, pero debe evitarse el consumo constante de las dos dosis diarias con el estómago vacío. Deben ingerirse enteros con agua y no deben masticarse ni partirse.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VENETOCLAX

VENCLYXTO 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 14 comprimidos

Principio activo: VENETOCLAX

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los pacientes deben ingerir los comprimidos enteros con agua, aproximadamente, a la misma hora cada día. Los comprimidos se deben tomar junto con una comida para evitar un riesgo de pérdida de eficacia. No se deben masticar, triturar ni partir antes de tragarlos.

Durante la fase de ajuste de la dosis, Venetoclax se debe tomar por la mañana para facilitar la vigilancia mediante analíticas del laboratorio.

Los productos que contengan pomelo, las naranjas amargas y la carambola (fruta estrella) se deben evitar durante el tratamiento con Venetoclax.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. En pacientes con LLC, uso concomitante con inhibidores potentes del CYP3A al inicio y durante la fase de ajuste de la dosis (ver las secciones 4.2 y 4.5). En todos los pacientes, uso concomitante con preparados que contengan hierba de San Juan (ver las secciones 4.4 y 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VENCLYXTO 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 112 comprimidos

Principio activo: VENETOCLAX

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración**OR:** ORAL

Los pacientes deben ingerir los comprimidos enteros con agua, aproximadamente, a la misma hora cada día. Los comprimidos se deben tomar junto con una comida para evitar un riesgo de pérdida de eficacia. No se deben masticar, triturar ni partir antes de tragarlos.

Durante la fase de ajuste de la dosis, Venetoclax se debe tomar por la mañana para facilitar la vigilancia mediante analíticas del laboratorio.

Los productos que contengan pomelo, las naranjas amargas y la carambola (fruta estrella) se deben evitar durante el tratamiento con Venetoclax.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. En pacientes con LLC, uso concomitante con inhibidores potentes del CYP3A al inicio y durante la fase de ajuste de la dosis (ver las secciones 4.2 y 4.5). En todos los pacientes, uso concomitante con preparados que contengan hierba de San Juan (ver las secciones 4.4 y 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VENCLYXTO 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 7 comprimidos

Principio activo: VENETOCLAX

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XX-OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los pacientes deben ingerir los comprimidos enteros con agua, aproximadamente, a la misma hora cada día. Los comprimidos se deben tomar junto con una comida para evitar un riesgo de pérdida de eficacia. No se deben masticar, triturar ni partir antes de tragarlos.

Durante la fase de ajuste de la dosis, Venetoclax se debe tomar por la mañana para facilitar la vigilancia mediante analíticas del laboratorio.

Los productos que contengan pomelo, las naranjas amargas y la carambola (fruta estrella) se deben evitar durante el tratamiento con Venetoclax.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. En pacientes con LLC, uso concomitante con inhibidores potentes del CYP3A al inicio y durante la fase de ajuste de la dosis (ver las secciones 4.2 y 4.5). En todos los pacientes, uso concomitante con preparados que contengan hierba de San Juan (ver las secciones 4.4 y 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VINBLASTINA

VINBLASTINA STADA 10 MG POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE , 1 vial

Principio activo: VINBLASTINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CA-ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo u otro alcaloide de la vinca o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Leucopenia, no debida a un tumor. Infecciones bacterianas. Se deberán controlar dichas infecciones antes de iniciar el tratamiento con vinblastina Administración intratecal de vinblastina Lactancia (ver sección 4.6)

Observaciones

SOLO PARA USO INTRAVENOSO POTENCIALMENTE LETAL SI SE ADMINISTRA POR OTRA VÍA.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VINCRISTINA

VINCRISTINA PFIZER 1 mg/ml SOLUCION INYECTABLE EFG , 1 vial con 2 ml

Principio activo: VINCRISTINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CA-ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Administración por vía intratecal (ver sección 4.4). - Pacientes con la forma desmielinizante del síndrome de Charcot-Marie-Tooth. - Pacientes que estén recibiendo radioterapia en zona hepática. - Embarazo y lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Si se administra por vía intratecal es letal.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VINDESINA

ENISON 5 MG POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial

Principio activo: VINDESINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CA-ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica. Este medicamento se administra exclusivamente por vía intravenosa.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. El sulfato de vindesina está contraindicado en los pacientes que presentan granulocitopenia severa o trombocitopenia severa inducidas por medicamentos. Este medicamento no se debe utilizar en pacientes con una infección bacteriana seria; tales infecciones se deben controlar antes de iniciar el tratamiento con vindesina. No se debe administrar sulfato de vindesina a pacientes con la variedad desmielinizante del síndrome de Charcot-Marie-Tooth.

Observaciones

Sólo pueden administrarlo profesionales con experiencia en el empleo de sulfato de Vindesina. La administración intratecal puede ser letal. Las jeringas, o cualquier otro recipiente que contenga este producto, deben estar claramente marcadas con la siguiente leyenda: "ADVERTENCIA: SULFATO DE

VINDESINA. ESTA ESPECIALIDAD ES LETAL SI SE ADMINISTRA POR VÍA INTRATECAL. PARA USO INTRAVENOSO EXCLUSIVAMENTE".

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VINFLUNINA DITARTRATO

JAVLOR 25 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml

Principio activo: VINFLUNINA DITARTRATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CA-ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

SOLO DEBE administrarse por vía intravenosa en perfusión intravenosa y NO debe administrarse en forma de bolus intravenoso rápido.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a otros alcaloides de la vinca. Infección grave actual o reciente (menos de 2 semanas). Recuentos basales RAN < 1.500/mm³ en la primera administración, recuentos basales RAN < 1.000/mm³ en administraciones posteriores (ver sección 4.4). Plaquetas < 100.000/mm³ (ver sección 4.4). Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

JAVLOR 25 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 2 ml

Principio activo: VINFLUNINA DITARTRATO

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CA-ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: VIAL

Vías de administración

PA: PARENTERAL

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

SOLO DEBE administrarse por vía intravenosa en perfusión intravenosa y NO debe administrarse en forma de bolus intravenoso rápido.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a otros alcaloides de la vinca. Infección grave actual o reciente (menos de 2 semanas). Recuentos basales RAN < 1.500/mm³ en la primera administración, recuentos basales RAN < 1.000/mm³ en administraciones posteriores (ver sección 4.4). Plaquetas < 100.000/mm³ (ver sección 4.4). Lactancia (ver sección 4.6).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VINORELBINA

VINORELBINA AUROVITAS 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 5 ml

Principio activo: VINORELBINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CA-ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: INYECTABLE IV

Vías de administración

IV: INTRAVENOSA

Preparación en Campana de Flujo Laminar Vertical en Farmacia y administración según Hoja de prescripción médica.

Contraindicaciones

- El uso por vía intratecal está contraindicado. - Hipersensibilidad al principio activo o a otros alcaloides de la vinca o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Recuento de granulocitos neutrófilos $<1.500/\text{mm}^3$ o infección grave, actual o reciente (en el plazo de 2 semanas). - Recuento de plaquetas inferior a $100.000/\text{mm}^3$. - Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con vinorelbina (ver sección 4.6). - Mujeres en edad fértil que no utilicen un método anticonceptivo eficaz (ver secciones 4.4 y 4.6). - En combinación con la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VINORELBINA GLENMARK 20 MG CAPSULAS BLANDAS EFG, 1 cápsula

Principio activo: VINORELBINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CA-ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

La Vinorelbina debe administrarse estrictamente por vía oral. Debe tragarse entero con agua, sin masticar, chupar o disolver la cápsula.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a vinorelbina, a otros alcaloides de la vinca o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Enfermedad que afecte de manera significativa a la absorción Antecedentes de resección quirúrgica significativa del estómago o del intestino delgado. Recuento de neutrófilos $<1500/\text{mm}^3$ o infección grave, actual o reciente (en periodo de 2 semanas) Recuento de plaquetas $<100.000/\text{mm}^3$ Lactancia (ver sección 4.6) Pacientes que requieren oxigenoterapia crónica. En combinación con la vacuna contra la fiebre amarilla (ver sección 4.5).

Observaciones

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VINORELBINA GLENMARK 30 MG CAPSULAS BLANDAS EFG, 1 cápsula

Principio activo: VINORELBINA

Datos generales

Grupo terapéutico: L01CA-ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

La Vinorelbina debe administrarse estrictamente por vía oral. Debe tragarse entero con agua, sin masticar, chupar o disolver la cápsula.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a vinorelbina, a otros alcaloides de la vinca o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Enfermedad que afecte de manera significativa a la absorción Antecedentes de resección quirúrgica significativa del estómago o del intestino delgado. Recuento de neutrófilos < 1500/mm³ o infección grave, actual o reciente (en periodo de 2 semanas) Recuento de plaquetas < 100,000/mm³ Lactancia (ver sección 4.6) Pacientes que requieren oxigenoterapia crónica. En combinación con la vacuna contra la fiebre amarilla (ver sección 4.5).

Observaciones

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VISMODEGIB

ERIVEDGE 150 MG CAPSULAS DURAS, 28 capsulas

Principio activo: VISMODEGIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XJ-INHIBIDORES DE LA RUTA HEDGEHOG

Forma farmacéutica: CÁPSULAS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas de Vismodegib deben tragarse enteras con agua, con o sin alimentos. Las cápsulas no deben abrirse, para evitar la exposición involuntaria a los pacientes y profesionales sanitarios.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia (ver secciones 4.4 y 4.6). Mujeres en edad fértil que no cumplen el Programa de Prevención de Embarazo de Erivedge (ver secciones 4.4 y 4.6). La administración concomitante de la hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*) (ver sección 4.5).

Observaciones

Sin observaciones relevantes.

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

VORASIDENIB

VORASIDENIB 40 MG COMP

Principio activo: VORASIDENIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01XM-INHIBIDORES DE LA ISOCITRATO DESHIDROGENASA (IDH)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Los comprimidos de Vorasidenib deben tomarse una vez al día aproximadamente a la misma hora. Los pacientes no deben ingerir alimentos al menos 2 horas antes y 1 hora después de tomarlo.

Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua y no deben partirse, triturarse ni masticarse, ya que no se dispone de datos que confirmen una biodisponibilidad similar del medicamento cuando se manipulan los comprimidos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/vorango-epar-product-information_es.pdf

ZANUBRUTINIB

BRUKINSA 80 MG CAPSULAS DURAS, 120 cápsulas

Principio activo: ZANUBRUTINIB

Datos generales

Grupo terapéutico: L01EL-INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DE BRUTON (BTK)

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Vías de administración

OR: ORAL

Las cápsulas duras de Zanubrutinib pueden tomarse con o sin alimentos. Se debe indicar a los pacientes que traguen la cápsula entera con agua y que no abran, rompan ni mastiquen las cápsulas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Observaciones

Ficha técnica

[Consultar ficha técnica oficial en CIMA](#)

Glosario y siglas

amp	Ampolla
CICr	Aclaramiento de creatinina
cm	Centímetro
CV	Catéter venoso
CVC	Catéter venoso central
FC	Frecuencia cardíaca
FR	Frecuencia respiratoria
g	Gramo
IM	Intramuscular
IV	Intravenosa
kg	Kilogramo
mcg	Microgramo
mEq	Miliequivalente
mg	Miligramo
min	minuto
ml/h	Mililitro/hora
PA	Parenteral
PF	Perfusión
SC	Subcutáneo
SCTM	Sistema Cerrado de Transferencia de Medicamentos
SF	Suero Fisiológico o Cloruro Sódico 0,9%

Glosario y siglas

SG5%	Suero Glucosa 5%
TA	Tensión arterial
U	Unidad
UI	Unidad Internacional

Bibliografía

1. Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos. (ISMP-España). Lista de Medicamentos de Alto Riesgo para Hospitales

[↗ Enlace](#)

2. Fichas técnicas de los medicamentos. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

[↗ Enlace](#)

3. Guía de administración de medicamentos vía parenteral. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Son Espases Versión 4.1

4. Recomendaciones para el uso seguro de los medicamentos de alto riesgo. Ed: Ministerio de Sanidad. Madrid; 2023

[↗ Enlace](#)

5. Prácticas para mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Ed. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid; 2007

[↗ Enlace](#)

6. Recomendaciones para el Uso Seguro de los Medicamentos de Alto Riesgo en Pediatría. Madrid: Ministerio de Sanidad, Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, Asociación Española de Pediatría y Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria; 2024

[↗ Enlace](#)

7. Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (Periodo 2025-2035). Madrid: Ministerio de Sanidad. 2025

[↗ Enlace](#)

8. Ministerio de Sanidad, Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos. Resultados del estudio sobre la implantación de prácticas seguras en el uso de los medicamentos de alto riesgo en los hospitales españoles. Madrid; 2025

[↗ Enlace](#)

9. Base de datos de Estabilidad y compatibilidad de los medicamentos Stabilis 4.0

[↗ Enlace](#)

10. NIOSH List of Hazardous Drugs in Healthcare Settings, 2024 U.S. Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health DOI

[↗ Enlace](#)

Créditos y Agradecimientos

GUIAMAR es un proyecto colaborativo desarrollado sin ánimo de lucro con la participación de profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas y del ámbito sanitario provincial.

Participan en su desarrollo:

Servicio de Farmacia Hospitalaria
Hospital Universitario Torrecárdenas

Comisión del Uso Seguro del Medicamento
Hospital Universitario Torrecárdenas

Equipo TIC Provincial de Almería

Agradecimientos

A todos los profesionales que han participado en la revisión, validación, prueba y mejora de GUIAMAR, y a quienes han contribuido con sus conocimientos y experiencia a aumentar la seguridad en el uso de medicamentos.

El desarrollo del proyecto ha contado también con apoyo de herramientas de inteligencia artificial para tareas técnicas, de revisión editorial y de maquetación, bajo supervisión humana.

Proyecto colaborativo sin ánimo de lucro orientado a facilitar el acceso a información práctica sobre los medicamentos de alto riesgo utilizados en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

Hospital Universitario Torrecárdenas
Almería · 2026