

Poacnte 1 M cita = un pociente tiene metros citas cita M 1 do ctor= muchos citas tienen un soctor doretur MM Especialidad - muchos ductures tinen muchos especialidades Cita 1 M veceto = uno cito tiene muchos recetos Veceta MA mediconento = muchos recetas tienen un resiscamento CREATE DATABASE hospital USE hospital CREATE TABLE paciente C id-possente INT NOT NULL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR CLOOD. edod INT); CREATE TABLE Doctor (id-doctor INT NOT NULL PRIMHRY KEY. nombre VAR (HAR (100)) 0 CREATE TABLE Especialidad (io-exectation INT NOT NULL PRIMARY KAY nombre UARCHAR (100); CIZEATE TINBLE CITO C IN_ lito INT NOT NULL PRIMARY KEY. Id-paciente INT NOT NULL, 12 doctor INTNOT MLL. fecho INT, hora TIME,

FOREING KEY (id pociente) REFERENES Paciente (15 povente). FORETHE KEY (id-doctor) REFERENCES Doctor (id-doctor)); CREATE TABLE Medicomento (id-medicomento INT NOT NULL PRIMARYKEY, number VAR (HAR (100), dasis VAR(HAR (80)); CREATE TABLE Receto (il-cità INT NOT NULL PRIMARY KEY. 10 medicomento INT NOT NULL, Contidad IM, PRIMARY Kfy (id_cita, id_neuromentu); FORETHE KEN Cid-cita) REFERENCES Cita Cid-cital FORETNE KRY (, J_mediconento) REFERENCES Medicomento (, d_medicomento)); CREATE TABLE Doctor Esperiolidad (id-ductor INT NOT NULL, id expedicted INT NOT MULL, PRIMARY KEY (id-doctor); d-especialidad), FOREING KEY (I'V dodor) REFENCES Doctor (i'V doctor), FOREING KEV (id-euperialidad) REFERENCES Especial and Fidespecialidad));

INSERT INTO Pociende VALUES (1, Lavia Rajos, 28); I NSEAT INTO Rocione VALUES (2, Dose Dion, US); Ductor VALUES (1, Dro. Combo Toises); INSERT INTO INSERTINTO Doctor VALVES (2, Dr. Antes VANGOL'); INSENT INTO (Specialized VALUES (1, ochiotila); INSERT INTO Especialidad VALUES (1, Cordiologio'); INSERT ENTO CITO VALUES (1,1,1,12025-07-15', 01:00'); Cito VALUES (1,2,2,12028-07-16; 11:301); INSENT INTO INSENT INTO Medicamente VALUES (1 'hibuprofeno', 200 mg'); INSERT INTO MEDICINATION VALUES (2, amoxiclina/ 500 mg); Receta VALUES (1,12); INJENT INTO INJERT INTO Receta VALUES (2,2,1); INSERT INTO Poctor Especialidad VALUES (1,1); INSCRI INTO Poctor Especialisted VALUES (2,2); UPDATE Possente SET edod= 29 WHERE id-possente=1; LPDATE Medicomento SET dosis= 40 ong' WHERE id-medicomento = 1; DELETE FROM Receto WHERE id-cito=2 AND id-mediamediamedia=1; DELETE FROM Doctofspendidod WAFRE ID doctor = 1 AND ILL-expectation = 1;

ALTER TABLE Pocionte ADD COTTEO VARCHAR (100); ALTER TABLE Cito ADD motivo_ consulta VARCHAMIZOOD; ALTER TABLE Medicomento ALTER COLUMN Jours VANCHAR (100): ALTER TABLE Especialidad ALTER COLUMN numbre VARCHAR (180); ALTER TABLE Pociente DROS COLUMN correo; ALTER TAKLE (ito DROP COLUMN motive convito; SELECT DOMbre FROM Doctor WHERE IG-doctor INC SELECT id-andor FROM cito WHERE COKho >12028-07-15'1; SELECT vid cita, m. nombre As medicamento, m. dosis, v. cantilou FROM Recetor Y DOIN Medicomento m ON vill-medicomento = m, id medicomento; SELECT AVE (edad) AS edad promedio FROM Possente; Rociente Clave compo 1/100 devoto tomo no devention 16-powerte INT NUMERO 24 nombre VARCHAR 100 numbre 2000 edod INT Doctor love compo Hipocke date Homano descripción IK Id-ductor INT NUNCIU VARCHAR 106 nombre nombre

Cito					
Clove	COMPU	Housedon	1 tome 8	re I decention	
14	10-cite	INT		Numero	
EK	id-potiont	IN7		erloce	
FK	id olocty	INT		enloce	
	teva	DATE		Fecho	
	hora	TIME		horo	
Medic	conentu				
Clave	(compo	1 tipo ded oto	I tomo n	ol dex nexion	
Pk	ilmediament	, INT		humeru	
	nombro	UANCHAR	100	nombre	
	010515	VARCHAR	50	olosis	
Recct	0				
Clave	1 compo	Hipodedon	Itomoño	1 descripcion	
PKFK	id_cita	INT		onlace	
PKFK	id_mediconal	. INT		enloce	
	contidoul	TPT		contidod	
Doctor	Especialida	0			
clove	1 campo	ltipodelot	1tomo no	1 devertación	
PKFK	12-boctor	INT		enloce	
PKFK	1 J-euperalisas	INT		enloce	