

# 1 Resultados

A continuación, se presentan los valores de los parámetros utilizados en todos los resultados siguientes:

Cuadro 1.1: Parámetros Hamiltonianos

Cavidad	Punto cuántico	Bombeo coherente	Interacción electrón-fonón	Campo magnético
$\omega_c = 1.00 \text{ meV}$	$\delta_0 = 40.0 \text{ } \mu\text{eV}$ $\delta_b = 18.0 \text{ } \mu\text{eV}$ $\delta_d = 5.00 \text{ } \mu\text{eV}$	$\Omega_1 = 82.0 \text{ } \mu\text{eV}$ $\Omega_2 = 0.00 \text{ } \mu\text{eV}$	$g_{bb} = 20.0 \text{ } \mu\text{eV}$ $g_{bd} = g_{bb}$	$g_{hx} = -0.35$ $g_{hz} = -2.20$ $g_{ex} = -0.65$ $g_{ez} = -0.80$ $\alpha = 20.0 \text{ } \mu\text{eV/T}^2$ $\mu_B = 57.9 \text{ } \mu\text{eV/T}$


Cuadro 1.2: Parámetros disipativos

Cavidad	Punto cuántico
$\kappa = 789 \text{ neV}$	$\gamma_b = 18.7 \text{ neV}$ $\gamma_d = 0.1\gamma_b$ $\gamma_\phi = 400 \text{ neV}$


## 1.1 Sin campo magnético ( $B = 0\text{T}$ )

En este apartado, se desea mostrar algunos detalles sobre la generación de las gigante-Rabi, tomando como referencia el trabajo realizado por los autores Vargas-Calderón et al. (2022). Primero, se presenta el diagrama de energías, donde se evidencia en qué puntos hay interacción y en cuáles no. En este diagrama, un cruce indica que no hay interacción, mientras que un anticruce señala que sí la hay. Este anticruce también se conoce como desdoblamiento de Rabi. Por lo tanto, se mostrarán los respectivos diagramas de dispersión para evidenciar lo mencionado anteriormente.


Como se observa en la figura 1.1, se detalla el procedimiento numérico para encontrar las gigante-Rabi en general. Aquí se indica que cuando se encuentra un anticruce, se está evidenciando una interacción en la que, en principio, se intercambian los estados de la base entre los respectivos estados propios. Esto se puede comprobar usando los coeficientes de Hopfield, en los que se grafica la probabilidad de cada uno de los estados de la base de




(a) Anticruce que evidencia la interacción entre los respectivos estados propios de energía.




(b) Cruce que evidencia la ausencia de interacción entre los respectivos estados propios de energía.




(c) Coeficientes de Hopfield para observar cuáles son los estados de la base involucrados en la interacción.



(d) Coeficientes de Hopfield para observar cuáles son los estados de la base involucrados en la reorganización de la base cuando no hay interacción.



(e) Gigante-Rabi entre los estados de la base observados en los coeficientes de Hopfield.



(f) La ausencia de la gigante-Rabi, como se esperaba.

Figura 1.1: Aquí observamos dos procesos: a la izquierda, la obtención de la gigante-Rabi a partir del diagrama de dispersión, y a la derecha, cuando no se obtiene la gigante-Rabi.

alguno de los dos vectores propios involucrados en la interacción. Una vez se obtiene el valor del detuning,  $\Delta \approx -n\omega_b$ , cuyo valor es negativo debido a que el detuning se define como  $\Delta = \omega_b - \omega_L$ . Es decir, es negativo porque se está ajustando la energía del láser a un valor mayor que el de la excitación del excitón brillante, condición requerida para generar las gigante-Rabi entre el estado vacío  $|v, 0\rangle$  y algún estado excitón. Esto indica que el sistema inicialmente se prepara en el estado vacío para que luego evolucione a un estado excitón. La variedad de excitación se entiende en este contexto como el número de excitación del modo fundamental del estado del sistema. El estado vacío tiene una variedad de excitación cero, mientras que el estado  $|n, X\rangle$  tiene una variedad de excitación de  $n+1$ , donde  $X$  indica cualquier estado excitón presente en el sistema, ya sean excitones brillantes u oscuros, que pueden ser simétricos o antisimétricos. Cuando la diferencia en la variedad de excitación es mayor a 1, se genera una gigante-Rabi.

## 1.2 Configuración de Voigt ( $\theta = 0^\circ$ )

## 1.3 Configuración de Faraday ( $\theta = 90^\circ$ )

## 1.4 Descomposición espectral

A continuación se muestra el espectro de energías del sistema cuando no hay campo magnético ( $B = 0$ ), es decir, el sistema modelado por (Vargas-Calderón et al., 2022). Se puede observar en la figura ?? que hay tres transiciones de estado permitidas y una prohibida a diferentes desafinamientos ( $\Delta = \omega_b - \omega_L$ ) con  $\omega_b$  siendo la energía de transición del estado vacío ( $|v, 0\rangle$ ) al estado excitón brillante simétrico ( $|X_{b+}, 0\rangle$ ) y  $\omega_L$  la energía del láser. A continuación se muestran las transiciones permitidas con sus desafinamientos correspondientes y la transición prohibida:

$$\langle v, 0 | H | X_{b+}, 2 \rangle \neq 0 \quad \text{con} \quad \Delta \approx -2.001 \text{ meV}, \quad (1.1)$$

$$\langle v, 0 | H | X_{b-}, 2 \rangle \neq 0 \quad \text{con} \quad \Delta \approx -1.981 \text{ meV}, \quad (1.2)$$

$$\langle v, 0 | H | X_{d+}, 2 \rangle \neq 0 \quad \text{con} \quad \Delta \approx -1.957 \text{ meV}, \quad (1.3)$$

$$\langle v, 0 | H | X_{d-}, 2 \rangle = 0 \quad \forall \Delta. \quad (1.4)$$

Como se puede observar la interacción es del orden de los  $\mu\text{eV}$  obteniendo que la intensidad de la interacción es la diferencia entre las energías correspondientes. Así si se activa el campo magnético vamos a ver en la figura ?? si el mínimo (donde sucede la interacción entre estados) sufre algún cambio.

En la figura ?? se observa que el desafinamiento depende de la intensidad campo magnético horizontal y es diferente para cada una de las transiciones permitidas, además, habilita la transición prohibida anteriormente sin campo magnético. A continuación menciono la función numérica relacionado con el corrimiento del desafinamiento que me permite

producir oscilaciones gigante Rabi con diferencia 3 en las variedades de excitacion:

$$\langle v, 0 | H | X_{b+}, 2 \rangle \quad \text{con} \quad \Delta \approx -2.001 \text{ meV} - 0.025B - 0.02B^2, \quad (1.5)$$

$$\langle v, 0 | H | X_{b-}, 2 \rangle \quad \text{con} \quad \Delta \approx -1.981 \text{ meV} - 0.01B - 0.02B^2, \quad (1.6)$$

$$\langle v, 0 | H | X_{d+}, 2 \rangle \quad \text{con} \quad \Delta \approx -1.957 \text{ meV} - 0.02B^2, \quad (1.7)$$

$$\langle v, 0 | H | X_{d-}, 2 \rangle \quad \text{con} \quad \Delta \approx -1.954 \text{ meV} + 0.018B - 0.02B^2. \quad (1.8)$$




Figura 1.2: Desfinamiento  $\Delta$  variando la magnitud del campo magnetico horizontal  $\theta = 0$  rad, para la gigante-Rabi de cada estado exciton, son cuatro posibles permitidos con diferencia tres entre sus variedades de excitacion, donde se observa que  $\Delta$  depende del campo magnetico al cadrado,  $\Delta \sim B^2$ , con algunas transiciones involucran dependencia lineal del campo magnetico.