

# MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA INFORMÁTICA

## 6. Diagonalización

6.1. Calcula los autovalores y autovectores de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 7 & -6 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 & 9 \\ 2 & 1 & 6 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

6.2. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Se pide:

- a) Autovalores y autovectores.
- b) ¿Es diagonalizable?
- c) La matriz de paso y la matriz diagonal.

6.3. Halla la forma diagonal, si es posible, de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

6.4. Dado el endomorfismo  $f$  de matriz asociada

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

¿se puede encontrar otra base  $B'$ , tal que respecto de ella sea  $f$  diagonalizable?

6.5. Halla los autovalores y autovectores del endomorfismo de  $\mathbb{R}^3$  dado por

$$f(x, y, z) = (x + 2y - z, 2y + z, 2y + 3z).$$

6.6. Halla los valores propios y los vectores propios de los siguientes endomorfismos:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= (4x_1 + 3x_2, 3x_1 - 4x_2), \\ g(x, y, z) &= (2y - z, 2x - z, 2x - y). \end{aligned}$$

6.7. Se considera el giro de centro  $(0,0)$  de ángulo  $\alpha \in (0, 2\pi)$  en el plano  $\mathbb{R}^2$  dado por la aplicación  $G(x_1, x_2) = (x_1 \cos \alpha + x_2 \sin \alpha, -x_1 \sin \alpha + x_2 \cos \alpha), \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ .

a) Prueba que  $G$  es una aplicación lineal.

b) Prueba que la matriz asociada a  $G$  no tiene ningún autovector. ¿Sabrías dar una justificación geométrica de este hecho?

6.8. Halla los autovectores de la matriz

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6.9. ¿Son diagonalizables las siguientes matrices?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2+k \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6.10. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) ¿Es diagonalizable?

b) Halla la base y la forma diagonal.

6.11. Sea  $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$  una base de un espacio vectorial  $V_3$  y sea  $f$  el endomorfismo de  $V_3$  dado por

$$f(\vec{u}_1) = \vec{u}_1 + \vec{u}_2, \quad f(\vec{u}_2) = 2\vec{u}_1, \quad \text{Ker } f = L(\vec{u}_1 + \vec{u}_3).$$

Se pide:

a) La matriz de  $f$  respecto de la base  $B$ .

b) La imagen de  $f$  y su dimensión.

c) Los autovalores y la ecuación característica de  $f$ .

d) Una base  $B'$  respecto de la cual  $f$  sea diagonalizable.

e) La matriz del cambio de base de  $B$  a  $B'$ .

6.12. Estudia para qué valores de los parámetros son diagonalizables las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ p & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & q \\ 3 & 0 & p \end{pmatrix}.$$

6.13. Halla  $A^{33}$ , siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

6.14. Se tiene dos sucesiones de números reales  $(x_n)_{n=1}^{\infty}$  y  $(y_n)_{n=1}^{\infty}$  de modo que:

$$x_{n+1} = 6x_n - y_n$$

$$y_{n+1} = 3x_n + 2y_n$$

Calcula  $\frac{1}{4}(3x_{n+1} + y_{n+1})$ , siendo  $x_1 = y_1 = 1$ .

6.15. ¿Cuántas parejas de conejos se tendrán en un año, comenzando con una sola, si cada mes una de las parejas da origen a una nueva, la cual vuelve a reproducirse a partir del segundo mes? (Fibonacci, *Liber Abaci*, s. XIII).

6.16. Para aprobar una asignatura de grado se tiene un máximo de 6 convocatorias. En cada convocatoria ocurre que los alumnos que se presentan por primera vez aprueban 3 de cada 10, obtienen compensable (entre 4 y 5) otros 3 de cada 10 y suspende el resto. Además los alumnos compensables de otras convocatorias aprueban 7 de cada 10, saca compensable 1 de cada 10 y suspenden los demás. Y por último, los alumnos suspensos de otras convocatorias aprueban 3 de cada 10 y el resto suspende. Partiendo de un grupo de 125 alumnos que cursan por primera vez la asignatura ¿cuántos de ellos no llegarán a aprobarla?