

Estadística

Práctica 6

Variables aleatorias y distribuciones continuas

Contenido

1. Introducción	3
2. Variables continuas con distribución Normal.....	3
2.1 Ejemplo: Calificaciones de estudiantes	8
2.2 Aproximar una variable Binomial o de Poisson a una distribución Normal.....	14
1) Aproximar una variable Binomial a una distribución Normal	14
2) Aproximar una variable de Poisson a una distribución Normal	15
3. Variables continuas con distribución Exponencial	17
3.1 Ejemplo: Correo electrónico no deseado (spam).....	19
4. Otras distribuciones continuas	21
4.1 Variables continuas con distribución general.....	23
5. Ejercicios propuestos.....	25

1. Introducción

Con esta práctica se utiliza R y RStudio para calcular probabilidades de sucesos a partir de variables aleatorias continuas que tienen una distribución Normal o una distribución Exponencial; y de variables aleatorias discretas que pueden aproximarse a una distribución Normal.

2. Variables continuas con distribución Normal

Una variable Normal es una variable continua (X) cuya función de probabilidad o densidad de probabilidad se ajusta a la siguiente expresión matemática, siendo μ la esperanza (media) y σ la desviación estándar de la variable:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Se representa como $X: N(\mu, \sigma)$ y se dice que X tiene una distribución Normal.

Por ejemplo, una variable $X: N(5,1)$ que representa: “Calificación obtenida en una asignatura con una esperanza de 5 puntos y una desviación estándar de 1 punto”.

En R se pueden utilizar las funciones indicadas en la siguiente tabla. Por simplicidad, para la esperanza “ μ ” usaremos “ m ” y para la desviación estándar usaremos “ d ”. En la columna “Ejemplo de uso”, se utiliza una variable $N(5,1)$.

Función	Código R	Resultado	Ejemplo de uso
Densidad de probabilidad $f(x)$	<code>dnorm(x, m, d)</code> También puede usarse: <code>dnorm(x, mean=m, sd=d)</code>	En teoría el resultado siempre debería ser 0, sólo debe usarse para dibujar la función de densidad.	No debe usarse para calcular probabilidades, sólo para dibujar.
Distribución acumulada $F(x) = P\{X \leq x\}$ $= P\{X < x\}$	<code>pnorm(x, m, d)</code>	Calcula la probabilidad de que una variable aleatoria Normal $X: N(m, d)$ tenga un valor igual o menor que x .	<pre>>pnorm(6, 5, 1) [1] 0.8413447</pre>
Cuantil	<code>qnorm(q, m, d)</code>	Calcula el “menor” valor de una variable aleatoria Normal $X: N(m, d)$ que cumple que la probabilidad de que la variable sea menor o igual a ese valor es igual a q .	<pre>>qnorm(0.7, 5, 1) [1] 5.524401</pre> Entonces se cumple: $P\{X \leq 5.524401\} = 0.7$

Función	Código R	Resultado	Ejemplo de uso
Generación aleatoria de muestras	<code>rnorm(n,m,d)</code>	Genera aleatoriamente un vector de n valores aleatorios de una variable Normal $X: N(m, d)$.	<pre>>rnorm(4,5,1) [1] 6.187306 4.550551 4.250897 4.2582126</pre>
Esperanza $E[X]$	m		<pre>>(E=5) [1] 5</pre>
Varianza $Var[X]$	d^2		<pre>>(Var=1^2) [1] 1</pre>

Las funciones anteriores se pueden combinar con otras de generación de gráficos, para obtener los diagramas que se indican en la siguiente tabla.







Diagrama	Código R	Comentarios	Ejemplo de uso
Función de densidad de probabilidad	<code>curve(dnorm(x,m,d),a,b)</code>	Dibuja el resultado de la función desde $x = a$ hasta $x = b$	<pre>>curve(dnorm(x,5,1),-10,20)</pre> 
Función de distribución acumulada	<code>curve(pnorm(x,m,d),a,b)</code>	Dibuja el resultado de la función desde $x = a$ hasta $x = b$	<pre>>curve(pnorm(x,5,1),-10,20)</pre> 


Diagrama	Código R	Comentarios	Ejemplo de uso
Histograma de una muestra de valores reales de la variable aleatoria	<pre>hist(datos,breaks=a: b, freq=FALSE) curve(dnorm(x,m,d),a ,b, add=TRUE)</pre>	Se puede representar primero el histograma con los datos de la variable y después la función de densidad de probabilidad Normal teórica, para ver si son similares. Los valores reales de la muestra están en "datos".	<pre>>datos=c(5,5,4,6,4,5, 5,3,3,6) >hist(datos, breaks = 0:10 freq=FALSE) >curve(dnorm(x,5,1),0 ,10, add=TRUE, col="red")</pre> 
Histograma de una muestra de valores simulados de la variable aleatoria	<pre>hist(rnorm(s,m,d), breaks=a:b, freq=FALSE) curve(dnorm(x,m,d),a ,b, add=TRUE)</pre>	Se puede representar primero el histograma con los datos de la simulación de "s" datos y después la función de probabilidad Normal teórica, para ver si son similares.	<pre>>hist(rnorm(100,5,1), breaks = 0:10, freq=FALSE) >curve(dnorm(x,5,1),0 ,10, add=TRUE, col="red")</pre> 
Diagrama de densidad a partir de una muestra de valores reales de la variable aleatoria	<pre>plot(density(datos)) curve(dnorm(x,m,d),a ,b, add=TRUE)</pre>	Se utiliza la función density() de R. Los valores reales de la muestra están en "datos".	<pre>>datos=c(5,5,4,6,4,5, 5,3,3,6) >plot(density(datos)) >curve(dnorm(x,5,1),0 ,10, add=TRUE, col="red")</pre> 
Diagrama de densidad a partir de una muestra de valores simulados de la variable aleatoria	<pre>plot(density(rnorm(s ,m,d))) curve(dnorm(x,m,d),a ,b, add=TRUE)</pre>	Se utiliza la función density() de R.	<pre>>plot(density(rnorm(1 00,5,1))) >curve(dnorm(x,5,1),0 ,10, add=TRUE, col="red")</pre> 

En la función `curve()` se indica `add=TRUE` para que se dibuje sobre el diagrama anterior.

Se puede comparar el efecto de modificar los parámetros m y d , mostrando simultáneamente varios gráficos.


Por ejemplo, dividiendo la ventana gráfica en 2 filas y 3 columnas:

```
par(mfrow=c(2,3))
curve(dnorm(x,0,1),-10,10, main = "N(0,1)")
curve(dnorm(x,5,1),-10,10, main = "N(5,1)")
curve(dnorm(x,10,1),-10,10, main = "N(5,1)")
curve(dnorm(x,0,0.4),-10,10, main = "N(0,0.4)")
curve(dnorm(x,5,0.4),-10,10, main = "N(5,0.4)")
curve(dnorm(x,10,0.4),-10,10, main = "N(5,0.4)")
par(mfrow=c(1,1))
```



O se pueden dibujar varios diagramas en el mismo gráfico, el primero con plot y el resto con lines:

```
curve(dnorm(x,0,1),-10,10)
curve(dnorm(x,5,1),-10,10, add=TRUE, col="red")
curve(dnorm(x,10,1),-10,10, add=TRUE, col="blue")
legend("topleft",legend=c("N(0,1)", "N(5,1)", "N(10,1)"),
      col=c("black", "red", "blue"), bg="transparent", lty=1)
```



Se recomienda investigar diferentes formas de dibujar la leyenda en el gráfico.

2.1 Ejemplo: Calificaciones de estudiantes

ENUNCIADO

Mediante una encuesta, se saben las calificaciones de acceso a la universidad de 74 estudiantes de un curso de la asignatura Estadística del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá. Si se supone que tienen una distribución Normal, responder a las siguientes preguntas:

- Definir una variable aleatoria Normal para la calificación de un estudiante seleccionado al azar
- Calcular la media o esperanza y la varianza de la variable aleatoria
- Dibujar las funciones de densidad de probabilidad y distribución acumulada de la variable aleatoria
- Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una calificación menor de 7. Dibujar en el diagrama de la función de densidad el área correspondiente a la acumulación de la probabilidad obtenida.
- Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una calificación de entre 7 y 9. Dibujar en el diagrama de la función de densidad el área correspondiente a la acumulación de la probabilidad obtenida.
- Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una calificación mayor que 9. Dibujar en el diagrama de la función de densidad el área correspondiente a la acumulación de la probabilidad obtenida.
- Cuál es el valor de los cuartiles de la variable aleatoria. Dibujar en el diagrama de la función de densidad el área correspondiente al segundo cuartil.
- Si tenemos los datos de la encuesta original a los 74 estudiantes, comprobar si tomando las notas reales, el histograma se ajusta realmente a la distribución Normal.
- Repetir el apartado anterior, pero haciendo la comprobación utilizando el diagrama de la función de densidad generada con `density()`.

SOLUCIÓN

a) Definir una variable aleatoria Normal para la calificación de un estudiante

X = Calificación de un estudiante seleccionado al azar de una muestra de 74 estudiantes.

La variable sigue una distribución Normal $N(m,d)$, donde hay que calcular m y d .

La media es m , por lo que hay que acceder a las notas de los 74 estudiantes y calcular la media.

En el archivo [encuesta.csv](#) estaban los resultados de la encuesta.

```
> encuesta = read.csv2("encuesta.csv")
> (m = round(mean(encuesta$NOTA), 2))
[1] 8.02
> (d = round(sd(encuesta$NOTA), 2))
[1] 1.13
```



Por tanto la variable es $X:N(8.02, 1.13)$.

b) Calcular la media o esperanza y la varianza de la variable aleatoria

```
> (Esperanza = m)
[1] 8.02
> (Varianza = round(d^2,2))
[1] 1.28
```

c) Dibujar las funciones de densidad de probabilidad y distribución acumulada.

```
> par(mfrow=c(1,2))
> curve(dnorm(x,m,d),0,20, main="Función de densidad")
> curve(pnorm(x,m,d),0,20, main="Función de distribución")
> par(mfrow=c(1,1))
```




d) Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una calificación menor de 7

Se trata de calcular $P\{X < 7\}$ que al ser una variable continua equivale a $P\{X \leq 7\}$. Se puede usar, por tanto la función de distribución `pnorm()`:

```
> (P.menor.7=pnorm(7,m,d))
[1] 0.1829814
```

Para dibujar el área correspondiente a la acumulación de la probabilidad obtenida, podemos ejecutar la función `xnorm()` del paquete `mosaic`:

```
> install.packages("mosaic")
> library(mosaic)
> xpnorm(c(0, 7), m, d, xlim=c(0, 12))
```




e) Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una calificación de entre 7 y 9

Se trata de calcular $P\{X \leq 9\} - P\{X \leq 7\}$.

```
> (P.entre.7.y.9=pnorm(9,m,d)-pnorm(7,m,d))
[1] 0.6232614
```

Para dibujar el área correspondiente a la acumulación de la probabilidad obtenida, podemos ejecutar el siguiente comando:

```
> xpnorm(c(7, 9), m, d, xlim=c(0, 12))
```




f) Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una calificación superior a 9.

En ese caso $P\{X > 9\} = 1 - P\{X < 9\}$.

```
> (P.mayor.9=1-pnorm(9,m,d))
[1] 0.1937572
```

```
> 1-xpnorm(c(0,9),m,d, xlim=c(0,12))
```



g) Cuál es el valor de los cuartiles de la variable aleatoria (es decir los percentiles 25%, 50%, 75%, o cuantiles 0.25, 0.50, 0.75). Dibujar en el diagrama de la función de densidad el área correspondiente al segundo cuartil.

En lugar de ejecutar 4 veces la función `qnorm()`, una para cada cuartil, se puede pasar como primer argumento, un vector con los valores de los cuantiles correspondiente a cada cuartil:

```
> (cuartiles=round(qnorm(c(0.25,0.50,0.75),m,d),2))
[1] 7.26 8.02 8.78
```

Lo que indican estos resultados es que:


- $P\{X \leq 7.26\} = 0.25$
- $P\{X \leq 8.02\} = 0.50$
- $P\{X \leq 8.78\} = 0.75$

Puede comprobarse que es cierto con la función de distribución, por ejemplo, para el segundo cuartil:

```
> (segundo.cuartil=cuartiles[2])
[1] 8.02
> (p.segundo.cuartil=pnorm(segundo.cuartil,m,d))
[1] 0.5
```

Se puede mostrar gráficamente:

```
> xpnorm(c(0,segundo.cuartil),m,d, xlim=c(0,12))
```




h) Si tenemos los datos de la encuesta original a los 74 estudiantes, comprobar si tomando las notas reales, el histograma se ajusta realmente a la distribución Normal

Las notas están en la columna NOTA:

```
> (notas.reales=encuesta$NOTA)
[1] 8.50 7.10 8.63 8.62 8.20 8.70 7.21 7.63 8.40 8.30
[11] 8.20 9.10 9.79 10.11 8.02 7.31 7.50 8.71 8.34 9.21
[21] 7.80 10.30 7.99 6.90 7.80 10.00 8.59 7.00 8.05 10.80
[31] 7.99 8.55 7.34 6.75 9.56 7.42 6.94 7.21 7.68 10.28
[41] 7.86 10.26 7.27 5.80 7.30 7.14 8.60 7.50 8.00 7.54
[51] 7.29 7.83 6.75 9.81 6.80 6.44 6.65 7.80 10.27 7.60
[61] 7.87 7.00 7.08 7.48 8.07 5.82 6.50 9.90 7.50 6.50
[71] 9.46 8.00 7.80 7.65
```

Podemos crear un vector con esos valores y dibujar su histograma y superponer la curva de la función de densidad Normal.


```
> hist(notas.reales, freq=FALSE)
> curve(dnorm(x,m,d),0,20, add = TRUE)
```



Puede comprobarse visualmente que el histograma con los datos reales se ajusta aproximadamente a la forma de la distribución Normal usada en este ejemplo.

i) Repetir el apartado anterior pero haciendo la comprobación utilizando el diagrama de la función de densidad generada con density().

```
> plot(density(notas.reales))
> curve(dnorm(x,m,d),0,12, add=TRUE, col="red")
> legend("topleft", legend=c("Notas", "N(8.02,1.13)"), col=c("black", "red"), lty=1)
```



2.2 Aproximar una variable Binomial o de Poisson a una distribución Normal

1) Aproximar una variable Binomial a una distribución Normal

Si en una variable Binomial $X: B(n, p)$ se cumple que n es grande¹, entonces se puede aproximar a una variable Normal $X: N(m, d)$, con $m = np$ y $d = \sqrt{np(1-p)}$, y se puede calcular que la variable Binomial esté en el intervalo $[a, b]$ calculando $P\{X \leq b\} - P\{X < a\}$ aplicando la Normal, pero en este caso sería $P\{X < b + 0.5\} - P\{X < a - 0.5\}$, porque hay que expandir el intervalo sumando y restando 0.5 en cada extremo debido a la conocida corrección de continuidad, debido a que la distribución Binomial es discreta y la Normal continua.


Se puede comprobar por ejemplo con $B(100, 0.5)$, aproximándola a una Normal $N(50, 5)$.

```
> (n=100)
[1] 100
> (p=0.5)
[1] 0.5
> (m=n*p)
[1] 50
> (d=sqrt(n*p*(1-p)))
[1] 5
```

Podemos comparar gráficamente sus funciones de masa (Binomial) y densidad (Normal) de probabilidad:

```
> plot(0:n, dbinom(0:n, n, p), type="h", main="Comparación entre B(100, 0.5) y
N(50, 5)")
> curve(dnorm(x, m, d), 0, n, add = TRUE, col="red")
> legend("topleft", legend = c("Binomial", "Normal"), col = c("black", "red"),
lwd = 1)
```

¹ No hay unanimidad respecto a lo que se entiende por “grande” ni por la condición que debe cumplir p . Algunos autores establecen que la aproximación es buena cuando $n \geq 30$, $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$; otros autores establecen $n > 50$ y p con un valor cercano a 0.5.



Y la probabilidad de que la variable Binomial esté, por ejemplo, en el intervalo $[40, 50]$, aplicando la función de distribución acumulada de la Normal:

```
> pnorm(50+0.5,m,d)-pnorm(40-0.5,m,d)
[1] 0.5219634
```

Que coincide en gran medida con el resultado que se obtendría aplicando la Binomial:

```
> pbinom(50,n,p)-pbinom(39,n,p)
[1] 0.5221945
```

2) Aproximar una variable de Poisson a una distribución Normal

Si en una variable de Poisson $X: P(\lambda)$ se cumple que λ es grande², entonces se puede aproximar a una variable Normal $X: N(m, d)$, con $m = \lambda$ y $d = \sqrt{\lambda}$, y se puede calcular que la variable de Poisson esté en el intervalo $[a, b]$ calculando $P\{X \leq b\} - P\{X < a\}$ aplicando la Normal, pero en este caso sería $P\{X < b + 0.5\} - P\{X < a - 0.5\}$, porque hay que expandir el intervalo sumando y restando 0.5 en cada extremo debido a la conocida corrección de continuidad.


Se puede comprobar por ejemplo con $P(100)$, aproximándola a una Normal $N(100, 10)$.

```
> (lambda=100)
[1] 100
> (m=lambda)
[1] 100
> (d=sqrt(lambda))
[1] 10
```

² No hay unanimidad respecto a lo que se entiende por “grande”. Algunos autores establecen que es suficiente $\lambda > 5$, otros $\lambda > 10$, otros $\lambda > 16$.

Podemos comparar gráficamente sus funciones de masa (Poisson) y densidad (Normal) de probabilidad:

```
> plot(0:200,dpois(0:200,lambda), type="h", main="Comparación entre P(100) y N(100,10)")
> curve(dnorm(x,m,d),0,200, add = TRUE, col="red")
> legend("topleft", legend = c("Poisson", "Normal"), col = c("black", "red"), lwd = 1)
```



Y la probabilidad de que la variable de Poisson esté, por ejemplo, en el intervalo [80,90], aplicando la función de distribución acumulada de la Normal:

```
> pnorm(90+0.5,m,d)-pnorm(80-0.5,m,d)
[1] 0.1508739
```

Que coincide en gran medida con el resultado que se obtendría aplicando la de Poisson:

```
> ppois(90,lambda)-ppois(79,lambda)
[1] 0.1539338
```


3. Variables continuas con distribución Exponencial

El tiempo que transcurren entre la ocurrencia de dos eventos consecutivos con distribución de $Poisson(\lambda)$ ³, es una variable aleatoria (X) con distribución de probabilidad exponencial. Se representa como $X: Exp(\lambda)$.



Por ejemplo, una variable $X: Exp(2)$ que representa: “*Tiempo entre dos visitas a un sitio web, sabiendo que la media de visitas en una hora es de 2 ($\lambda=2$)*”.

En R se pueden utilizar las funciones indicadas en la siguiente tabla. En la columna “Ejemplo de uso”, se utiliza una variable $X: Exp(2)$.

Función	Código R	Resultado	Ejemplo de uso
Densidad de probabilidad $f(x)$	<code>dexp(x, λ)</code> o bien <code>λ*exp(-λ*x)</code>	En teoría el resultado siempre debería ser 0, sólo debe usarse para dibujar la función de densidad. $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$	No debe usarse para calcular probabilidades, sólo para dibujar.
Distribución acumulada $F(x)$ $= P\{X \leq x\}$ $= P\{X < x\}$	<code>pexp(x, λ)</code> o bien <code>1-exp(-λ*x)</code>	Calcula la probabilidad de que una variable aleatoria Exponencial $X: Exp(\lambda)$ tenga un valor igual o menor que x . $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$	<code>> pexp(0.5, 2)</code> [1] 0.6321206
Cuantil	<code>qexp(q, λ)</code>	Calcula el menor valor de una variable aleatoria Exponencial $X: Exp(\lambda)$ que cumple que la probabilidad de que la variable sea menor o igual a ese valor es igual a q .	<code>> qexp(0.9, 2)</code> [1] 1.151293 Entonces se cumple: $P\{X \leq 1.151293\} = 0.9$
Generación aleatoria de muestras	<code>rexp(n, λ)</code>	Genera aleatoriamente un vector de n valores aleatorios de una variable Exponencial $X: Exp(\lambda)$.	<code>> rexp(4, 2)</code> [1] 2.76219534 0.88592152 0.08872055 1.80255003
Esperanza $E[X]$	<code>1/(λ^2)</code>		<code>> (E=1/2)</code> [1] 0.5
Varianza $Var[X]$	<code>d^2</code>		<code>> (Var=1/(2^2))</code> [1] 0.25

³ El símbolo λ (letra griega lambda) se escribe pulsando Alt + 955.

Las funciones anteriores se pueden combinar con otras de generación de gráficos, para obtener los diagramas que se indican en la siguiente tabla.

Diagrama	Código R	Comentarios	Ejemplo de uso
Función de densidad de probabilidad	<code>curve(dexp(x, λ), a, b)</code>	Dibuja el resultado de la función desde $x = a$ hasta $x = b$	<pre>>curve(dexp(x, 2), 0, 10)</pre> 
Función de distribución acumulada	<code>curve(pexp(x, λ), a, b)</code>	Dibuja el resultado de la función desde $x = a$ hasta $x = b$	<pre>>curve(pexp(x, 2), 0, 10)</pre> 

3.1 Ejemplo: Correo electrónico no deseado (spam)

ENUNCIADO

Una persona ha comprobado que recibe una media de 48 mensajes al día de correo electrónico no deseado (spam).

- Definir una variable aleatoria Exponencial para el tiempo entre mensajes
- Calcular la esperanza de la variable aleatoria
- Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre dos mensajes sea de menos de 1 hora
- Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre mensajes sea de más de 1 hora
- Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre mensajes esté entre 1 y 2 horas

a) Definir una variable aleatoria Exponencial para el tiempo entre mensajes

X = Tiempo entre dos mensajes no deseados recibidos, sabiendo que la media de mensajes no deseados recibidos en una hora es de $48/24=2$ mensajes.

NOTA: Como las preguntas se refieren a horas se ha hecho la conversión de días a horas.

La variable sigue una distribución *Exponencial*(λ), donde $\lambda = 48/24 = 2$ mensajes/hora. Por simplicidad se utiliza "lambda" en lugar de " λ " en el código R.

```
> (lambda=48/24)
[1] 2
```

b) Calcular la esperanza de la variable aleatoria

La esperanza es $1/\lambda$ horas entre dos mensajes consecutivos.

```
> (Esperanza = 1/lambda)
[1] 0.5
```

c) Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre dos mensajes sea de menos de 1 hora

Se trata de calcular $P\{X < 1\}$ que al ser una variable continua equivale a $P\{X \leq 1\}$. Se puede usar, por tanto, la función de distribución acumulada `pexp()`:

```
> pexp(1,lambda)
[1] 0.8646647
```

d) Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre mensajes sea de más de 1 hora

En ese caso $P\{X > 1\} = 1 - P\{X < 1\}$.

```
> 1-pexp(1,lambda)
[1] 0.1353353
```

e)Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre mensajes esté entre 1 y 2 horas

Se trata de calcular $P\{X \leq 2\} - P\{X \leq 1\}$.

```
> pexp(2,lambda)-pexp(1,lambda)
[1] 0.1170196
```

4. Otras distribuciones continuas

En R se pueden utilizar otras distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, y para todas ellas existen las funciones de densidad, de distribución, de cálculo de cuantiles y de generación de valores aleatorios. Se trata de las siguientes:

Distribución	Función de densidad	Función de distribución	Cuantiles	Generación valores aleatorios
Beta	<code>dbeta()</code>	<code>pbeta()</code>	<code>qbeta()</code>	<code>rbeta()</code>
Cauchy	<code>dcauchy()</code>	<code>pcauchy()</code>	<code>qcauchy()</code>	<code>rcauchy()</code>
Chi-cuadrado	<code>dchisq()</code>	<code>pchisq()</code>	<code>qchisq()</code>	<code>rchisq()</code>
F	<code>df()</code>	<code>pf()</code>	<code>qf()</code>	<code>rf()</code>
Gamma	<code>dgamma()</code>	<code>pgamma()</code>	<code>qgamma()</code>	<code>rgamma()</code>
Gamma inversa	<code>dIGAMMA()</code>	<code>pIGAMMA()</code>	<code>qIGAMMA()</code>	<code>rIGAMMA()</code>
Log-normal	<code>dlnorm()</code>	<code>plnorm()</code>	<code>qlnorm()</code>	<code>rlnorm()</code>
T de Student	<code>dt()</code>	<code>pt()</code>	<code>qt()</code>	<code>rt()</code>
Uniforme	<code>dunif()</code>	<code>punif()</code>	<code>qunif()</code>	<code>runif()</code>
Weibull	<code>dweibull()</code>	<code>pweibull()</code>	<code>qweibull()</code>	<code>rweibull()</code>
Wilcoxon	<code>dwilcox()</code>	<code>pwilcox()</code>	<code>qwilcox()</code>	<code>rwilcox()</code>

Para ver la ayuda sobre las distribuciones en R se puede ejecutar el comando `help("Distributions")`.

Se pueden encontrar ejemplos en R en <https://fhernanb.github.io/Manual-de-R/continuas.html>. Y los fundamentos teóricos de éstas y otras distribuciones de variables continuas en https://es.m.wikipedia.org/wiki/Distribución_de_probabilidad.

Se puede comprobar a qué distribución se aproxima más un conjunto de datos reales, usando la función `fitDist()` del paquete `gamlss`:

```
> install.packages("gamlss")
> library(gamlss)
```

Por ejemplo, en el caso de los datos de las calificaciones de los 74 estudiantes del apartado 2.3, que estaban en el vector `notas.reales` sería:

```
> fitDist(notas.reales)
....
Family:  c("IGAMMA", "Inverse Gamma")
```

Al final del listado que se obtiene aparece que es la distribución “Gamma Inversa” a la que mejor se adapta el conjunto de las notas.

En el paquete `gamlss` también existe la función `histDist()` que se puede utilizar para dibujar el histograma de los datos junto a una función de densidad de la distribución, en este caso podemos indicar Gamma Inversa (IGAMMA):

```
> histDist(notas.reales, family=IGAMMA)


Family:  c("IGAMMA", "Inverse Gamma")
Fitting method: "nlminb"

Call:  gamlssML(formula = notas.reales, family = "IGAMMA")

Mu Coefficients:
[1]  2.045
Sigma Coefficients:
[1] -1.993

Degrees of Freedom for the fit: 2 Residual Deg. of Freedom   72
Global Deviance:      222.226
AIC:      226.226
SBC:      230.834
```


The notas.reales and the fitted IGAMMA distribution



Podemos ver el mismo diagrama, pero comparando con la Normal (NO):

```
> histDist(notas.reales, family=NO)
```

The notas.reales and the fitted NO distribution



4.1 Variables continuas con distribución general

Si dada una variable aleatoria continua de la que disponemos de un conjunto de valores, no encontramos ninguna distribución conocida (Normal, Beta, Gamma, etc.) a la que se ajuste, entonces se pueden utilizar las funciones `density()` y `ecdf()` para calcular empíricamente probabilidades relacionadas con variable.



Toda variable aleatoria continua X tiene asociada dos funciones:

- La función de densidad de probabilidad $f(x)$: que representa la probabilidad de que la variable tenga un valor concreto: $P\{X = x\}$. En el caso de las variables continuas, esta función sólo se utiliza a efectos teóricos y de representación gráfica, porque la probabilidad de la variable en un punto no puede calcularse, es cero, y siempre hay que calcular la probabilidad en un intervalo. En el caso de R se puede asociar a la función `density()`.
- La función de distribución acumulada $F(x)$, que representa la probabilidad de que la variable sea igual a inferior a un valor concreto: $P\{X \leq x\}$. En una variable continua, al no tener sentido hablar de probabilidad de un valor, en este caso se cumple que $P\{X \leq x\} = P\{X < x\}$. En el caso de R se puede asociar a la función `ecdf()`.

Si disponemos de una muestra de valores de la variable, con R se pueden manejar ambas funciones como se indica en la siguiente tabla.

Función	Código R	Resultado	Ejemplo de uso
Densidad de probabilidad $f(x)$	<pre>x = vector con la muestra de valores conocidos de la variable X f=density(x)</pre>	Al ser una variable continua, en teoría el resultado siempre debería ser 0, sólo debe usarse para dibujar la función de densidad.	No debe usarse para calcular probabilidades, sólo para dibujar.
Distribución acumulada $F(x)$ $= P\{X \leq x\}$ $= P\{X < x\}$	<pre>x = vector con la muestra de valores conocidos de la variable X F=ecdf(x)</pre>	Calcula la probabilidad de que la variable aleatoria X tenga un valor igual o menor que x . El nombre de la función proviene de "empirical cumulative distribution function".	<pre>>x=c(5.1, 5.2, 4.5, 6.2, 4.2, 5.3, 5.2, 3.1, 3.5, 6.1) >F=ecdf(x) >F(4.8) [1] 0.4</pre>

Las funciones anteriores se pueden combinar con otras de generación de gráficos, para obtener los diagramas que se indican en la siguiente tabla.

Diagrama	Código R	Ejemplo de uso
Función de densidad de probabilidad	<code>plot(density(x))</code>	<pre>>x=c(5.1, 5.2, 4.5, 6.2, 4.2, 5.3, 5.2, 3.1, 3.5, 6.1) >plot(density(x))</pre> 
Función de distribución acumulada	<code>plot(ecdf(x))</code>	<pre>>x=c(5.1, 5.2, 4.5, 6.2, 4.2, 5.3, 5.2, 3.1, 3.5, 6.1) >plot(ecdf(x))</pre> 

5. Ejercicios propuestos

- 1) Mediante una encuesta cuyas respuestas están disponibles en el archivo encuesta.csv, y después de eliminar las respuestas de las personas que no contestaron alguna pregunta, se sabe el tiempo en minutos del viaje a la Escuela Politécnica de 74 estudiantes de un curso de la asignatura Estadística del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá. Si se supone que tienen una distribución Normal, responder a las siguientes preguntas:
 - a) Definir una variable aleatoria Normal para el tiempo del viaje de un estudiante
 - b) Calcular la media o esperanza y la varianza de la variable aleatoria
 - c) Dibujar las funciones de densidad y distribución acumulada de la variable aleatoria
 - d) Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tarde menos de 1 hora en llegar a la escuela. Dibujar en el diagrama de la función de densidad el área correspondiente a la acumulación de la probabilidad obtenida.
 - e) Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tarde entre 1 hora y 1 hora y media. Dibujar en el diagrama de la función de densidad el área correspondiente a la acumulación de la probabilidad obtenida.
 - f) Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tarde más de 1 hora y media. Dibujar en el diagrama de la función de densidad el área correspondiente a la acumulación de la probabilidad obtenida.
 - g) Cuál es el valor de los cuartiles de la variable aleatoria. Dibujar en el diagrama de la función de densidad el área correspondiente al segundo cuartil.
 - h) Si tenemos los datos de la encuesta original a los 74 estudiantes, comprobar si tomando los tiempos reales, el histograma se ajusta realmente a la distribución Normal.
 - i) Repetir el apartado anterior pero haciendo la comprobación utilizando el diagrama de la función de densidad generada con `density()`.

- 2) Resolver el ejercicio 1) de la práctica P5 (parte 1) aproximando la distribución Binomial $B(50, 1/6)$ a una distribución Normal y comparar los resultados.
- a) Definir una variable aleatoria Normal aproximando a la Binomial
 - b) Calcular la esperanza y varianza de la variable aleatoria
 - c) Dibujar las funciones de densidad de probabilidad y distribución acumulada de la variable aleatoria
 - d) Calcular la probabilidad de que nunca aparezca el lado con el valor 6.
 - e) Calcular la probabilidad de que siempre aparezca el lado con el valor 6.
 - f) Calcular la probabilidad de que el lado con el valor 6 aparezca menos de 10 veces.
 - g) Calcular la probabilidad de que el lado con el valor 6 aparezca más de 10 veces.
 - h) Calcular la probabilidad de que el lado con el valor 6 aparezca entre 20 y 40 veces.
 - i) Calcular los cuantiles 0.50 y 0.90.
 - j) Generar aleatoriamente 100 valores para la variable y comprobar si el histograma se ajusta realmente a la función de densidad de la Normal.
- 3) Resolver el ejercicio 3) de la práctica P5 (parte 1) aproximando la distribución de Poisson $P(120)$ a una distribución Normal y comparar los resultados.
- a) Definir una variable Normal aproximando a la de Poisson para el número de visitas en una hora
 - b) Calcular la esperanza y varianza de la variable aleatoria
 - c) Dibujar las funciones de densidad de probabilidad y distribución acumulada de la variable aleatoria
 - d) Cuál es la probabilidad de que haya 4 visitas en una hora
 - e) Cuál es la probabilidad de que haya 4 o menos visitas en una hora
 - f) Cuál es la probabilidad de que haya más de 4 visitas en una hora
 - g) Cuál es la probabilidad de que no haya ninguna visita en una hora
 - h) Cuál es la probabilidad de que haya entre 4 y 6 visitas en una hora
 - i) Cuál es el valor de los cuantiles de la variable aleatoria
 - j) Generar aleatoriamente 100 valores para la variable y comprobar si el histograma se ajusta realmente a la función de densidad de Poisson.
 - k) Definir una nueva variable aleatoria para calcular la probabilidad de que en un día haya 100 visitas.
 - l) Generar aleatoriamente 100 valores para la nueva variable y comprobar si el histograma se ajusta realmente a la función de densidad de Poisson.