

1 SERIES DE POTENCIAS, DE TAYLOR Y DE LAURENT

1.1 Series de Potencias

Una serie de potencias en el plano complejo es de la forma siguiente:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n = c_0 + c_1(z-z_0) + c_2(z-z_0)^2 + \dots + c_n(z-z_0)^n + \dots \quad (1)$$

donde c_n son constantes reales y complejos llamados coeficientes " z_0 " es constante y se llama *centro de la serie*, " z " es la variable compleja.

Si $z_0 = 0$, la serie (1) se reduce a la forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots$, serie de potencias z .

OBSERVACIÓN.-

- Diremos que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ es absolutamente convergente, $\forall z \in C$ tal que $\|z-z_0\| < R$ y es divergente, $\forall z \in C$, tal que $\|z-z_0\| > R$
- Si $\exists R > 0$, tal que $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ converge absolutamente en $\|z-z_0\| < R$ y si $0 < \rho < R$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ converge uniformemente en $\|z-z_0\| < \rho$
- La serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ converge absolutamente $\forall z \in C$ (en particular en $z = z_0$) tal que $\|z-z_0\| < R$ y si $0 < \rho < R$, entonces la serie converge uniformemente, $\forall z \in C$ tal que $0 < \|z-z_0\| < \rho$
- Al número $R > 0$ se llama radio de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$
- Para $z \in C$, se tiene $\|z-z_0\| < R$, que se denomina región de convergencia.
- Para hallar el radio y región de convergencia de una serie de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$, se utiliza el criterio de la razón, que esta caracterizada por el siguiente teorema

1.2 TEOREMA (CRITERIO DE LA RAZÓN).-

Sea $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ una serie de potencia en C y sea $u_n = c_n(z-z_0)^n$, tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right\| = L$, entonces:

- i) Si $L < 1$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ converge absolutamente.
- ii) Si $L > 1$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ diverge.
- iii) Si $L = 1$, el criterio no decide.

OBSERVACIONES

- Sea $\sum_{n=0}^{\infty}$ una serie de potencia tal que: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|c_n\|} = L$, entonces:
 - i) Si $L = 0$, entonces $(R = \infty)$; la serie es convergente en todo el plano complejo C
 - ii) Si $L > 0$, entonces $R = \frac{1}{L}$
 - iii) Si $L = \infty$, entonces $(R = 0)$ converge solamente en el origen.
- Sea $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ una serie de potencia tal que: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right\| = L$, entonces:
 - i) Si $L = 0$, entonces $(R = \infty)$
 - ii) Si $L > 0$, entonces $R = \frac{1}{L}$
 - iii) Si $L = \infty$, entonces $R = 0$

1.3 FUNCIONES REPRESENTADAS MEDIANTE SERIES DE POTENCIAS.-

La serie de potencia $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, con radio de convergencia $R > 0$, define una función de z , es decir: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, donde $D_f = \{z \in C / \|z - z_0\| < R\}$ es decir que el dominio de $f(z)$ es la región de convergencia de la serie, por ejemplo consideramos la serie $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \dots + z^n + \dots$ convergente, $\forall z \in C$ tal que $\|z\| < R$

Donde $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{1} \right\| = 1$ es decir la serie $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ es convergente $\forall z \in C$ tal que $\|z\| < 1$

Luego la serie $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ define la función $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1 - z}$

OBSERVACIÓN.- Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, entonces se dice que $f(z)$ es representada mediante la serie de potencia o se dice que $f(z)$ está desarrollado mediante una serie de potencia.

1.4 DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN DE SERIES.-

Sea $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ una serie de potencia convergente $\forall z \in C$ tal que $\|z - z_0\| < R$

, $R > 0$ entonces: $f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}$, convergente $\forall z \in C$, tal que $\|z - z_0\| < R'$

donde $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right\|$, entonces se tiene:

$$R' = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{n c_n}{(n+1) c_{n+1}} \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right\| = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right\| = R$$

por lo tanto $R = R'$

$f''(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) c_n (z - z_0)^{n-2}$, converge $\forall z \in C$, tal que $\|z - z_0\| < R''$, de donde:

$$R'' = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{n(n-1) c_n}{n(n+1) c_{n+1}} \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)}{n(n+1)} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right\| = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right\| = R$$

por lo tanto $R = R''$

Las series obtenidas, derivando de la serie de potencia original tienen el mismo radio de convergencia que la serie original.

Sea $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ una serie de potencia convergente $\forall z \in C$ tal que $\|z - z_0\| < R$

$\int_{z_0}^z f(z) dz = \int_{z_0}^z \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_{z_0}^z (z-z_0)^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z-z_0)^{n+1}$, es convergente $\forall z \in C$ tal que $\|z - z_0\| < R$

1.5 SERIE DE TAYLOR Y DE MACLAURIN COMPLEJA.-

Sea $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ una serie de potencia convergente $\forall z \in C$ tal que $\|z - z_0\| < R$, calculando sus derivadas y evaluando en $z = z_0$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n \Rightarrow f(z_0) = c_0 \text{ de donde } c_0 = f(z_0)$$

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(z-z_0)^{n-1} \Rightarrow f'(z_0) = c_1 \text{ de donde } c_1 = f'(z_0)$$

$$f''(z) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n(z-z_0)^{n-2} \Rightarrow f''(z_0) = 1.2.c_2 \text{ de donde } c_2 = \frac{f''(z_0)}{2!}$$

$$f'''(z) = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2) c_n(z-z_0)^{n-3} \Rightarrow f'''(z_0) = 1.2.3.c_3 = 3!c_3 \text{ de donde } c_3 = \frac{f'''(z_0)}{3!}$$

.

.

.

$$f^{(m)}(z) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1)(n-2)...2.1.c_n(z-z_0)^{n-m} = \sum_{n=m}^{\infty} n!c_n(z-z_0)^{n-m} \text{ entonces } f^{(n)}(z_0) =$$

$$n!c_n \text{ de donde } c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

como $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$, desarrollando

$$f(z) = c_0 + c_1(z-z_0) + c_2(z-z_0)^2 + \dots + c_n(z-z_0)^n + \dots$$

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z-z_0) + \frac{f''(z_0)}{2!}(z-z_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n + \dots$$

\therefore

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)(z-z_0)^n}{n!} \quad (2)$$

es la serie de Taylor alrededor de $z = z_0$

cuando $z_0 = 0$, se tiene la serie

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)z^n}{n!} \quad (3)$$

que se denomina serie de MACLAURIN

1.6 TEOREMA.-