MDPI

Article

Análisis exploratorio de la calidad del aire en València

Jose Luis, Marcos[1]

[1] Máster en Ciencia de Datos Universitat de València; correo@ejemplo.com

Simple Summary: Proyecto de la asignatura Análisis Exploratorio de Datos (AED) sobre la calidad del aire en Valencia.

Abstract: Resumen

Keywords: calidad del aire; contaminantes; NO2; PM10; O3; análisis exploratorio

Índice del proyecto

1. Introducción **2**

2. Objetivo del proyecto **2**

3. Preparación y acondicionamiento de datos **2**
3.1. Fuente de datos, importación y conversión: 2
3.2. Selección de variables y filtrado 3
3.3. Valores perdidos NAs e imputación: 4

4. Matriz de correlación entre contaminantes y variables meteorológicas **5**

5. Distribución de los principales contaminantes entre las estaciones de medición **6**
5.1. Comparación entre contaminantes 7
5.2. Distribución del $\mathbf{NO_2}$ por estación 8
5.3. Distribución del $\mathbf{O_3}$ por estación 8

6. Análisis temporal **9**
6.1. Serie diaria y estado de alarma 9
6.2. Tendencia y estacionalidad anual 10
6.3. Ciclo horario: laborables frente a fines de semana 11

7. Discusión outliers **11**

Citation: Apellido, N. Análisis exploratorio de la calidad del aire en València. *Journal Not Specified* **2023**, *1*, 0. https://doi.org/

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the author. Submitted to *Journal Not Specified* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Introducción

Este proyecto aborda un problema real de análisis de datos ambientales dentro de la asignatura de *Análisis Exploratorio de Datos* (AED) del Máster en Ciencia de Datos de la UV. Para llevarlo a cabo, utilizamos el registro oficial ("*Datos horarios de calidad del aire desde 2016*") del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de València, procesado bajo el nombre de *calidad_aire.csv*.

Sabiendo que la atmósfera funciona como un sistema dinámico donde las emisiones de origen antrópico y las variables meteorológicas condicionan la concentración de contaminantes, emplearemos el análisis exploratorio como herramienta para transformar los datos brutos en información interpretable, para así evaluar la calidad del aire en la ciudad de València.

2. Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo un análisis exploratorio de datos de la calidad del aire en Valencia, focalizándonos en los contaminantes principales con mayor registro (NO_2, O_3) y en las variables meteorológicas (temperatura, presión, radiación y humedad). Para ello, realizaremos un proceso de depuración, transformación (Data Wrangling) y visualización de datos en R, de tal manera que logremos caracterizar el comportamiento estadístico del sistema atmosférico.

Para guiar el análisis exploratorio y dar validez física a los resultados, el proyecto busca responder las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cómo se distribuyen los niveles de los principales contaminantes (NO_2 y O_3) entre las estaciones de medición de la ciudad?
- ¿Cómo evolucionan los contaminantes a lo largo del tiempo?,¿se observa estacionalidad?

3. Preparación y acondicionamiento de datos

3.1. Fuente de datos, importación y conversión:

El análisis parte del registro oficial "*Datos horarios de calidad del aire desde 2016*", obtenido del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia. El formato elegido es CSV de tal manera que podamos representar los datos en una tabla, donde las columnas se separan punto y coma y las filas por saltos de línea. El archivo se procesa bajo el nombre de *calidad_aire.csv*.

Según la teoría tratada, datos recién importados se consideran *Raw Data* y contienen inconsistencias que impiden un análisis directo. Por ello, el proceso de acondicionamiento exige transformar el conjunto en un formato *Technically Correct Data*.

El primer paso es importarlos desde la carpeta *data* mediante una ruta relativa que evite dependencias absolutas del equipo:

```
#Importamos los datos usando una ruta relativa
datos <- read.csv("calidad_aire.csv", sep = ";", fileEncoding = "UTF-8")
```

Para estudiar la estructura inicial del conjunto de datos y verificar su volumen, ejecutamos las funciones de inspección básicas (*str()*, *head()*, *tail()* y *summary()*):

```
#Número total de filas y columnas
dim(datos)

#Inspeccionamos la estructura interna de las variables
str(datos)

#Visualizamos las primeras y últimas filas
head(datos)
```

```
tail(datos)

#Resumen estadístico
summary(datos)

#Nombre de las variables
colnames(datos)
```

En la exploración inicial del conjunto de 449.026 observaciones (filas) y 27 variables (columnas) observamos que:

- La columna Fecha" se ha importado como texto plano (*chr*) e incluye una letraT" intermedia (ej. 2020-01-01T00:00:00), lo que impide a R tratarla como una línea de tiempo real.
- Variables cualitativas como Día.de.la.semana",Hora" y "Estación" figuran como texto plano (*chr*), convertirlas a factores es indispensable para que R las trate como variables categóricas permitiendo así que los gráficos operen de manera eficiente posteriormente.
- En el *summary* observamos que las variables con mayor número de *NAs* son (C6H6" con 402.660,C7H8" con 402.240 y el C8H10" con 402.087). Muy cerca se sitúa elNH3" con 401.307 y el "Ruido" con 397.324.
- El *summary* también refleja una anomalía física puntual, la variable "Radiación" muestra un valor mínimo negativo imposible de -7.0, requiriendo una corrección.

Una vez detectadas estas deficiencias en el formato bruto, aplicamos las herramientas de las librerías lubridate y dplyr para corregir los dos primeros puntos anteriores, corregir el formato de la columna Fecha" y convertirDía.de.la.semana", Hora" yEstación" a factor:

```
#Convertimos la columna Fecha a formato POSIXct
datos$Fecha <- as.POSIXct(datos$Fecha, format = "%Y-%m-%dT%H:%M:%S", tz = "UTC")

#Convertimos variables cualitativas a factores para facilitar el filtrado y agrupa
datos <- datos %>%
  mutate(
    Estación = as.factor(Estación),
    Día.de.la.semana = as.factor(Día.de.la.semana),
    Hora = as.factor(Hora))


#Verificamos las transformaciones
str(datos[c("Fecha", "Día.de.la.semana", "Hora", "Estación")])
```

3.2. Selección de variables y filtrado

Continuamos corrigiendo las observaciones anteriores. Comparando las variables (C6H6",C7H8" y "C8H10") del penúltimo que disponen de mayor número de NAs ($>$ $400.000 NAs$) con las 449.026 observaciones en total, decidimos descartarlas ya que están prácticamente vacías y mantenerlas carece de rigor físico y entorpece el análisis exploratorio. Para reforzar visualmente la decisión tomada mapeamos el porcentaje de NAs, donde el predominio del color rojo confirma la inviabilidad de mantener dichas columnas:

```
# Visualizamos el porcentaje de NAs por estación y variable mediante un mapa de ca
datos %>%
  group_by(Estación) %>%                                    # nulos por estación
  summarise(across(everything(), ~ mean(is.na(.)) * 100)) %>%  # % de NAs por vari
```

```
  pivot_longer(-Estación, names_to = "Variable", values_to = "Porcentaje_Nulos") %
  ggplot(aes(Variable, Estación, fill = Porcentaje_Nulos)) +
  geom_tile(color = "grey40", linewidth = 0.3) +            # mapa de calor
  scale_fill_gradient(low = "lightgreen", high = "red", name="Porcenjate Nulos") +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.5))  # etiquet
```



Sin embargo, los contaminantes principales ("NO2", "O3" y "SO2") y las variables meteorológicas (Temperatura",Humedad.Relativa", Presión",Precipitación") cuentan con una completitud altísima, registrando apenas entre 13,000 y 16,000 NAs. Por ello, empleamos paquete *dplyr*, concretamente aplicamos *select()* para conservar exclusivamente estas variables de interés de tal manera que la dimensión resultante será 449026x16:

```
# Seleccionamos las variables de interés y filtramos
datos_filtrados <- datos %>%
  select(
    Fecha, Hora, Día.de.la.semana, Estación,
    NO, NO2, NOx, O3, SO2, PM2.5, PM10,
    Temperatura, Humedad.relativa, Presión, Radiación, Precipitación
  ) %>%
  filter(!is.na(Fecha)) #Descartando los na

# Verificamos las dimensiones resultantes del dataset depurado
dim(datos_filtrados)
```

3.3. Valores perdidos NAs e imputación:

Aunque hayamos seleccionado las variables de interés, el conjunto de datos aún presenta NAs en los contaminantes principales y meteorológicos, además de la anomalía física detectada en la radiación. Ambos deben resolverse antes de proceder con la visualización.

Por un lado, la "Radiación" no puede registrar valores negativos, para solucionar esta inconsistencia sin descartar toda la observación, empleamos la gramática de *dplyr*, concretamente *mutate* para reasignar dicho valor anómalo a NA:

```
#Convertimos en NA los valores negativos de Radiación
datos_filtrados <- datos_filtrados %>%
  mutate(Radiación = ifelse(Radiación < 0, NA, Radiación))
```

Por otro lado, es necesario cuantificar los NAs en las variables conservadas para decidir si aplicar una imputación o excluirlos con (na.rm = TRUE), evitando así sesgar los datos originales.

```
#Contabilizamos los NAs por columna
colSums(is.na(datos_filtrados))

dim(datos_filtrados)
```

El recuento revela que las columnas Fecha",Hora", Día.de.la.semana" yEstación" presentan completitud absoluta (0 NAs). Las variables meteorológicas muestran una alta completitud, destacando la Presión" (13.753 NAs), la "Precipitación" (14.525 NAs), laRadiación" (16.380 NAs) y la "Temperatura" (16.827 NAs).

Asimismo, los contaminantes que serán objeto central de nuestro estudio, NO_2 y O_3, acumulan un volumen ligeramente alto de ausencias, 96232 y 122897 respectivamente. Sin embargo, a la luz de lo observado en el gráfico de porcentajes de valores nulos por variable y estación, vemos que las estaciones Consellería Meteo y Nazaret Meteo presentan un 100% de valores ausentes para estos contaminantes, así como que Valencia Centro presenta un 100% de valores ausentes para el O_3. Por ello, decidimos eliminar estás estaciones del conjunto de datos.

```
estaciones_descartadas <- c("Valencia Centro", "Consellería Meteo",
                            "Nazaret Meteo")

# Eliminamos las observaciones correspondientes a las estaciones descartadas
datos_filtrados <- datos_filtrados %>%
  filter(!(Estación %in% estaciones_descartadas))

# Comprobamos cuantos NAs tenemos ahora
colSums(is.na(datos_filtrados[, c("NO2", "O3")]))
```

```
##   NO2    O3
## 24788 24583
```

```
# Vemos la dimensión del conjunto de datos
dim(datos_filtrados)
```

```
## [1] 350712     16
```

Para los valores ausentes restantes, descartamos la eliminación de filas, pues destruiría la continuidad de la serie temporal. También prescindimos de la imputación masiva mediante medias o medianas, ya que rellenar miles de huecos con un valor constante reduciría artificialmente la varianza y suavizaría los picos reales de contaminación.

Por tanto, se opta por preservar los NAs en el dataset y gestionarlos de forma local mediante el argumento *na.rm = TRUE*, operando así únicamente con los registros reales disponibles sin alterar la dinámica atmosférica.


Con un volumen final de 350.712 observaciones y 16 variables, el dataset queda estructurado en un formato sólido (*Technically Correct Data*) para iniciar la fase de Análisis Visual donde daremos respuesta a las preguntas de investigación planteadas.

4. Matriz de correlación entre contaminantes y variables meteorológicas

```
# Definimos una paleta de colores para la correlación
paleta <- col_numeric(palette = c("firebrick", "white", "steelblue"), domain = c(-

# Calculamos la correlación de Spearman entre los contaminantes y las variables me
datos_filtrados %>%
  group_by(dia = floor_date(Fecha, "day")) %>%
```

```
  summarise(across(where(is.numeric), ~ mean(.x, na.rm = TRUE))) %>%
  select(-dia) %>%
  pairs(gap = 0, xaxt = "n", yaxt = "n", cex.labels = 0.5,
        lower.panel = function(x, y, ...) points(x, y, pch = 16, cex = 0.5),
        upper.panel = function(x, y, ...) {
          correlacion <- cor(x, y, method = "spearman", use = "complete.obs")
          coords <- par("usr")
          rect(coords[1], coords[3], coords[2], coords[4], col = paleta(correlacio
          text(mean(coords[1:2]), mean(coords[3:4]), round(correlacion,2))
          })
```




5. Distribución de los principales contaminantes entre las estaciones de medición

Nos centramos ahora en dar respuesta a la primera pregunta formulada: ¿Cómo se distribuyen los niveles de NO_2 y O_3 entre las distintas estaciones de medición de la ciudad de Valencia? Para ello, visualizaremos como se distribuyen los distintos contaminantes por estación usando un boxplot para cada contaminante:

```
datos_filtrados %>%
  select(Estación, NO2, O3) %>%
  pivot_longer(cols=c(NO2, O3), names_to="Contaminante",
               values_to="Concentración") %>%
  ggplot(aes(x = Estación, y = Concentración)) +
    geom_boxplot(fill = "steelblue", alpha = 0.7,
```


```
                  outlier.alpha = 0.3, na.rm = TRUE) +
    facet_wrap(~Contaminante) +
    labs(title = "Distribución de contaminantes por estación",
         x = "Estación", y = expression("Concentración ("*mu*"g/m"^3*")")) +
    theme_minimal() +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 45,hjust = 1))
```



5.1. Comparación entre contaminantes

En primer lugar, vemos que, en cada estación, el NO_2 presenta concentraciones centrales inferiores al O_3. Además el rango intercuartílico del NO_2 es menor que el del O_3, luego sus valores centrales se encuentran más concentrados. Sin embargo, el NO_2 muestra un mayor número de valores atípicos y alcanza picos de concentración más altos, en general, que los del O_3. Resaltar también que el NO_2 presenta una marcada asimetría hacia la derecha, mientras que el O_3 presenta una menor asimetría. Todos estos detalles los podemos visualizar mejor comparando sus histogramas.

```
datos_filtrados %>%
  select(NO2, O3) %>%       # Elegimos los contaminantes
  pivot_longer(cols=c(NO2, O3), names_to="Contaminante",
               values_to="Concentración") %>%
  ggplot(aes(Concentración)) +
    geom_histogram(fill = "steelblue", alpha = 0.7, na.rm = TRUE) +
    facet_wrap(~Contaminante) +
    labs(title="Distribuciones de NO2 y O3", x="Concentraciones",
         y="Frecuencias") +
    theme_minimal()
```



5.2. Distribución del $\mathbf{NO_2}$ *por estación*

Aunque, en general, la forma de la distribución parece no variar mucho entre estaciones, podemos resaltar algunas diferencias significativas:

- `Pista de silla` presenta una de las concentraciones medianas más elevadas, así como la mayor dispersión de valores centrales.
- `Politécnico` presenta la concentración mediana más baja, así como los valores centrales menos dispersos.
- Las estaciones de `Avda Francia` y `Bulevard Sud` presentan los mayores picos de concentración

5.3. Distribución del $\mathbf{O_3}$ *por estación*

De nuevo, destacamos algunas diferencias significativas entre estaciones:

- `Puerto Moll Trans. Ponent` presenta la concentración mediana más elevada, mientras que `Puerto Valencia` presenta la concentración mediana más baja.
- Las cajas están, en general, centradas respecto a la mediana, por lo que parece que el O_3 presenta una distribución más equilibrada de sus valores centrales.

Por último, es interesante destacar que las estaciones que presentan mayores concentraciones de NO_2 no necesariamente presentan mayores concentraciones de O_3, y viceversa. Por ejemplo:

- `Politécnico` presenta una de las concentraciones medianas más bajas de NO_2, mientras que su concentración mediana de O_3 es de las más altas.
- `Pista silla` presenta una de las concentraciones medianas más altas de NO_2, mientras que su concentración mediana de O_3 es de las más bajas.

Corroboramos cuantitativamente este comportamiento con el cálculo de la correlación lineal de Pearson entre el NO_2 y el 0_3, verificando cómo arroja un coeficiente negativo de -0.6 que confirma la relación inversa existente entre ambos contaminantes.

6. Análisis temporal

Esta sección responde a la pregunta *¿cómo evolucionan los contaminantes a lo largo del tiempo y se observa estacionalidad?* Se estudian tres escalas: la serie diaria completa (con el efecto del estado de alarma de 2020), la estacionalidad mensual y el ciclo a lo largo del día. Se trabaja con los datos horarios originales (`datos`), calculando las medias con `na.rm = TRUE`, es decir, sin rellenar los valores perdidos.

```
# Variables de calendario con lubridate poniendo lunes como primer día de la seman
datos <- datos %>%
  mutate(
    año       = year(Fecha), # extraemos año, mes y día de la semana de la fecha
    mes        = month(Fecha, label = TRUE, abbr = TRUE),
    dow        = wday(Fecha, week_start = 1),
    fin_semana = dow >= 6, # definimos fin de semana como sábado y domingo
    hora_num   = hour(hms(Hora)) # extraemos unicamente el numero de la hora
  )
```

```
# # Definimos los periodos de estado de alarma para 2019, 2020 y 2021
en_alarma_2020 <- datos$Fecha >= as.Date("2020-03-14") & datos$Fecha <= as.Date("2
en_alarma_2021 <- datos$Fecha >= as.Date("2021-03-14") & datos$Fecha <= as.Date("2
en_alarma_2019 <- datos$Fecha >= as.Date("2019-03-14") & datos$Fecha <= as.Date("2

# Calculamos la media de NO2 para cada período
no2_2019   <- mean(datos$NO2[en_alarma_2019], na.rm = TRUE)
no2_2020   <- mean(datos$NO2[en_alarma_2020], na.rm = TRUE)
no2_2021   <- mean(datos$NO2[en_alarma_2021], na.rm = TRUE)

# Calculamos la variación porcentual de NO2 entre los años
var_alarma_2019 <- abs(round(100 * (no2_2020 - no2_2019) / no2_2019, 1))
var_alarma_2021 <- abs(round(100 * (no2_2021 - no2_2020) / no2_2020, 1))


cat("El No2 un año antes del inicio del estado de alarma fue un", var_alarma_2019,
```

```
## El No2 un año antes del inicio del estado de alarma fue un 44.1 % mas que duran
```

6.1. Serie diaria y estado de alarma

Las líneas discontinuas naranjas delimitan el estado de alarma por la COVID-19 en España (14 de marzo al 21 de junio de 2020). La curva roja es un ajuste suavizado (`geom_smooth`) de la media diaria de todas las estaciones.

```
# Graficamos la evolución diaria del NO2 con suavizado y líneas verticales para el
datos %>%
  group_by(Fecha) %>% # Agrupamos por fecha para calcular la media diaria
  summarise(no2_global = mean(NO2, na.rm = TRUE)) %>% # Calculamos la media diaria
  ggplot(aes(x = Fecha, y = no2_global)) +
  geom_line(alpha = 0.3) +
  geom_smooth(method = "loess", span = 0.15, colour = "firebrick", se = FALSE) +
  geom_vline(xintercept = as.Date(c("2020-03-14", "2020-06-21")),
             linetype = "dashed", colour = "orange") +
  labs(title = "Evolución diaria del NO2 (media de las estaciones)",
       x = NULL, y = "NO2 (µg/m³)")
```




Se puede observar que la concentración de NO2 disminuyó drásticamente durante el estado de alarma, lo que refleja la reducción de la actividad humana y del tráfico de vehículos. La línea roja suavizada muestra claramente esta tendencia, con un pico antes del confinamiento y una caída significativa durante el período señalado por las líneas discontinuas naranjas.

6.2. Tendencia y estacionalidad anual

```r
# Descomposición de la serie temporal de NO2 y O3 en tendencia y estacionalidad
descomp <- datos_filtrados %>%
  pivot_longer(c(NO2, O3), names_to = "contaminante", values_to = "valor") %>%  #
  group_by(contaminante, Fecha) %>%                                              #
  summarise(valor = mean(valor, na.rm = TRUE)) %>%                               #
  group_by(contaminante, semana = week(Fecha)) %>%                               #
  mutate(m = mean(valor, na.rm = TRUE)) %>%                                      #
  group_by(contaminante) %>%                                                     #
  mutate(Estacionalidad = m - mean(unique(m)), Tendencia = valor - Estacionalidad)
  pivot_longer(c(Tendencia, Estacionalidad), names_to = "componente", values_to =
  mutate(componente = factor(componente, c("Tendencia", "Estacionalidad")))      #

# Gráfico de tendencia y estacionalidad de NO2 y O3
ggplot(descomp, aes(Fecha, y, colour = contaminante)) +
  geom_smooth(data = filter(descomp, componente == "Tendencia"), method = "loess",
  geom_line(data = filter(descomp, componente == "Estacionalidad")) +            #
  facet_wrap(componente ~ contaminante, ncol = 2, scales = "free_y") +           #
  scale_colour_manual(values = c(NO2 = "firebrick", O3 = "steelblue")) +         #
  labs(title = "Tendencia y estacionalidad de NO2 y O3", x = NULL, y = "µg/m³") +
  theme_bw() + theme(legend.position = "none")                                   #
```




A partir de la descomposición STL se observan patrones opuestos. En la tendencia, el NO_2 desciende desde 2016, con una caída acusada en 2020 que se estabiliza después en valores mínimos, mientras que el O_3 muestra un ligero ascenso, coherente con la menor destrucción de ozono al haber menos NOx. En la estacionalidad, el NO_2 alcanza sus máximos en invierno por el mayor tráfico y la peor dispersión, y el O_3 en primavera y verano por la mayor radiación solar. El aspecto en dientes de sierra indica que el modelo, pese a ajustarse con frecuencia anual, captura también parte del ciclo diario de la serie horaria.

6.3. Ciclo horario: laborables frente a fines de semana

```
# Calcular el ciclo horario de NO2 y O3 para días laborables y fines de semana
ciclo_hora <- datos %>%
  group_by(hora_num, fin_semana) %>%  # Agrupamos por hora y tipo de día (laborabl
  summarise(NO2 = mean(NO2, na.rm = TRUE),  # Calculamos la media de NO2 y O3, ign
            O3  = mean(O3,  na.rm = TRUE)) %>%
  pivot_longer(c(NO2, O3), names_to = "contaminante", values_to = "media") # Pasam

# Graficar el ciclo horario de NO2 y O3
ggplot(ciclo_hora, aes(x = hora_num, y = media, colour = fin_semana)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  facet_wrap(~ contaminante, scales = "free_y") +
  scale_x_continuous(breaks = 0:23) +
  labs(title = "Ciclo horario medio de NO2 y O3",
       x = "Hora del día (h)", y = "Media (µg/m³)", colour = "Fin de semana") +
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "bottom",
        axis.text.x = element_text(size = 7))
```



El gráfico revela tres patrones clave. El NO2 depende directamente del tráfico, con dos picos en horas punta (7-9h y 19-21h) y niveles más bajos los fines de semana. El O3, al formarse con luz solar, alcanza su máximo a mediodía y cae de noche. Además, el O3 sube los fines de semana porque la menor emisión de NO2 permite que se acumule.

7. Discusión outliers

Comenzamos obteniendo los valores atípicos:

```
datos_alargados <- datos_filtrados %>%
  select(Fecha, Hora, Día.de.la.semana, Estación, NO2, O3) %>%
  pivot_longer(cols=c(NO2, O3), names_to="Contaminante", values_to="Concentración"

limites <- datos_alargados %>%
```

```
  group_by(Estación, Contaminante) %>%
  summarise(Q1 = quantile(Concentración, 0.25, na.rm=TRUE),
            Q3 = quantile(Concentración, 0.75, na.rm=TRUE),
            IQR = Q3 - Q1,
            .groups="drop") %>%
  mutate(Lim_inf = Q1 - 1.5 * IQR, Lim_sup = Q3 + 1.5 * IQR)

datos_atipicos <- datos_alargados %>%
  left_join(limites, by=c("Estación", "Contaminante")) %>%
  filter(!is.na(Concentración) & (Concentración < Lim_inf | Concentración > Lim_su
```

Cuántos valores atípicos se han detectado:


```
datos_atipicos %>% group_by(Contaminante, Estación) %>%
  summarise(atipicos = n(), .groups="drop_last")
```

```
## # A tibble: 15 x 3
## # Groups:   Contaminante [2]
##    Contaminante Estación                  atipicos
##    <chr>        <fct>                        <int>
##  1 NO2          Avda. Francia                 2630
##  2 NO2          Bulevard Sud                  1629
##  3 NO2          Molí del Sol                  1762
##  4 NO2          Pista Silla                    656
##  5 NO2          Politécnico                   3108
##  6 NO2          Puerto llit antic Túria         98
##  7 NO2          Puerto Moll Trans. Ponent      233
##  8 NO2          Puerto Valencia                662
##  9 NO2          Viveros                       2075
## 10 O3           Avda. Francia                   14
## 11 O3           Pista Silla                     32
## 12 O3           Politécnico                     31
## 13 O3           Puerto Moll Trans. Ponent       14
## 14 O3           Puerto Valencia                  3
## 15 O3           Viveros                          5
```

Representamos el número de observaciones atípicas según la hora

```
datos_atipicos$Hora <- factor(datos_atipicos$Hora,
                              levels = paste0(0:23, ":00:00"))

datos_atipicos %>% count(Contaminante, Hora) %>%
  ggplot(aes(x=Hora, y=n)) +
  geom_col(fill = "steelblue") +
  facet_wrap(~Contaminante, scales="free_y") +
  labs(title="Valores atípicos según la hora", x="Hora", y="Número de observacione
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.5))
```



Como ya vimos en la distirbución de los contaminantes por horas, los valores atípicos del NO_2 se concentran en las horas de mayor tráfico (7-9h y 19-22h), mientras que los valores atípicos de 0_3, al formarse con la luz solar, alcanza su máximo en las horas de mayor incisión de esta, y decrece en las horas en que se pone el sol.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.