

Aula 8

Multiplicadores de Lagrange

MA211 - Cálculo II

Marcos Eduardo Valle

Departamento de Matemática Aplicada
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Universidade Estadual de Campinas

Multiplicadores de Lagrange

Os multiplicadores de Lagrange são usados para resolver um problema de otimização com restrições formulados como:

$$\begin{array}{ll} \text{minimize/maximize} & f(\mathbf{x}) \\ \text{sujeito à} & g_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{array}$$

Método dos multiplicadores de Lagrange

Se $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ admite valor extremo quando sujeita as restrições $g_i(\mathbf{x}) = 0$, $i = 1, \dots, m < n$, então existem escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tais que

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla g_1 + \lambda_2 \nabla g_2 + \dots + \lambda_m \nabla g_m.$$

Na prática, para resolver

$$\begin{array}{ll} \text{minimize/maximize} & f(\mathbf{x}) \\ \text{sujeito à} & g_i(\mathbf{x}) = k_i, \quad i = 1, \dots, m. \end{array}$$

devemos:

a) Determinar, se possível, \mathbf{x} e $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tais que

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla f(\mathbf{x}) = \lambda_1 \nabla g_1(\mathbf{x}) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(\mathbf{x}), \\ g_1(\mathbf{x}) = 0, \\ \vdots \\ g_m(\mathbf{x}) = 0. \end{array} \right.$$

b) O pontos de máximo e o mínimo de f são encontrados entre as soluções do item a).

Exemplo 1

Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com $12m^2$ de papelão. Determine as dimensões x , y e z que fornecem o volume máximo de tal caixa.

Observação

Temos um problema de maximizar o volume da caixa

$$f(x, y, z) = xyz,$$

com a restrição da área

$$g(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz - 12 = 0.$$

Exemplo 1

Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com $12m^2$ de papelão. Determine as dimensões x , y e z que fornecem o volume máximo de tal caixa.

Observação

Temos um problema de maximizar o volume da caixa

$$f(x, y, z) = xyz,$$

com a restrição da área

$$g(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz - 12 = 0.$$

Resposta: O volume máximo da caixa é obtido quando $x = 2$, $y = 2$ e $z = 1$.

Método de Resolução – 1

- ▶ Isolar z da equação $g(x, y, z) = k$.
- ▶ Substituir a expressão de z em f para obter uma função de duas variáveis.
- ▶ Determinar os pontos para os quais $\nabla f(x, y) = (0, 0)$.
- ▶ Verificar que o ponto é um máximo/mínimo usando o teste da segunda derivada.

Método dos Multiplicadores de Lagrange

- ▶ Resolver o sistema de equações não-lineares:

$$\begin{cases} yz = \lambda(y + 2z) \\ xz = \lambda(x + 2z) \\ xy = \lambda(2x + 2y) \\ xy + 2xz + 2yz = 12 \end{cases}$$

- ▶ Determinar o valor extremo de f na solução do sistema de equações não-lineares.

Exemplo 2

Determine os valores extremos de

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2,$$

no disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Exemplo 2

Determine os valores extremos de

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2,$$

no disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Resposta: O valor máximo de f no disco é $f(0, 1) = f(0, -1) = 2$ e o valor mínimo é $f(0, 0) = 0$.

Exemplo 3

Determine o valor máximo da função $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ na curva da intersecção do plano $x - y + z = 1$ com o cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Exemplo 3

Determine o valor máximo da função $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ na curva da intersecção do plano $x - y + z = 1$ com o cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Resposta: O valor máximo é

$$f\left(\frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{5}{\sqrt{29}}, 1 + \frac{7}{\sqrt{29}}\right) = 3 + \sqrt{29}$$