

# ENCAPS / SERUMS 2026-II

## Salud Publica I-3 — Vigilancia Epidemiologica

20 preguntas · 4 alternativas · nivel examen

---

*Marque una sola alternativa por pregunta. Resuelva sin material de consulta.*

**1. En un EESS I-4 de Lamas (San Martín), tras el rumor de casos de tos ferina, el personal acude a la comunidad y recoge los datos en el escenario donde se presentó la enfermedad, incluyendo a las personas que NO acudieron al servicio. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?**

- A) Pasiva
- B) Centinela
- C) Activa
- D) Retrospectiva

**2. Ante la sospecha de un brote de hepatitis A en un distrito de Pasco, el epidemiólogo de la Red revisa intencionadamente historias clínicas y archivos de los EESS de la jurisdicción para identificar casos que no fueron notificados. ¿Qué tipo de vigilancia realiza?**

- A) Activa
- B) Pasiva
- C) Retrospectiva
- D) Centinela

**3. En un hospital II-2, el comité de infecciones reporta los casos de infecciones intrahospitalarias (IIH) del periodo. Según el Anexo 01 de la Directiva Sanitaria 046-MINSA/DGE-V.01, ¿qué modalidad y periodicidad de notificación les corresponde?**

- A) Individual e inmediata
- B) Individual y semanal
- C) Consolidada y mensual
- D) Consolidada y semanal

**4. El sistema que capta únicamente los casos que acuden espontáneamente al establecimiento y son notificados de rutina por el personal asistencial corresponde a una vigilancia epidemiológica de tipo .....**

- A) Activa
- B) Centinela
- C) Especializada
- D) Pasiva

**5. En el marco de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), un establecimiento debe reportar un EVISAP. ¿A qué corresponde esta sigla?**

- A) Evento Severo Supuestamente Atribuido a la Vacunación e Inmunización
- B) Evento de Importancia para la Salud Pública
- C) Evaluación de Vigilancia Sanitaria Preventiva
- D) Establecimiento de Vigilancia Sanitaria Activa

**6. En un colegio de Huamanguilla (Ayacucho) se sirve un refrigerio compartido. De los 100 alumnos que consumieron el alimento, 50 presentan diarrea y vómitos en las siguientes 12 horas. No hay casos entre quienes no consumieron. La DIRESA pide la medida de frecuencia propia de este brote cerrado con población expuesta definida. ¿Cuál es?**

- A) Tasa de incidencia, 50%
- B) Tasa de ataque, 50%
- C) Prevalencia, 50%
- D) Tasa de ataque, 100%

**7. En una comunidad amazónica se registra un brote de leptospirosis; de un total de 50 pacientes confirmados por laboratorio, 2 fallecen a causa de la enfermedad. La comunidad tiene 2000 habitantes. ¿Cuál es la medida epidemiológica que expresa la GRAVEDAD entre quienes enfermaron, y cuánto vale?**

- A) Mortalidad, 0.1%
- B) Letalidad, 4%
- C) Letalidad, 0.1%
- D) Tasa de ataque, 2.5%

**8. En la sala situacional de una Micro Red de Pasco se registran, en un mismo mes, 20 casos NUEVOS de tuberculosis y un total de 80 personas actualmente enfermas de tuberculosis, en una población de 10 000 habitantes. ¿Qué afirmación diferencia correctamente ambos indicadores?**

- A) La incidencia mide los 80 casos existentes y la prevalencia los 20 nuevos
- B) Ambas miden lo mismo: 80 casos
- C) La incidencia mide los 20 casos NUEVOS y la prevalencia los 80 EXISTENTES
- D) La incidencia es 80/10 000 y la prevalencia 20/10 000

**9. El número reproductivo básico (R0) se define como:**

- A) El número de casos nuevos por cada 1000 habitantes en un año
- B) La proporción de enfermos que fallecen por la enfermedad
- C) El promedio de casos secundarios que genera UN caso en una población totalmente susceptible
- D) El número de contactos censados por cada caso índice

**10. En un EESS I-3 de Huamanguilla, el médico serumista atiende a un niño de 3 años con fiebre alta, exantema maculopapular, tos, coriza y conjuntivitis, sin antecedente de vacunación. Sospecha sarampión. ¿Cuándo debe notificar el caso?**

- A) De manera inmediata (< 24 horas)
- B) Cuando se reporte el VEA de la semana
- C) Al alta del paciente
- D) Hasta las 48 horas

**11. En el mismo EESS se confirma por baciloscopía un caso de tuberculosis pulmonar en un adulto, sin criterios de brote. Según la periodicidad establecida, la notificación de este caso corresponde a:**

- A) Inmediata (< 24 horas)
- B) Semanal y de forma INDIVIDUAL
- C) Mensual y de forma consolidada
- D) No es evento de notificación obligatoria

**12. En la semana epidemiológica 30, un EESS I-2 de una comunidad ashaninka no registró ningún evento sujeto a vigilancia. El responsable no envía ningún reporte, asumiendo que 'sin casos no hay nada que notificar'. ¿Qué omitió?**

- A) La notificación consolidada mensual
- B) La notificación nominal
- C) La notificación NEGATIVA (reportar cero casos)
- D) Nada; sin casos no corresponde reportar

**13. La presencia habitual y esperada de una enfermedad, en un número relativamente constante, en una zona geográfica determinada, se denomina:**

- A) Epidemia
- B) Brote
- C) Pandemia
- D) Endemia

**14. En un caserío de Pasco, los pobladores reportan la muerte inusual de un gran número de roedores y animales domésticos en las últimas semanas, aún sin casos humanos registrados. ¿Cómo se denomina este acontecimiento epidemiológico?**

- A) Epidemia
- B) Brote
- C) Epizootia
- D) Endemia

**15. Un serumista de un EESS I-1 de Pasco recibe el aviso de 5 casos de pertussis en un caserío, cuando el promedio histórico para ese periodo es de 1 caso. Según la secuencia de estudio de brote del compendio, ¿cuál es el PRIMER paso formal antes que cualquier otro?**

- A) Aplicar de inmediato las medidas de control definitivas
- B) Confirmar la EXISTENCIA del brote comparando lo observado con lo esperado
- C) Formular la hipótesis sobre el mecanismo de transmisión
- D) Remitir el informe final a la DIRESA

**16. La secuencia correcta del proceso de vigilancia epidemiológica es:**

- A) Análisis → recolección → difusión → intervención
- B) Difusión → recolección → análisis → intervención
- C) Intervención → recolección → análisis → difusión
- D) Recolección → análisis e interpretación → difusión → intervención

**17. En un EESS I-3 de Loreto acude una gestante con fiebre, cefalea retroocular y mialgias; cuatro vecinos de su cuadra presentaron un cuadro similar en la última semana y la zona tiene transmisión activa de dengue. Aún no hay resultado de laboratorio. ¿Cómo se clasifica el caso HOY?**

- A) Sospechoso
- B) Confirmado
- C) Descartado
- D) Probable

**18. En un brote de fiebre tifoidea se identifica que el agua de un pozo contaminado con *Salmonella typhi* fue el medio por el cual el agente llegó a la población. Dentro de la cadena epidemiológica, el agua contaminada corresponde a:**

- A) El agente causal
- B) El reservorio
- C) El huésped susceptible
- D) La vía o mecanismo de transmisión

**19. La DIRESA requiere un ámbito donde se integren, analicen y presenten de forma continua los datos epidemiológicos, demográficos y de servicios, para orientar la toma de decisiones y la respuesta oportuna. ¿A qué corresponde?**

- A) Sala situacional
- B) Canal endémico
- C) Ficha de notificación individual
- D) Censo de contactos

**20. En un EESS I-3 de Huamanguilla se identifica un caso PROBABLE de sarampión en un niño no vacunado. El equipo debe actuar de inmediato. ¿Cuál conjunto de medidas es el CORRECTO?**

- A) Notificación inmediata + cerco epidemiológico con vacunación de contactos + búsqueda activa
- B) Notificación semanal + esperar la confirmación de laboratorio + aislamiento domiciliario
- C) Vacunación de contactos + cuarentena de toda la comunidad + notificación al alta
- D) Solo aislamiento del caso hasta obtener el resultado serológico