

Институт математики с вычислительным центром
УФИЦ РАН

На правах рукописи

Лебедев Михаил Евгеньевич

**Стационарные решения уравнения
Гросса–Питаевского с периодически
модулированной нелинейностью**

РЕЗЮМЕ ДИССЕРТАЦИИ

на соискание ученой степени кандидата наук
по прикладной математике

Научный руководитель

д. ф.-м. н., проф.

Алфимов Георгий Леонидович

Москва – 2021

Работа выполнена в *ИМВЦ УФИЦ РАН*.

Научный руководитель: **Алфимов Георгий Леонидович**
доктор физико-математических наук

Официальные оппоненты: **фамилия имя отчество**
ученая степень, ученое звание
фамилия имя отчество
ученая степень, ученое звание

Ведущая организация: Институт математики с вычислительным центром УФИЦ РАН

Защита состоится «_____» _____ 2021 г. в _____ часов на заседании диссертационного совета *шифр совета* при *название организации, при которой создан совет*, расположенном по адресу: *адрес*.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке *название организации*, а также по ссылке <http://www.xyz.com>.

Автореферат разослан «_____» _____ 2021 г.

Отзывы и замечания по автореферату в двух экземплярах, заверенные печатью, просьба высылать по вышеуказанному адресу на имя ученого секретаря диссертационного совета.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат физико-математических наук, доцент

Самбурский Л. М.

Общая характеристика работы

Введение. Начиная с 90-х годов прошлого века, нелинейное уравнение Шрёдингера (НУШ) с дополнительной пространственной неавтономностью продолжает оставаться объектом пристального изучения. Интерес к этому классу уравнений во многом обусловлен экспериментальными успехами в исследовании конденсата Бозе–Эйнштейна (БЭК). Явление конденсата вещества при сверхнизких температурах было предсказано в работах Бозе и Эйнштейна в 1924 году^[1]. Экспериментально такое состояние вещества получено впервые в 1995 году независимо двумя группами исследователей^[2]. В 2001 году это открытие было удостоено Нобелевской Премии.

Возможность получения БЭК стимулировала экспериментальные и теоретические исследования по всему миру, открывшие целый ряд потенциальных практических приложений. В частности, ожидается, что использование БЭК должно привести к появлению новых высокочастотных интерферометров^[3]. Также БЭК может быть использован для построения квантовых компьютеров^[4] и квантовых лазеров^[5].

Динамика БЭК в приближении среднего поля описывается уравнением шрёдингеровского типа с пространственной неавтономностью.

$$i\Psi_t + \Psi_{xx} - U(x)\Psi + P(x)|\Psi^2|\Psi = 0. \quad (1)$$

В контексте теории БЭК уравнение типа (1) носит название *уравнения Гросса – Питаяевского*. Здесь $\Psi(t, x)$ представляет безразмерную волновую функ-

^[1] A. Einstein, “Quantentheorie des einatomigen idealen Gases”, Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1924.

^[2] M. H. Anderson, J. R. Ensher, M. R. Matthews, C. E. Wieman, E. A. Cornell, “Observation of Bose–Einstein Condensation in a Dilute Atomic Vapor”, Science, (New Series), Vol. 269, P. 198–201, 1995.

^[3] C. Gross, T. Zibold, E. Nicklas, J. Esteve, and M. K. Oberthaler, “Nonlinear atom interferometer surpasses classical precision limit”, Nature, Vol. 464, P. 1165–1169, 2010.

^[4] D. Jaksch, P. Zoller, “The cold atom Hubbard toolbox”, Annals of Physics, Vol. 315, P. 52–79, 2005.

^[5] W. Guerin, J.-F. Riou, J. P. Gaebler, V. Josse, P. Bouyer, and A. Aspect, “Guided Quasicontinuous Atom Laser”, Phys. Rev. Lett., Vol. 97, P. 200402, 2006.

цию конденсата, функция $U(x)$ описывает потенциал ловушки, удерживающей конденсат, а $P(x)$ соответствует нелинейному потенциалу, называемому также *псевдопотенциалом*. Псевдопотенциал $P(x)$ описывает зависимость длины рассеяния частиц конденсата от пространственной координаты, которая может быть переменной величиной, что достигается различными техниками, например, использованием так называемого резонанса Фешбаха^[6]. Интервалы с положительным значением псевдопотенциала $P(x) > 0$ соответствуют случаю межатомного притяжения, в то время как интервалы с отрицательным значением, $P(x) < 0$, — межатомному отталкиванию частиц конденсата. Классическими модельными примерами потенциала $U(x)$ является гармонический потенциал $U(x) = Ax^2$ (магнитная ловушка) и периодический потенциал $U(x) = A \cos 2x$ (оптическая ловушка). В качестве модельных примеров псевдопотенциала $P(x)$ используются различные периодические функции (нелинейная решетка), как, например, косинусный потенциал $P(x) = A + B \cos \Omega x$ ^[7].

Для физических приложений важную роль играют решения уравнения (1) специального вида — так называемые *стационарные локализованные решения* (*стационарные локализованные моды*, СЛМ). Они получаются в результате подстановки в соответствующее уравнение (1) выражения

$$\Psi(t, x) = u(x)e^{-i\omega t}, \quad (2)$$

где функция $u(x)$ удовлетворяет условию локализации:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = 0, \quad (3)$$

а ω есть вещественный параметр, имеющий смысл химического потенциала конденсата. Профиль стационарного локализованного решения $u(x)$ есть действи-

^[6] C. Chin, R. Grimm, P. Julienne, and E. Tiesinga, “Feshbach resonances in ultracold gases”, Rev. Mod. Phys. Vol. 82, P. 1225, 2010.

^[7] H. Sakaguchi, B. A. Malomed, “Matter-wave solitons in nonlinear optical lattices”, Phys. Rev. E, Vol. 72, P. 046610, 2005.

тельнозначная функция^[8], которая удовлетворяет уравнению

$$u_{xx} + Q(x)u + P(x)u^3 = 0; \quad Q(x) = \omega - U(x). \quad (4)$$

Стоит отметить, что далеко не все локализованные решения уравнения (4) одинаково интересны с физической точки зрения. В частности, особо важным свойством является устойчивость локализованных решений. Если СЛМ неустойчива, малые возмущения такого решения приводят к его разрушению при эволюции, описываемой уравнением (1). Поэтому именно устойчивые локализованные решения особенно ценны для различных физических приложений, а сама проверка СЛМ на устойчивость является существенной частью их теоретического исследования.

Постановка проблемы. Итак, при изучении динамики, описываемой уравнением (1), естественным образом возникают следующие вопросы:

1. Возможно ли перечислить *полностью все* стационарные локализованные решения уравнения (1), одновременно существующих при заданных параметрах уравнения?
2. Какие из перечисленных решений являются устойчивыми?

Степень разработанности темы исследования. Стоит отметить, что в большинстве работ, посвящённых данной тематике вопрос о поиске / описании *всех* СЛМ не ставится, и вместо него рассматривается вопрос об отдельных классах СЛМ, соответствующих той или иной физической структуре, см. обзор^[9]. В то же время, несмотря на некоторую «амбициозность» вопроса (1), сочетание строгих аналитических утверждений с численным счётом позволяет добиться существенных результатов в этом направлении. Отметим некоторое количество важных результатов.

^[8] G. L. Alfimov, V. V. Konotop, and M. Salerno, “Matter solitons in Bose–Einstein condensates with optical lattices”, *Europhys. Lett.*, Vol. 58, P. 7–13, 2002

^[9] Y. V. Kartashov, B. A. Malomed, and L. Torner, “Solitons in nonlinear lattices”, *Rev. Mod. Phys.* Vol. 83, P. 247, 2011.

Для уравнения (4) с потенциалом $U(x)$, имеющего вид бесконечной потенциальной ямы, $U(x) = Ax^2$, для случая отталкивающих взаимодействий, $P(x) \equiv -1$, был предложен метод «доказательных вычислений», позволяющий гарантировать нахождение *всех* ограниченных решений^[10]. Разработанный метод впоследствии был обобщен на системы из нескольких связанных уравнений Гросса–Питаевского, в которых соответствующие псевдопотенциалу коэффициенты также не зависят от пространственной координаты^[11].

Для периодического потенциала $U(x)$, как, например, $U(x) = A \cos 2x$, в случае исключительно отталкивающих взаимодействий частиц конденсата $P(x) \equiv -1$ предложены достаточные условия, опять же допускающие исчерпывающее описание *всех* ограниченных решений уравнения (4). При этом показано, что выполнения этих условий позволяет установить взаимно-однозначное соответствие между ограниченными решениями и всевозможными бесконечными в обе стороны последовательностями символов из некоторого конечного алфавита^[12]. Последовательности такого рода названы *кодами решений*, а сам процесс присвоения кодов – *кодированием решений*. Проверка достаточных условий проводилась авторами работы с помощью численного счёта. Результаты предыдущей работы получили свое продолжение^[13], а именно: был разработан алгоритм, позволяющий по коду решения численно построить его профиль.

Актуальность темы исследования. Актуальной задачей является обобщение результатов приведенных выше работ на случай переменного псевдопотенциала $P(x) \neq \text{const}$. В частности, перспективным направлением исследо-

^[10] G. L. Alfimov, D. A. Zezyulin, “Nonlinear modes for the Gross–Pitaevskii equation — a demonstrative computational approach”, Nonlinearity, Vol. 20, P. 2075–2092, 2007.

^[11] G. L. Alfimov, I. V. Barashenkov, A. P. Fedotov, V. V. Smirnov, D. A. Zezyulin, “Global search for localised modes in scalar and vector nonlinear Schrödinger-type equations”, Physica D, Vol. 397, P. 39–53, 2019.

^[12] G. L. Alfimov, A. I. Avramenko, “Coding of nonlinear states for the Gross–Pitaevskii equation with periodic potential”, Physica D, Vol. 254, P. 29–45, 2013.

^[13] G. L. Alfimov, P. P. Kizin, D. A. Zezyulin, “Gap solitons for the repulsive Gross–Pitaevskii equation with periodic potential: Coding and method for computation”, Discrete and Continuous Dynamical Systems — Series B, Vol. 22, P. 1207–1229, 2017.

вания является обобщение аппарата кодирования решений на случай периодических потенциала и псевдопотенциала. Детальная классификация решений уравнения (1) открывает возможность обнаружения новых, ранее неизвестных устойчивых СЛМ.

Цели и задачи диссертационной работы. Основным объектом исследования данной диссертационной работы являются стационарные решения одномерного уравнения Гросса–Питаевского (1) с *периодическим псевдопотенциалом*. Цели и задачи работы можно сформулировать следующим образом:

1. Обобщить подход, связанный с кодированием решений^[12], на случай периодического потенциала $U(x)$ и периодического псевдопотенциала $P(x)$. Сформулировать достаточные условия, дающие возможность применить такой подход, а также указать способ проверки этих условий (аналитически или с помощью численного счета).
2. Исследовать множество стационарных решений уравнения (1) с периодическим псевдопотенциалом в случае принципиально нелинейных взаимодействий, когда линейным потенциалом можно пренебречь, $U(x) \equiv 0$.
3. Для случая бесконечной потенциальной ямы, $U(x) = Ax^2$, исследовать влияние периодического псевдопотенциала на структуру множества стационарных локализованных решений и их устойчивость.

Методология и методы исследования. Для исследования возможных типов СЛМ в работе используется так называемый «метод исключения сингулярных решений»^[12]. Решение уравнения (4) называется *сингулярным*, если оно уходит на бесконечность в конечной точке числовой прямой:

$$\exists x_0, \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = \infty. \quad (5)$$

При выполнении определенных условий «большая часть» решений уравнения (4) представляет собой сингулярные решения. Множество оставшихся решений,

называемых *регулярными*, оказывается достаточно «бедным» и может быть полностью описано в терминах символической динамики.

Решение дифференциального уравнения (4) производится с помощью метода Рунге–Кутты четвертого порядка точности. Для построения локализованных решений уравнения (4) в работе используется метод стрельбы. Устойчивость построенных решений проверяется с помощью метода коллокаций Фурье^[14], а также посредством эволюционного моделирования динамики уравнения (1) с помощью консервативной конечно-разностной схемы^[15]. Все алгоритмы и численные методы реализованы в среде MATLAB с использованием расширения MEX для поддержки высокопроизводительных вычислений.

Научная новизна. В диссертационной работе доказан ряд общих утверждений, указывающих, когда уравнение (4) допускает существование сингулярных решений, а также, когда все его решения регулярны. В частности, показано, что если псевдопотенциал принимает отрицательное значение хотя бы в одной точке x_0 , $P(x_0) < 0$, то существуют два однопараметрических семейства решений, уходящих на бесконечность в этой точке, а также получены асимптотические формулы для этих семейств.

Метод исключения сингулярных решений получает дальнейшее развитие. В работе предложены достаточные условия существования взаимно-однозначного соответствия между регулярными решениями уравнения (4) и бесконечными последовательностями символов над некоторым алфавитом. В отличие от ранее полученных результатов^[12], предложенные достаточные условия могут быть эффективно проверены с помощью численного счета. В диссертации приводится алгоритм их численной проверки, а также его теоретическое обоснование.

Для случая $U(x) \equiv 0$ и модельного периодического псевдопотенциала вида $P(x) = A + B \cos 2x$ было исследовано множество стационарных локализован-

^[14] J. Yang, “Nonlinear Waves in Integrable and Nonintegrable Systems”, Philadelphia: SIAM, 2010.

^[15] V. Trofimov, N. Peskov Comparison of finite-difference schemes for the Gross-Pi taevskii equation // Mathematical Modelling and Analysis. — 2009. — Mar. — Vol. 14. — P. 109–126.

ных решений. Использование выше упомянутых техник позволило эффективно описать множество СЛМ и в конечном счёте обнаружить новое устойчивое решение, которое ранее не обсуждалось в литературе при рассмотрении задач, связанных с уравнением (1). Найденное новое устойчивое решение получило название *дипольный солитон* [1].

Наконец, в данной работе изучен вопрос о влиянии периодического псевдопотенциала вида $P(x) = A + B \cos \Omega x$ на множество СЛМ в случае бесконечной потенциальной ямы, $U(x) = Ax^2$. Показано, что по сравнению с хорошо изученным случаем $P(x) = \text{const}$, множество стационарных локализованных решений оказывается значительно богаче, а именно, появляются существенно нелинейные решения, несуществующие в малоамплитудном пределе. Исследована зависимость устойчивости СЛМ от частоты псевдопотенциала Ω . Для псевдопотенциала с нулевой средней, $P(x) = B \cos \Omega x$, показано, что увеличение частоты Ω позволяет стабилизировать малоамплитудные решения, чьи аналоги в модели с $P(x) = \text{const}$ оказываются неустойчивыми.

Положения, выносимые на защиту:

1. Сформулированы и доказаны общие утверждения о наличии и отсутствии сингулярных решений уравнения (4). Показано, что в случае $P(x) > 0$ все решения уравнения (4) регулярны. Если $P(x)$ принимает отрицательное значение хотя бы в одной точке x_0 , $P(x_0) < 0$, то существуют два однопараметрических семейства решений, уходящих на бесконечность в точке $x = x_0$; построена асимптотика этих решений. В том случае, когда $Q(x) < 0$ и $P(x) < 0$, показано, что все решения уравнения (4) сингулярны.
2. Сформулированы достаточные условия возможности кодирования регулярных решений уравнения (4) и предложен эффективный алгоритм численной проверки этих условий.
3. Для случая $U(x) \equiv 0$, $P(x) = A + \cos 2x$ исследовано множество СЛМ

уравнения (1) и обнаружено новое устойчивое локализованное решение — *дипольный солитон*.

4. В случае бесконечной потенциально ямы показано, что присутствие периодического псевдопотенциала приводит к появлению новых классов СЛМ, не имеющих аналогов в моделях с $P(x) = \text{const}$. Для псевдопотенциала с нулевой средней установлено, что частота псевдопотенциала существенным образом влияет на устойчивость СЛМ. Установлено, что увеличение частоты приводит к стабилизации малоамплитудных стационарных локализованных решений.

Степень достоверности и апробация результатов. Модель Гросса – Питаевского является классической задачей из физики сверхнизких температур и её достоверность не вызывает сомнений. В данной диссертационной работе численно строятся локализованные стационарные решения указанной модели, а также численно исследуется устойчивость таких решений. Построение решений производится при помощи стандартных численных методов с контролируемой точностью. Исследование устойчивости построенных решений производится методом коллокаций Фурье, который хорошо зарекомендовал себя для решения подобных задач. Результаты исследования устойчивости проверяются численным решением эволюционной задачи при помощи конечно-разностной схемы. Основные результаты диссертационной работы докладывались на различных научных семинарах и конференциях, в числе которых:

1. «Гамильтонова динамика, неавтономные системы и структуры в уравнениях с частными производными», Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород, декабрь, 2014 г.
2. «Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании», БашГУ, Уфа, сентябрь, 2015 г.

3. «Динамика, бифуркации и странные аттракторы», Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород, июль, 2016 г.
4. «Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения», Башкортостан, оз. Банное, март, 2018 г.
5. “Nonlinear Phenomena in Bose Condensates and Optical Systems”, Ташкент, Узбекистан, август, 2018 г.
6. «Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения», Башкортостан, оз. Банное, март, 2019 г.
7. «Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения», Башкортостан, оз. Банное, март, 2021 г.

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 10 печатных работах, из них 3 статьи в рецензируемых журналах [1–3] и 7 тезисов докладов на различных конференциях [4–10]. Также за время работы над диссертацией автором было опубликовано 2 статьи^{[16],[17]} и 1 тезис доклада^[18] по смежным тематикам.

Личный вклад автора. Содержание диссертации и основные положения, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные работы. Подготовка к публикации полученных результатов проводилась совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим. Все представленные в диссертации результаты получены лично автором с использованием разработанных методов и компьютерных программ.

^[16] M. E. Lebedev, D. A. Dolinina, K. B. Hong, *et al.*, “Exciton-polariton Josephson junctions at finite temperatures”, Scientific Reports Vol. 7, P. 9515, 2017

^[17] D. A. Zezyulin, M. E. Lebedev, G. L. Alfimov, and B. A. Malomed, “Symmetry breaking in competing single-well linear-nonlinear potentials”, Phys. Rev. E, Vol. 98, P. 042209, 2018.

^[18] D. A. Zezyulin, M. E. Lebedev, G. L. Alfimov, and B. A. Malomed, “Symmetry breaking in competing single-well linear-nonlinear potentials”, Тезисы доклада на конференции «Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения», Башкортостан, оз. Банное, март, 2019.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, трёх приложений и библиографии. Общий объем диссертации ? страниц, из них ? страниц текста, включая ? рисунков, четыре таблицы и одну схему алгоритма. Библиография включает ? наименования на ? страницах.

Содержание работы

Во введении (Introduction) обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые на защиту научные положения.

Вводятся основные понятия, относящиеся к объекту исследования. *Стационарные локализованные решения* (или *стационарные локализованные моды*, СЛМ) определяются как решения уравнения (1), имеющие вид (2) и удовлетворяющие условию локализации (3). Решение $u(x)$ уравнения (4) называется *сингулярным*, если для некоторой конечной точки x_0 выполняется $u(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow x_0$. Точка x_0 называется точкой коллапса решений, а про само решение говорится, что оно *коллапсирует* в точке x_0 . Решение называется *регулярным*, если оно не коллапсирует ни в какой точке.

В первой главе (Chapter I) сформулированы и доказаны основные утверждения о сингулярных и регулярных решениях уравнения (4).

Утверждение 1. Пусть для всех $x \in \mathbb{R}$, в уравнении (4) функции $Q(x)$, $P(x) \in C^1(\mathbb{R})$, причём

$$(a) \quad P(x) \geq P_0 > 0, \quad |P'(x)| \leq \tilde{P};$$

$$(b) \quad Q(x) \geq Q_0, \quad |Q'(x)| \leq \tilde{Q}.$$

Тогда решение задачи Коши для уравнения (4) с произвольными начальными условиями может быть продолжено на всю действительную ось \mathbb{R} .

Утверждение 1 устанавливает условия отсутствия сингулярных решений. Одним из таких условий является положительная определенность функции $P(x)$. Если же функция $P(x)$ принимает отрицательное значение хотя бы в одной точке x_0 , $P(x_0) < 0$, это порождает два семейства решений уравнения (4), коллапсирующих в этой точке. Для формулировки следующего утверждения удобно положить $P(x_0) = -1$ (этого всегда можно добиться путём перенормировки независимой переменной).

Утверждение 2. Пусть Ω — некоторая окрестность точки x_0 , а $Q(x) \in C^2(\Omega)$ и $P(x) \in C^4(\Omega)$. Тогда существуют два C^1 -гладких однопараметрических семейства решений уравнения (4), коллапсирующих в точке $x = x_0$ (при подходе слева, $x < x_0$) и связанных между собой симметрией $u \rightarrow -u$. Каждое из этих семейств может быть запараметризовано свободной переменной $C \in \mathbb{R}$, причем коллапсирующих семейств справедливы следующие асимптотические разложения:

$$\pm u(x) = \frac{\sqrt{2}}{\eta} + A_0 + A_1\eta + A_2\eta^2 + A_3\eta^3 \ln |\eta| + C\eta^3 + A_4\eta^4 \ln |\eta| + \dots \quad (6)$$

Здесь $\eta = x - x_0$, а коэффициенты A_n выражаются через коэффициенты Q_n , P_n разложения функций $Q(x)$, $P(x)$

$$Q(x) = Q_0 + Q_1\eta + Q_2\eta^2 + \dots, \quad P(x) = -1 + P_1\eta + P_2\eta^2 + \dots \quad (7)$$

Аналогичные однопараметрические семейства коллапсирующих решений существуют также и справа от точки $x = x_0$. Наконец, в первой главе устанавливаются условия, при которых уравнение (4) вообще не имеет регулярных решений, за исключением нулевого решения $u(x) \equiv 0$.

Утверждение 3. Пусть при $x \in \mathbb{R}$ выполняются условия $P(x) \leq P_0 < 0$, $Q(x) \leq Q_0 < 0$. Тогда все решения уравнения (4) сингулярны, за исключением нулевого решения.

Одним из следствий полученных результатов является то, что в том случае, когда псевдопотенциал $P(x)$ является периодической знакопеременной функцией, сингулярность является характерным свойством большого количества решений уравнения (4), что, в свою очередь, делает возможным применение метода исключения сингулярных решений^[12]. Результаты первой главы опубликованы в работах [2], [4] и [5].

Во второй главе (Chapter II) представлен аппарат кодирования стационарных состояний уравнения (1) с L -периодическими функциями потенциала, $U(x + L) = U(x)$, и псевдопотенциала, $P(x + L) = P(x)$. Оказывается, что множество регулярных решений уравнения (4) при определенных условиях можно полностью описать исходя из структуры так называемых *кодировочных множеств*: \mathcal{U}_L^+ , \mathcal{U}_L^- , \mathcal{U}_L . Эти множества определяются на плоскости (u, u') начальных условий уравнения (4) следующим образом. Множество \mathcal{U}_L^+ содержит в себе начальные условия для решений, ограниченных на промежутке $[0; L]$, а множество \mathcal{U}_L^- — начальные условия для решений, ограниченных на промежутке $[-L; 0]$. Множество \mathcal{U}_L есть пересечение двух предыдущих множеств, $\mathcal{U}_L = \mathcal{U}_L^+ \cap \mathcal{U}_L^-$. Связь между точками этих множеств удобно описать с помощью *отображения Пуанкаре* \mathcal{P} , которое определено следующим образом: пусть $\mathbf{p} \in \mathcal{U}_L^+$, тогда $\mathcal{P}(\mathbf{p}) = \mathbf{q} = (u(L), u'(L))$, $\mathbf{q} \in \mathcal{U}_L^-$, где $u(x)$ — решение задачи Коши для уравнения (4) с начальными условиями $u(0) = u_0$, $u'(0) = u'_0$. Последовательность точек $\{\mathbf{p}_n\}$, связанных отображением Пуанкаре, $\mathcal{P}(\mathbf{p}_n) = \mathbf{p}_{n+1}$, называется *орбитой*.

Ключевым моментом на пути к описанию множества регулярных решения является выполнение *двух гипотез* относительно действия отображения \mathcal{P} на множестве \mathcal{U}_L .

- (I) Множество \mathcal{U}_L представляет из себя набор компонент связности $\mathcal{U}_L = \bigcup_{k \in S} D_k$, где каждая компонента D_k есть криволинейный четырехугольник с монотонными границами.

(II) Отображения \mathcal{P} , \mathcal{P}^{-1} некоторым образом сохраняют свойства монотонности полос, названных в работе *h- и v-полосами*, соединяющих противоположные стороны D_k , причем ширина этих полос убывает под действием соответствующих отображений.

В данной главе показано, что при выполнении гипотез I и II отображение \mathcal{P} действует на множестве \mathcal{U}_L по схеме подковы Смейла^[19], и существует взаимно-однозначное соответствие между *орбитами* регулярных решений уравнения (4) и *множеством бесконечных последовательностей*, в которых каждый символ соответствует компоненте связности множества \mathcal{U}_L .

Проверка гипотез осуществляется численно. При этом гипотеза I может легко проверена *методом сканирования плоскости начальных условий*. Проверка же гипотезы II не столь проста и требует более обстоятельного подхода. В данной главе сформулированы две теоремы, так называемые *теоремы об отображении h- и v-полос*, которые позволяют свести проверку гипотезы II к эффективной численной процедуре. Сам алгоритм проверки выглядит следующим образом.

^[19] S. Wiggins, “Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos”, New York: Springer-Verlag, 2003.

Алгоритм 1. Проверка гипотезы II

Дано: Гипотеза I верна для уравнения (4); $\mathcal{U}_L = \bigcup_{k \in S} D_k$.

Шаг (1). Задать расчётную сетку. Для всех $i, j \in S$ численно построить множества $H_{ij} = \mathcal{P}(D_i) \cap D_j$, и $V_{ij} = \mathcal{P}^{-1}(D_j) \cap D_i$ на заданной расчётной сетке.

Шаг (2). Проверка знаков элементов в матрицах Якоби $D\mathcal{P}_{\mathbf{p}}$, $D\mathcal{P}_{\mathbf{q}}^{-1}$ для отображений \mathcal{P} , \mathcal{P}^{-1} .

(а) Для $\mathbf{p} \in V_{ij}$ вычислить матрицу 2×2 оператора $D\mathcal{P}_{\mathbf{p}} = (a_{mn})$ и проверить, что знаки её элементов $\forall \mathbf{p} \in V_{ij}$ соответствуют в точности одной из конфигураций, указанных в теореме об отображении h-полос.

(б) Для $\mathbf{q} \in H_{ij}$ вычислить матрицу 2×2 оператора $D\mathcal{P}_{\mathbf{q}}^{-1} = (b_{mn})$ и проверить, что знаки её элементов $\forall \mathbf{q} \in H_{ij}$ соответствуют в точности одной из конфигураций, указанных в теореме об отображении v-полос.

Шаг (3). Оценка сжатия h- и v-полос.

(а) Используя расчётную сетку, оценить значение $\mu_* = \min_{\mathbf{p} \in V_{ij}} a_{11}(\mathbf{p})$; проверить, что $\mu_* > 1$.

(б) Используя расчётную сетку, оценить значение $\nu_* = \min_{\mathbf{q} \in H_{ij}} b_{22}(\mathbf{q})$; проверить, что $\nu_* > 1$.

Работа алгоритма (см. рисунок 1) проиллюстрирована на примере уравнения (4) с $Q(x) \equiv -1$ и $P(x) = \eta(x)$, где $\eta(x)$ — кусочно-постоянная периодическая функция с периодом $L = L_* + L_0$, определенная следующим образом:

$$\eta(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0; L_*); \\ +1, & x \in [L_*; L_* + L_0). \end{cases} \quad (8)$$

Оказывается (доказано строгое утверждение), что множество \mathcal{U}_L на плоскости начальных условий для такого уравнения неограниченно. Тем не менее можно ограничиться рассмотрением некоторого ограниченного подмножества $\mathcal{D} \subset \mathcal{U}_L$. Если гипотезы I и II верны для \mathcal{D} , тогда можно описать подмножество регуляр-

ных решений, чьи орбиты не выходят за пределы рассмотренного подмножества \mathcal{D} на плоскости начальных условий. На рисунке 1 показан пример множества \mathcal{D} , состоящего из трёх компонент связности. Гипотезы I и II верны для \mathcal{D} , а значит существует подмножество регулярных решений, которое может быть закодировано тремя символами $\{-1, 0, +1\}$. Результаты второй главы опубликованы в работах [9] и [10].




Рис. 1: Проверка гипотез для уравнения (4) для случая $Q(x) \equiv -1$, $P(x) = \eta(x)$ с параметрами $(L_*, L_0) = (2, 1)$. Множество \mathcal{U}_L^+ (светло-серый), \mathcal{U}_L^- (тёмно-серый), их пересечение $\mathcal{D} = \{D_{-1}, D_0, D_{+1}\} \subset \mathcal{U}_L$ (чёрный); для множеств V_{ij} (синий) и H_{ij} (жёлтый) указаны знаки элементов соответствующих операторов.

В третьей главе (Chapter III) исследуется множество стационарных решения уравнения (1), в котором потенциал ловушки отсутствует, $U(x) \equiv 0$, а псевдопотенциал имеет вид косинуса, $P(x) = A + \cos 2x$. Такая задача ранее рассматривалась в литературе^[7], где было установлено, что в задаче существует стационарное локализованное решение колоколообразной формы, называемое *фундаментальный солитон*, которое является устойчивым при определенных

параметрах уравнения.

В данной главе к такому уравнения применяется подход, основанный на методике кодирования решений. Структура кодировочных множеств приведена на рисунке 2. Оказывается, что множества \mathcal{U}_L^\pm представляют из себя бесконечные спирали, которые образуют неограниченное пересечение \mathcal{U}_L , состоящее из бесконечного количества компонент связности.




Рис. 2: Множество $\mathcal{D} \subset \mathcal{U}_\pi$, состоящее из семи компонент связности $\{D_{-2}, D_{-1i}, D_{-1}, D_0, D_{+1}, D_{+1i}, D_{+2}\}$ (чёрный), сформированное пересечением множеств \mathcal{U}_π^\pm для уравнения (4); $Q(x) = -1.5$, $P(x) = \cos 2x$.

В данной главе осуществляется проверка гипотез I и II для подмножества $\mathcal{D} \subset \mathcal{U}_L$, состоящего из семи центральных компонент связности. Численная процедура проверки гипотез позволила заключить, что обе гипотезы верны. Следовательно, существует взаимно-однозначное соответствие между решениями уравнения (4) и кодами, построенными исходя из структуры кодировочного множества. Наличие такого соответствия показывает, что множество стационарных локализованных решения рассматриваемого уравнения чрезвычайно богато. На рисунке 3 представлены различные решения и соответствующие им символьные коды.

Анализ устойчивости методом коллокаций Фурье показал, что большин-

ство решений являются неустойчивыми, однако в задаче существует некоторое количество устойчивых решений, часть из которых ранее не была обнаружена. Одним из таких новых устойчивых решений является так называемый *дипольный солитон*, профиль которого изображен на рисунке 3 (е). Результаты третьей главы опубликованы в работах [1], [6] и [8].




Рис. 3: Различные решения уравнения (4) для $Q(x) = -1.5$, $P(x) = \cos 2x$. Каждому решению соответствует символьный код, который однозначно идентифицирует решение. Периодические решения: (а) π -периодическое решение $\{\dots, +1, +1, +1, \dots\}$; (б) 2π -периодическое решение $\{\dots, +1, -1, +1, -1, \dots\}$; (с) 2π -периодическое решение $\{\dots, +1, 0, +1, 0, \dots\}$. Локализованные решения: (d) фундаментальный солитон $\{\dots, 0, +1, 0, \dots\}$; (е) дипольный солитон $\{\dots, 0, -1i, 0, \dots\}$ (f) элементарный солитон с кодом $\{\dots, 0, +2, 0, \dots\}$ (g) $\{\dots, 0, +1, 0, +1, 0, \dots\}$ (h) $\{\dots, 0, +1, 0, -1, 0, \dots\}$ (i) $\{\dots, 0, +1, -1i, +1i, +1, \dots\}$.

В четвертой главе (Chapter IV) исследуются СЛМ уравнения (1), в котором наряду с периодическим потенциалом также присутствует удерживающий потенциал, имеющий вид бесконечной потенциальной ямы. После перенормировки функции потенциала и псевдопотенциала принимают вид $U(x) = x^2$, $P(x) = A + B \cos \Omega x$ соответственно.

Особое место в анализе такого уравнения занимают *стационарные решения с линейным аналогом*. Такие решения возникают из рассмотрения случая малых амплитуд $|u(x)| \ll 1$. В этом случае в уравнении (4) можно отбросить нелинейное слагаемое, так что уравнение принимает вид обыкновенного гармонического осциллятора

$$u_{xx} + (\omega - x^2)u = 0. \quad (9)$$

Его решением является следующий набор собственных значений и собственных функций:

$$\tilde{\omega}_n = 2n + 1; \quad \tilde{u}_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(x) e^{-\frac{1}{2}x^2}; \quad n = 0, 1, \dots, \quad (10)$$

где функции $H_n(x)$ представляют собой многочлены Эрмита. Под действием нелинейности каждое собственное значение $\tilde{\omega}_n$ бифурцирует и порождает однопараметрическое семейство $\Gamma_n = (\omega_n, u_n(x))$ — семейство решений с линейным аналогом.

Известно^[10], что решения с линейным аналогом полностью исчерпывают все множество СЛМ для случая $P(x) \equiv \text{const}$ ^[10]. Однако в случае периодического псевдопотенциала также существуют решения, не имеющие линейного аналога. В данной главе ветви таких решений строятся численно, см. рисунок 4. Анализ устойчивости показал, что почти все они оказываются неустойчивыми.

Вторая часть четвёртой главы посвящена анализу устойчивости малоамплитудных решений. Аналитически показано, что в случае псевдопотенциала с нулевой средней, $P(x) = B \cos \Omega x$, увеличение частоты приводит к стабилизации малоамплитудных решений с линейным аналогом. То есть для каждой

ветви Γ_n существует пороговое значение частоты Ω_n , что для $\Omega > \Omega_n$ соответствующая ветвь решений устойчива в окрестности точки бифуркации $N \ll 1$, $\omega_n \approx \tilde{\omega}_n$. Результаты четвертой главы опубликованы в работах [3] и [7].




Рис. 4: Диаграммы зависимости нормы решений N от химического потенциала ω , для уравнения (4); $Q(x) = \omega - x^2$, $P(x) = 1 + 2 \cos(12x)$ Сегменты кривых $N(\omega)$, соответствующие устойчивым решениям, выделены толстыми линиями. Ветви Γ_n , $n = 0, 1, 2, 3$ соответствуют семействам решений с линейным аналогом.

В заключении (Conclusion) подводятся итоги диссертационной работы. Основные результаты могут быть представлены следующим образом.

1. Сформулированы и доказаны общие утверждения о наличии и отсутствии сингулярных решений уравнения (4).
2. Сформулированы достаточные условия возможности кодирования регулярных решений уравнения (4) и предложен эффективный алгоритм численной проверки этих условий.

3. Для случая $U(x) \equiv 0$, $P(x) = A + \cos 2x$ исследовано множество СЛМ уравнения (1) и обнаружено новое устойчивое локализованное решение — *дипольный солитон*.
4. В случае бесконечной потенциально ямы показано, что присутствие периодического псевдопотенциала приводит к появлению новых классов СЛМ, не имеющих линейных аналогов. Для псевдопотенциала с нулевой средней установлено, что увеличение частоты псевдопотенциала приводит к стабилизации малоамплитудных стационарных локализованных решений.

В приложении А (Appendix A) доказывается лемма об ограниченных решениях, использующаяся в первой главе.

В приложении В (Appendix B) в явном виде выписаны решения для двух уравнений типа осциллятора Дуффинга:

$$u_{xx} - u + u^3 = 0; \quad u_{xx} - u - u^3 = 0. \quad (11)$$

В приложении С (Appendix C) приведено доказательство теорем об отображении h- и v-полос, использующихся во второй главе.

Список публикаций автора по теме диссертации

1. *Lebedev M. E., Alfimov G. L., Malomed B.* Stable dipole solitons and soliton complexes in the nonlinear Schrödinger equation with periodically modulated nonlinearity // *Chaos*. — 2016. — Vol. 26. — P. 073110.
2. *Alfimov G. L., Lebedev M. E.* On regular and singular solutions for equation $u_{xx} + Q(x)u + P(x)u^3$ // *Ufa Mathematical Journal*. — 2015. — Vol. 7, no. 2. — P. 3–16.
3. Localized modes in the Gross-Pitaevskii equation with a parabolic trapping potential and a nonlinear lattice pseudopotential / G. L. Alfimov [et al.] // *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*. — 2019. — Vol. 66. — P. 194–207. — ISSN 1007-5704.
4. *Alfimov G. L., Lebedev M. E.* Coding of stationary modes for the nonlinear Schrödinger equation with periodically modulated nonlinearity // Тезисы доклада на конференции «Гамильтонова динамика, неавтономные системы и структуры в уравнениях с частными производными», Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород. — 2014. — Дек.
5. *Алфимов Г. Л., Лебедев М. Е.* Стационарные моды нелинейного уравнения Шрёдингера в присутствии линейного и нелинейного потенциалов // Тезисы доклада на конференции «Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании», БашГУ, Уфа. — 2015. — Сент.
6. *Lebedev M. E., Alfimov G. L., Malomed B. A.* Stable dipole solitons and soliton complexes in the nonlinear Schrödinger equation with periodically modulated nonlinearity // Тезисы доклада на конференции «Динамика, бифуркации и странные аттракторы», Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород. — 2016. — Июль.
7. Steady-states for the Gross-Pitaevskii equation with nonlinear lattice pseudopotential / G. L. Alfimov [и др.] // Тезисы доклада на конференции «Ком-

- плексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения», Башкортостан, оз. Банное. — 2018. — Март.
8. Steady-states for the Gross-Pitaevskii equation with nonlinear lattice pseudopotential / G. L. Alfimov [et al.] // Books of abstracts of conference “Nonlinear Phenomena in Bose Condensates and Optical Systems”, Tashkent, Uzbekistan. — 2018. — Aug.
 9. *Lebedev M. E., Shipitsyn K. V.* Coding of solutions for the Duffing equation with non-homogeneous nonlinearity // Тезисы доклада на конференции «Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения», Башкортостан, оз. Банное. — 2019. — Март.
 10. *M. E. Lebedev G. L. A.* Coding of bounded solutions of equation $u_{xx} - u + \eta(x)u^3 = 0$ with periodic piecewise constant function $\eta(x)$ // Тезисы доклада на конференции «Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения», Башкортостан, оз. Банное. — 2021. — Март.