

4. előadás

VALÓS SOROZATOK 3.

Műveletek konvergens sorozatokkal

A sorozatok konvergencia-tulajdonságainak vizsgálatánál kiemelt szerepet játszanak a nullasorozatok.

1. definíció. Az (a_n) sorozatot **nullasorozatnak** nevezzük, ha a sorozat konvergens és $\lim(a_n) = 0$, azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0: |a_n - 0| = |a_n| < \varepsilon.$$

1. tétel (Nullasorozatok alaptulajdonságai).

1° (a_n) nullasorozat $\iff (|a_n|)$ nullasorozat.

2° (a_n) konvergens és $\lim(a_n) = A$ $\iff (a_n - A)$ nullasorozat.

3° Majoráns kritérium. Ha (a_n) nullasorozat és $|c_n| \leq |a_n|$ (m.m. $n \in \mathbb{N}$), akkor (c_n) is nullasorozat.

Bizonyítás.

1° $\lim(a_n) = 0 \iff \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > n_0: |a_n| < \varepsilon$, azaz $||a_n| - 0| < \varepsilon$, és ez azt jelenti, hogy $\lim(|a_n|) = 0$.

2° $\lim(a_n) = A \iff \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > n_0: |a_n - A| < \varepsilon$, azaz $|(a_n - A) - 0| < \varepsilon$, tehát $\lim(a_n - A) = 0$.

3° $\lim(a_n) = 0 \implies \forall \varepsilon > 0$ mellett egy alkalmas $n_1 \in \mathbb{N}$ küszöbindexszel

$$|a_n| < \varepsilon \quad \forall n > n_1 \text{ indexre.}$$

Ugyanakkor a $|c_n| \leq |a_n|$ (m.m. $n \in \mathbb{N}$) „majoráns feltétel” miatt van olyan $n_2 \in \mathbb{N}$, amellyel

$$|c_n| \leq |a_n| \quad \forall n > n_2 \text{ indexre.}$$

Ha tehát $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$, akkor

$$|c_n| \leq |a_n| < \varepsilon \quad \forall n > n_0 \text{ indexre,}$$

ami azt jelenti, hogy $\lim(c_n) = 0$.

2. tétel (Műveletek nullasorozatokkal). Tegyük fel, hogy $\lim(a_n) = 0$ és $\lim(b_n) = 0$. Ekkor

1° $(a_n + b_n)$ is nullasorozat,

2° ha (c_n) korlátos sorozat, akkor $(c_n \cdot a_n)$ nullasorozat,

3° $(a_n \cdot b_n)$ nullasorozat.

Bizonyítás.

1° Mivel $\lim(a_n) = \lim(b_n) = 0$, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -hoz

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall n > n_1 : |a_n| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ és}$$

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall n > n_2 : |b_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Legyen $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Ekkor $\forall n > n_0$ indexre

$$|a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

és ez azt jelenti, hogy $\lim(a_n + b_n) = 0$, azaz $(a_n + b_n)$ valóban nullasorozat.

2° A (c_n) sorozat korlátos, ezért

$$\exists K > 0 : |c_n| < K \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Mivel (a_n) nullasorozat, ezért

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall n > n_0 : |a_n| < \frac{\varepsilon}{K},$$

következésképpen minden $n > n_0$ indexre

$$|c_n \cdot a_n| < K \cdot \frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon,$$

azaz $\lim(c_n \cdot a_n) = 0$.

3° Mivel minden konvergens sorozat korlátos, ezért a $\lim(b_n) = 0$ feltételből következik, hogy (b_n) korlátos sorozat. Az állítás tehát **2°** közvetlen következménye.

Megjegyzések.

1° Az előző tételből következik, hogy egy nullasorozat konstansszorosa és két nullasorozat különbsége is nullasorozat.

2° Nullasorozatok **hányadosának** a határértéke (vagyis két „kicsi” szám hányadosa) bármi lehet. Ezt illusztrálják az alábbi példák:

$$\bullet \quad \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^3}} = n \rightarrow +\infty, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty,$$

$$\bullet \quad \frac{\frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty,$$

$$\bullet \quad \frac{\frac{c}{n}}{\frac{1}{n}} = c \rightarrow c, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty \quad (\text{itt } c \in \mathbb{R}),$$

$$\bullet \quad \frac{\frac{(-1)^n}{n}}{\frac{1}{n}} = (-1)^n \text{ sorozat divergens. } \blacksquare$$

A konvergens sorozatok és az algebrai műveletek kapcsolatát fejezi ki a következő tétel. Azt állítja, hogy a konvergens sorozatok a műveletek során a legtöbb esetben jól viselkednek abban az értelemben, hogy a három alpművelet és a határérték képzés sorrendje felcserélhető.

3. tétel (Műveletek konvergens sorozatokkal). Tegyük fel, hogy az (a_n) és a (b_n) sorozat konvergens. Legyen

$$\lim(a_n) = A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \lim(b_n) = B \in \mathbb{R}.$$

Ekkor

1° $(a_n + b_n)$ is konvergens és $\lim(a_n + b_n) = \lim(a_n) + \lim(b_n) = A + B$,

2° $(a_n \cdot b_n)$ is konvergens és $\lim(a_n \cdot b_n) = \lim(a_n) \cdot \lim(b_n) = A \cdot B$,

3° ha $b_n \neq 0$ ($n \in \mathbb{N}$) és $\lim(b_n) \neq 0$, akkor

$$\left(\frac{a_n}{b_n}\right) \text{ is konvergens és } \lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim(a_n)}{\lim(b_n)} = \frac{A}{B}.$$

Bizonyítás. Gyakran fogjuk alkalmazni a nullasorozatok **2°** alaptulajdonságát, ami azt állítja, hogy

$$(*) \quad (x_n) \text{ konvergens és } \alpha \in \mathbb{R} \text{ a határértéke} \iff (x_n - \alpha) \text{ nullasorozat.}$$

1° A $(*)$ állítás miatt elég azt megmutatni, hogy

$$\left((a_n + b_n) - (A + B)\right) \text{ nullasorozat.}$$

Ez nyilván igaz, mert

$$\left((a_n + b_n) - (A + B)\right) = (a_n - A) + (b_n - B),$$

és két nullasorozat összege is nullasorozat.

2° A $(*)$ állítás miatt elég azt megmutatni, hogy $(a_n b_n - AB)$ nullasorozat. Ez a következő átalakítással igazolható:

$$\begin{aligned} a_n b_n - AB &= a_n b_n - A b_n + A b_n - AB = \\ &= \underbrace{\underbrace{b_n}_{\text{korlátos}} \cdot \underbrace{(a_n - A)}_{\text{0-sorozat}}}_{\text{0-sorozat}} + \underbrace{\underbrace{A}_{\text{korlátos}} \cdot \underbrace{(b_n - B)}_{\text{0-sorozat}}}_{\text{0-sorozat}}. \end{aligned}$$

A fenti gondolatmenetben a (b_n) sorozat azért korlátos, mert konvergens. Így $(a_n b_n - AB)$ valóban nullasorozat, ezért az $(a_n \cdot b_n)$ szorzat-sorozat konvergens, és $A \cdot B$ a határértéke, azaz

$$\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B = \lim(a_n) \cdot \lim(b_n).$$

3° A bizonyításhoz először egy önmagában is érdekes állítást igazolunk.

Segédteétel. Ha $b_n \neq 0$ ($n \in \mathbb{N}$) és (b_n) konvergens, továbbá $B := \lim(b_n) \neq 0$, akkor az

$$\left(\frac{1}{b_n}\right)$$

reciprok-sorozat korlátos.

Ennek bizonyításához legyen $\varepsilon := |B|/2$. Ekkor egy alkalmas $n_0 \in \mathbb{N}$ küszöbindex mellett

$$|b_n - B| < \varepsilon = \frac{|B|}{2} \quad \forall n > n_0 \text{ indexre.}$$

Így minden $n > n_0$ esetén

$$|b_n| = |B + b_n - B| \geq |B| - |b_n - B| > |B| - \frac{|B|}{2} = \frac{|B|}{2}.$$

Tehát

$$\left|\frac{1}{b_n}\right| < \frac{2}{|B|}, \quad \text{ha } n > n_0,$$

következésképpen az

$$\left|\frac{1}{b_n}\right| \leq \max\left\{\frac{1}{|b_0|}, \frac{1}{|b_1|}, \dots, \frac{1}{|b_{n_0}|}, \frac{2}{|B|}\right\}$$

egyenlőtlenség már minden $n \in \mathbb{N}$ számra teljesül, ezért az $(1/b_n)$ sorozat valóban korlátos. A segédteételt tehát bebizonyítottuk. \square

Most azt látjuk be, hogy a (b_n) sorozatra tett feltétel mellett

$$\left(\frac{1}{b_n}\right) \text{ sorozat konvergens és } \lim\left(\frac{1}{b_n}\right) = \frac{1}{B}.$$

Ez (*)-ból következik az alábbi átalakítással:

$$\frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} = \frac{B - b_n}{B \cdot b_n} = \underbrace{\frac{1}{B \cdot b_n}}_{\text{0-sorozat}} \cdot \underbrace{(B - b_n)}_{\text{0-sorozat}}.$$

A **3°** állítás bizonyításának a befejezéséhez már csak azt kell figyelembe venni, hogy

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

más szóval az (a_n/b_n) „hányados-sorozat” két konvergens sorozat szorzata. Így a **2°** állítás és a reciprok sorozatról az előbb mondottak miatt

$$\left(\frac{a_n}{b_n}\right) \text{ is konvergens és } \lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = A \cdot \frac{1}{B} = \frac{A}{B} = \frac{\lim(a_n)}{\lim(b_n)}.$$

A műveletek és a határérték kapcsolata

$\overline{\mathbb{R}}$ struktúrája

A kibővített valós számok

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

halmazában bevezettünk egy **rendezést** is. \mathbb{R} eredeti rendezését megtartva azt mondtuk, hogy legyen

$$-\infty < x < +\infty$$

minden $x \in \mathbb{R}$ esetén.

Állapodjunk meg abban, hogy az \mathbb{R} -beli **műveleteket** az alábbiak szerint terjesztjük ki $\overline{\mathbb{R}}$ -ra:

1° Összeg:

(i) Minden x valós számra legyen

$$x + (+\infty) := (+\infty) + x := +\infty, \quad x + (-\infty) := (-\infty) + x := -\infty,$$

(ii) $(+\infty) + (+\infty) := +\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) := -\infty.$

2° Szorzat:

(i) Minden x pozitív valós számra legyen

$$x \cdot (+\infty) := (+\infty) \cdot x := +\infty, \quad x \cdot (-\infty) := (-\infty) \cdot x := -\infty.$$

(ii) Minden x negatív valós számra legyen

$$x \cdot (+\infty) := (+\infty) \cdot x := -\infty, \quad x \cdot (-\infty) := (-\infty) \cdot x := +\infty.$$

(iii) $(+\infty) \cdot (+\infty) := +\infty, \quad (-\infty) \cdot (-\infty) := +\infty, \quad (+\infty) \cdot (-\infty) := (-\infty) \cdot (+\infty) := -\infty.$

3° Hányados:

(i) Minden x valós számra legyen

$$\frac{x}{+\infty} := \frac{x}{-\infty} := 0.$$

(ii) Minden x pozitív valós számra legyen

$$\frac{+\infty}{x} := +\infty, \quad \frac{-\infty}{x} := -\infty.$$

(iii) Minden x negatív valós számra legyen

$$\frac{+\infty}{x} := -\infty, \quad \frac{-\infty}{x} := +\infty.$$

Megjegyzések.

1° A műveletek és a rendezés definíciói összhangban vannak a végtelenről kialakult szemléletes képünkkel; pl. $x + (+\infty) := +\infty$ azzal, hogy egy valós szám és egy „mindennél nagyobb” szám összege „mindennél nagyobb”.

2° Felhívjuk a figyelmet arra, hogy $\overline{\mathbb{R}}$ -on lényegében nem „igazi” műveleteket, azaz nem a teljes $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ halmazon értelmezett $\overline{\mathbb{R}}$ -beli értékeket felvevő függvényeket értelmeztünk. Bizonyos műveleteket nem definiáltunk. Ilyenek többek között a következők:

$$(+\infty) + (-\infty), \quad 0 \cdot (\pm\infty), \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{c}{0} \quad (c \in \overline{\mathbb{R}}).$$

A nem értelmezett esetek később fontos szerepet fognak játszani a határértékszámításban. ■

Műveletek határértékekkel

A konvergens sorozatoknál láttuk, hogy az alpműveletek és a határérték képzés sorrendje felcserélhető. A következő tétel azt állítja, hogy a „legtöbb esetben” ez igaz a tágabb értelemben vett határértékekre is.

4. tétel (A műveletek és a határérték kapcsolata). *Tegyük fel, hogy az (a_n) és (b_n) sorozatoknak van határértéke, és legyen*

$$\lim(a_n) =: A \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \lim(b_n) =: B \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ekkor

1° *az $(a_n + b_n)$ összeg-sorozatnak is van határértéke, és*

$$\lim(a_n + b_n) = \lim(a_n) + \lim(b_n) = A + B,$$

feltéve, hogy az $A + B \in \overline{\mathbb{R}}$ összeg értelmezve van;

2° *az $(a_n \cdot b_n)$ szorzat-sorozatnak is van határértéke, és*

$$\lim(a_n \cdot b_n) = \lim(a_n) \cdot \lim(b_n) = A \cdot B,$$

feltéve, hogy az $A \cdot B \in \overline{\mathbb{R}}$ szorzat értelmezve van;

3° *ha $b_n \neq 0$ ($n \in \mathbb{N}$), akkor az $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ hányados-sorozatnak is van határértéke, és*

$$\lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim(a_n)}{\lim(b_n)} = \frac{A}{B},$$

feltéve, hogy az $\frac{A}{B} \in \overline{\mathbb{R}}$ hányados értelmezve van.

Bizonyítás. Tekintettel a már igazolt, „műveletek konvergens sorozatokkal” című tételre, elegendő a tételt igazolni a hiányzó $A \in \overline{\mathbb{R}}$ vagy $B \in \overline{\mathbb{R}}$ tartalmazó esetekre. Ez összesen 28 eset jelent (lásd a bizonyítás utáni megjegyzést). Példaként három állítás bizonyítását mutatjuk meg (a többi hasonlóan igazolható).

- $\boxed{\lim(a_n) = \lim(b_n) = +\infty \implies \lim(a_n + b_n) = +\infty}$

Legyen $P_0 := 1$ és $P > 0$ egy tetszőlegesen rögzített valós szám. Ekkor

$$\lim(a_n) = +\infty \implies \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1: a_n > P_0 = 1,$$

$$\lim(b_n) = +\infty \implies \exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n > n_2: b_n > P.$$

Legyen $n_0 = \max \{n_1, n_2\}$. Ekkor $\forall n > n_0$ esetén

$$a_n + b_n > 1 + P > P \implies \lim (a_n + b_n) = +\infty.$$

• $\boxed{\lim (a_n) = A \in \mathbb{R}^+, \lim (b_n) = -\infty \implies \lim (a_n b_n) = -\infty}$

Legyen $\varepsilon := A/2$ és $P < 0$ egy tetszőleges valós szám. Ekkor

$$\lim (a_n) = A \implies \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1: |a_n - A| < \varepsilon = \frac{A}{2}, \text{ és így } a_n > \frac{A}{2} \quad (> 0),$$

$$\lim (b_n) = -\infty \implies \exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n > n_2: b_n < \frac{2P}{A} \quad (< 0).$$

Legyen $n_0 = \max \{n_1, n_2\}$. Ekkor $\forall n > n_0$ esetén

$$a_n b_n < a_n \cdot \frac{2P}{A} < \frac{A}{2} \cdot \frac{2P}{A} = P \implies \lim (a_n b_n) = -\infty.$$

• $\boxed{\lim (a_n) = A \in \mathbb{R}, \lim (b_n) = +\infty \implies \lim \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = 0}$

Elegendő megmutatni, hogy $(1/b_n)$ nullasorozat, hiszen az (a_n) sorozat korlátos.

Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges valós szám és $P := 1/\varepsilon > 0$. Ekkor

$$\lim (b_n) = +\infty \implies \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0: b_n > P = \frac{1}{\varepsilon},$$

és így

$$\frac{1}{b_n} < \varepsilon \implies \left| \frac{1}{b_n} - 0 \right| < \varepsilon \implies \lim (b_n) = 0.$$

Megjegyzés. Figyeljük meg, hogy a konvergens sorozatok és a műveletek kapcsolatára vonatkozó korábbi eredményeinket (figyelembe véve az $\overline{\mathbb{R}}$ -beli műveletek definícióit) további 28 állítással egészítettük ki. Ezt szemléltetik az alábbi táblázatok.

$$A = \lim (a_n) \quad B = \lim (b_n)$$

Összeg	$A \in \mathbb{R}$	$A = +\infty$	$A = -\infty$
$B \in \mathbb{R}$	$A + B$	$+\infty$	$-\infty$
$B = +\infty$	$+\infty$	$+\infty$	
$B = -\infty$	$-\infty$		$-\infty$

Szorzat	$A > 0$	$A = 0$	$A < 0$	$A = +\infty$	$A = -\infty$
$B > 0$	$A \cdot B$			$+\infty$	$-\infty$
$B = 0$					
$B < 0$				$-\infty$	$+\infty$
$B = +\infty$	$+\infty$		$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$B = -\infty$	$-\infty$		$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Hányados	$A > 0$	$A = 0$	$A < 0$	$A = +\infty$	$A = -\infty$
$B > 0$	A/B	A/B	A/B	$+\infty$	$-\infty$
$B < 0$	A/B	A/B	A/B	$-\infty$	$+\infty$
$B = 0$					
$B = +\infty$					
$B = -\infty$					

Kritikus határértékekről beszélünk akkor, ha az imént megfogalmazott tétel nem alkalmazható. Ezeket az eseteket a táblázatban üresen hagyott helyek jelölik, és ez azt jelenti, hogy A és B megadott értékei nem határozzák meg az összeg-, a szorzat-, illetve a hányados-sorozat határértékét.

Ha pl. $A = +\infty$ és $B = -\infty$, akkor az $(a_n + b_n)$ összeg-sorozat határértékére (a_n) és (b_n) megválasztásától függően „minden” előfordulhat. Ezt mutatják az alábbi példák:

$$\begin{array}{llll}
a_n := n + c, & b_n := -n \ (n \in \mathbb{N}, \ c \in \mathbb{R}) & \implies & \lim(a_n + b_n) = c, \\
a_n := 2n, & b_n := -n \ (n \in \mathbb{N}) & \implies & \lim(a_n + b_n) = +\infty, \\
a_n := n, & b_n := -2n \ (n \in \mathbb{N}) & \implies & \lim(a_n + b_n) = -\infty, \\
a_n := n + (-1)^n, & b_n := -n \ (n \in \mathbb{N}) & \implies & (a_n + b_n)\text{-nek nincs határértéke.}
\end{array}$$

Ezért nem értelmeztük $\overline{\mathbb{R}}$ -ben $(+\infty)$ -nek és $(-\infty)$ -nek az összegét.

Hasonló egyszerű példákat lehet megadni a többi kritikus esetben is. Ekkor röviden

$$(+\infty) + (-\infty) \text{ (vagy } (+\infty) - (+\infty)), \quad 0 \cdot (\pm\infty), \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{c}{0} \ (c \in \overline{\mathbb{R}})$$

típusú határértékekről beszélünk. Ilyenkor a sorozat határértékének a meghatározása során a következő „módszert” követjük: **a kritikus határértéket valamilyen „alkalmas” átalakítással igyekszünk nem kritikus határértékre visszavezetni.** ■

Monoton sorozatok határértéke

A sorozatok egy légyeges osztályát képezik a monoton sorozatok. Látni fogjuk azt, hogy **minden monoton sorozatnak van határértéke**. Ha még azt is feltesszük, hogy a sorozat korlátos, akkor a sorozat konvergens is. Nem korlátos sorozatok határértéke pedig vagy $+\infty$ vagy $-\infty$. Mivel a monotonitást, illetve a korlátosságot egyszerűbb eldönteni, mint a konvergenciát vagy a határértéket, ezért a következő tétel sok esetben jól használható módszer ad a határérték-vizsgálatokhoz.

5. tétel. Minden (a_n) monoton sorozatnak van határértéke.

1° (a) Ha $(a_n) \nearrow$ és felülről korlátos, akkor (a_n) konvergens és

$$\lim (a_n) = \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

(b) Ha $(a_n) \searrow$ és alulról korlátos, akkor (a_n) konvergens és

$$\lim (a_n) = \inf \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

2° (a) Ha $(a_n) \nearrow$ és felülről nem korlátos, akkor

$$\lim (a_n) = +\infty.$$

(b) Ha $(a_n) \searrow$ és alulról nem korlátos, akkor

$$\lim (a_n) = -\infty.$$

Bizonyítás. Az állítást csak monoton növekedő sorozatokra fogjuk igazolni. Értelemszerű módosításokkal bizonyíthatjuk be az állítást a monoton csökkenő sorozatokra.

1° (a) Tegyük fel, hogy az (a_n) sorozat monoton növekedő és felülről korlátos. Legyen

$$A := \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}.$$

Ez azt jelenti, hogy A a szóban forgó halmaznak a legkisebb felső korlátja, azaz

- $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq A$ és
- $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N} : A - \varepsilon < a_{n_0} \leq A$.

Mivel a feltételezésünk szerint az (a_n) sorozat monoton növekedő, ezért az

$$A - \varepsilon < a_n \leq A$$

becslés is igaz minden $n > n_0$ indexre.

Azt kaptuk tehát, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall n > n_0 : |a_n - A| < \varepsilon.$$

Ez pontosan azt jelenti, hogy az (a_n) sorozat konvergens és $\lim (a_n) = A$.

2° (a) Tegyük fel, hogy az (a_n) sorozat monoton növekedő és felülről nem korlátos. Ekkor

$$\forall P > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N} : a_{n_0} > P.$$

A monotonitás miatt ezért egyúttal az is igaz, hogy

$$\forall n > n_0 : a_n > P,$$

és ez pontosan azt jelenti, hogy $\lim (a_n) = +\infty$.

Megjegyzés. A tételben elég feltenni azt, hogy a sorozat egy küszöbindextől kezdve monoton, hiszen véges sok tag nem befolyásolja a határértéket. ■

Nevezetes sorozatok 1.

1. Az $(1/n^k)$, (n^k) és $(\sqrt[k]{n})$ sorozatok határértéke.

6. tétel. Legyen $k = 1, 2, \dots$ egy rögzített természetes szám. Ekkor

- (a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0,$
- (b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty,$
- (c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{n} = +\infty.$

Bizonyítás. A tételt a határérték definíciója alapján fogjuk bebizonyítani.

(a) Azt kell megmutatni, hogy

$$(*) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall n > n_0 : \left| \frac{1}{n^k} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ számot. Mivel az

$$\left| \frac{1}{n^k} - 0 \right| = \frac{1}{n^k} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \left(\implies \frac{1}{\varepsilon} < n \right)$$

egyenlőtlenség igaz minden $n > \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ indexre, ezért az $n_0 := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ küszöbindex megválasztásával $(*)$ teljesül.

(b) Most azt kell belátnunk, hogy

$$(**) \quad \forall P > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall n > n_0 : n^k > P.$$

Rögzítsük a $P > 0$ számot. Mivel az

$$n^k \geq n > P$$

egyenlőtlenség igaz minden $n > [P]$ indexre, ezért az $n_0 := [P]$ küszöbindex megválasztásával $(**)$ teljesül.

(c) Végül azt kell megmutatni, hogy

$$(***) \quad \forall P > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : \sqrt[k]{n} > P.$$

Rögzítsük a $P > 0$ számot. Mivel az

$$\sqrt[k]{n} > P \quad \iff \quad n > P^k$$

egyenlőtlenség igaz minden $n > [P^k]$ indexre, ezért az $n_0 := [P^k]$ küszöbindex megválasztásával $(***)$ teljesül.

2. Konvergens sorozatok m -edik gyökének határértéke, ahol $m = 2, 3, \dots$ rögzített természetes szám.

7. tétel. Legyen $m \geq 2$ rögzített természetes szám. Tegyük fel, hogy az $(a_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ sorozat konvergens és $\lim (a_n) =: A \in \mathbb{R}$. Ekkor $A \geq 0$, továbbá az $(\sqrt[m]{a_n})$ sorozat is konvergens, és

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[m]{a_n} = \sqrt[m]{A}.$$

Bizonyítás. Mivel $\sqrt[m]{a_n} \geq 0$ ($n \in \mathbb{N}$), így a rendezés és a határérték kapcsolata alapján $A \geq 0$.

Ha $A = 0$, akkor az állítás a definíció közvetlen következménye. Valóban, rögzített $\varepsilon > 0$ mellett, ha $\lim (a_n) = 0$, akkor

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0: 0 \leq a_n < \varepsilon^m, \quad \text{és így} \quad 0 \leq \sqrt[m]{a_n} < \varepsilon,$$

azaz $\lim (\sqrt[m]{a_n}) = 0$.

Tegyük most fel, hogy $m = 2$ és $A > 0$. Ekkor

$$\sqrt{a_n} - \sqrt{A} = (\sqrt{a_n} - \sqrt{A}) \cdot \frac{\sqrt{a_n} + \sqrt{A}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{A}} = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{A}} \cdot (a_n - A),$$

következésképpen

$$0 \leq |\sqrt{a_n} - \sqrt{A}| \leq \frac{1}{\sqrt{A}} \cdot |a_n - A| \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Mivel $\lim (a_n) = A \implies \lim (|a_n - A|) = 0$, ezért a közrefogási elvből következik, hogy $|\sqrt{a_n} - \sqrt{A}| \rightarrow 0$, ha $n \rightarrow +\infty$, így $\sqrt{a_n} \rightarrow \sqrt{A}$, ha $n \rightarrow +\infty$.

Az $m > 2$ és $A > 0$ esetében a bizonyítás hasonló. A gyöktelenítéshez az

$$a_n - A = (\sqrt[m]{a_n} - \sqrt[m]{A}) \cdot \left((\sqrt[m]{a_n})^{m-1} + (\sqrt[m]{a_n})^{m-2} \cdot \sqrt[m]{A} + \dots + (\sqrt[m]{A})^{m-1} \right)$$

azonosságot fogjuk alkalmazni. Ekkor minden $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\sqrt[m]{a_n} - \sqrt[m]{A} = \frac{a_n - A}{(\sqrt[m]{a_n})^{m-1} + (\sqrt[m]{a_n})^{m-2} \cdot \sqrt[m]{A} + \dots + (\sqrt[m]{A})^{m-1}},$$

így

$$0 \leq |\sqrt[m]{a_n} - \sqrt[m]{A}| \leq \frac{1}{(\sqrt[m]{A})^{m-1}} \cdot |a_n - A| \rightarrow 0 \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Ezért a közrefogási elvből következik a tétel állítása.

3. A geometriai/mértani sorozat határértéke.

8. tétel. Minden rögzített $q \in \mathbb{R}$ esetén a (q^n) mértani sorozat határértékére a következők teljesülnek:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n \begin{cases} = 0, & \text{ha } |q| < 1, \\ = 1, & \text{ha } q = 1, \\ = +\infty, & \text{ha } q > 1, \\ \text{nem létezik,} & \text{ha } q \leq -1. \end{cases}$$

Bizonyítás.

- $q > 1$. Írjuk fel ezt a számot $q = 1 + h$ ($h > 0$) alakban. A Bernoulli-egyenlőtlenségből következik, hogy

$$q^n = (1 + h)^n \geq 1 + nh > nh \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

A határérték és műveletek kapcsolatára vonatkozó tétel szerint $n \rightarrow +\infty, h > 0 \implies nh \rightarrow +\infty$. Ezért

$$q^n > nh \rightarrow +\infty \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Így a rendezés és a határérték kapcsolatára vonatkozó tétel alapján $\lim(q^n) = +\infty$.

- $q = 1$. Ekkor az azonosan 1 konstans sorozatot kapjuk, ami konvergens, és 1 a határértéke.
- $|q| < 1$. Ha $q = 0$, akkor az állítás nyilvánvaló. Ha $0 < |q| < 1$, akkor az $\frac{1}{|q|} > 1$ számot írjuk fel az $\frac{1}{|q|} = 1 + h$ ($h > 0$) alakban. Ismét a Bernoulli-egyenlőtlenséget felhasználva azt kapjuk, hogy

$$\frac{1}{|q|^n} = \left(\frac{1}{|q|}\right)^n = (1 + h)^n > 1 + nh > nh \quad (n \in \mathbb{N}^+),$$

azaz

$$0 < |q|^n < \frac{1}{nh} \rightarrow 0 \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Így a közrefogási elv szerint $\lim(q^n) = 0$.

- $q = -1$. Már láttuk, hogy a $((-1)^n)$ sorozatnak nincs határértéke.
- $q < -1$. A (q^n) sorozat páros, illetve páratlan indexű részsorozatainak különböző a határértéke (a páros indexű részsorozat határértéke $+\infty$, a páratlan indexű részsorozaté pedig $-\infty$), ezért a (q^n) sorozatnak nincs határértéke.

Az előző tétel értelmében $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$, illetve

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = 0.$$

Azonban a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-2)^n$ határérték nem létezik.

4. n -edik gyökös kifejezéssel megadott sorozatok határértéke.

(lásd például <https://www.wolframalpha.com/>)

9. tétel.

1° Minden $a > 0$ valós számra az $(\sqrt[n]{a})$ sorozat konvergens, és $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

2° Az $(\sqrt[n]{n})$ sorozat konvergens, és $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

3° Tegyük fel, hogy az $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ nemnegatív tagokból álló sorozat konvergens, és $\lim(x_n) = A \in \mathbb{R}^+$, azaz $A > 0$ valós szám. Ekkor az $(\sqrt[n]{x_n})$ sorozat is konvergens, és

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = 1.$$

Bizonyítás.

1° (i) $a > 1$. A számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség alapján

$$1 \leq \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1} < (n-1 \text{ darab } 1\text{-es}) < \frac{a + n - 1}{n} = 1 + \frac{a - 1}{n} \rightarrow 1,$$

ha $n \rightarrow +\infty$. Így a közrefogási elv szerint $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

(ii) $a = 1$. Ekkor az állítás nyilvánvaló.

(iii) $0 < a < 1$. Ekkor $\frac{1}{a} > 1$, ezért (i), valamint a konvergens sorozatok és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tétel alapján

$$\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

2° Ismét a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenséget alkalmazzuk:

$$1 \leq \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1} < (n-2 \text{ darab } 1\text{-es}) < \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} = 1 - \frac{2}{n} + \frac{2}{\sqrt{n}}$$

A jobb oldalon szereplő sorozat határértéke 1. Így a közrefogási elv alkalmazásával azt kapjuk, hogy $\lim(\sqrt[n]{n}) = 1$.

3° $\lim(x_n) = A > 0$ valós szám \implies az $\varepsilon := A/2 > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0$:

$$|x_n - A| < \varepsilon = \frac{A}{2} \implies \frac{A}{2} < x_n < \frac{3A}{2} \implies \sqrt[n]{\frac{A}{2}} < \sqrt[n]{x_n} < \sqrt[n]{\frac{3A}{2}}.$$

Alkalmazzuk a tétel 1° állítását az $a = A/2$ és az $a = 3A/2$ választással. Ekkor

$$1 \leftarrow \sqrt[n]{\frac{A}{2}} < \sqrt[n]{x_n} < \sqrt[n]{\frac{3A}{2}} \rightarrow 1, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Így a közrefogási elv szerint $\lim(\sqrt[n]{x_n}) = 1$.

Az előző tétel értelmében $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2} = 1$. Nem annyira meglepő, hogy az $(\sqrt[n]{2})$ sorozat konvergens, hiszen nyilván monoton csökkenő és alulról korlátos (minden értéke 1-nél nagyobb). Az alábbi táblázatban látjuk, hogy a sorozat értékei egyre közelebb kerülnek az 1 értékhez.

n	2	3	4	5	6	100	1 000	10 000
$\sqrt[n]{2}$	1,414	1,256	1,189	1,149	1,122	1,0069	1,00069	1,000069

Ennek reciprok-sorozata $(\sqrt[n]{0,5})$ szintén konvergens, hiszen monoton növekedő és felülről korlátos (minden értéke 1-nél kisebb). A tétel általánosan azt állítja, hogy tetszőleges pozitív konstans n -edik gyökeiből képzett sorozat konvergens és határértéke 1.

A $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ eredmény valamivel érdekesebb. Az $(\sqrt[n]{n})$ sorozat nyilván alulról korlátos (minden értéke 1-nél nagyobb), de nem monoton. Igazolható azonban, hogy a sorozat egy index után monoton csökkenő, ami már nem annyira nyilvánvaló. Az alábbi táblázatban látjuk, hogy a sorozat értékei egyre közelebb kerülnek az 1 értékhez.

n	2	3	4	5	6	100	1 000	10 000
$\sqrt[n]{n}$	1,414	1,442	1,414	1,379	1,348	1,047	1,00693	1,00092

Végül, az $(\sqrt[n]{x_n})$ típusú sorozatokra vonatkozó állítás jelentősen megkönnyíti több, n -edik gyökös kifejezésekkel megadott sorozatok határértékének kiszámítását. Pl. a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^2 + 1} = 1$$

határérték igazolható közrefogási elvvel:

$$1 \leftarrow \underbrace{(\sqrt[n]{n})^2}_{\rightarrow 1^2} = \sqrt[n]{n^2} < \sqrt[n]{n^2 + 1} < \sqrt[n]{n^2 + n^2} = \sqrt[n]{2n^2} = \underbrace{\sqrt[n]{2}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{(\sqrt[n]{n})^2}_{\rightarrow 1^2} \rightarrow 1,$$

vagy az alábbi átalakítással:

$$\sqrt[n]{n^2 + 1} = \sqrt[n]{n^2} \cdot \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n^2}} = \underbrace{(\sqrt[n]{n})^2}_{\rightarrow 1^2} \cdot \underbrace{\sqrt[n]{x_n}}_{\rightarrow 1} \rightarrow 1, \quad \text{hiszen} \quad x_n := 1 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 1 \in \mathbb{R}^+.$$